


## طريقة تحضير (KI) يود البوتاسيوم للأطفال والرضع

احتفظ بحصتك من يود البوتاسيوم ضمن عدة الطوارئ الخاصة بك. لا تعطي يود البوتاسيوم لأطفالك ما لم تعلن محطة الطاقة النووية بقربك حالة الطوارئ العامة.

أفعل هذا لجعل الأمر أكثر سهولة على طفلك لأخذ يود البوتاسيوم.

<p>1. إسحق قرص واحد كامل 65 مجم إلى مسحوق ناعم. إطحنه باستعمال خلف ملعقة مقابل جدار الإناء الداخلي. لا يجب أن يكون بالمسحوق أي قطع كبيرة عندما تنتهي من عملية السحق.</p>	
<p>2. أضف 4 ملاعق شاي من الماء. حرّك حتى يذوب المسحوق.</p>	
<p>3. أضف 4 ملاعق شاي من الشراب المنكه (عصير، صودا، حليب بالشوكولاتة) قليل الدسم، لبن صناعي) إلى مزيج يود البوتاسيوم والماء. سيساعد هذا الخليط على إخفاء طعم يود البوتاسيوم.</p>	

أعط طفلك هذه الكمية من الخليط. انها جرعة واحدة.

إذا كان الطفل:	اعط الطفل:
عمر 4 - 12 سنوات	8 ملاعق شاي من الخليط (= 1 قرص)
عمر 1 شهر - 3 سنوات	4 ملاعق شاي من الخليط (= ½ قرص)
من عمر الولادة الي عمر 1 شهر	2 ملعقة شاي من الخليط (= ¼ قرص)
<p>كل ما هو مطلوب جرعة واحدة في اليوم الواحد. لا تحفظ بقية الخليط. إستمع إلى الإعلانات الطارئة لمعرفة كم عدد الأيام يجب إعطاء يود البوتاسيوم لطفلك. اصنع خليط جديد لكل يوم في نفس اليوم الذي سيعطي فيه.</p>	

للمزيد من المعلومات، اتصل بقسم صحة المجتمع مشيغان، 1-800-648-6942، بريد إلكتروني-

[www.michigan.gov/KI](http://www.michigan.gov/KI) أو قم بزيارة [MDCH.KI@michigan.gov](mailto:MDCH.KI@michigan.gov)