


Cómo preparar tabletas de Yoduro de Potasio (KI) para bebés y niños

Mantenga su provisión de KI en su botiquín de emergencia, para casos de desastre. No le dé a sus niños este medicamento a no ser que se haya declarado una *Emergencia General* en la central nuclear más próxima a usted.

Haga esto para que su niño ingiera el KI más fácilmente:

<p>1. Pulverice una tableta entera de 65 mg. Tritúrela usando el reverso de una cuchara contra el interior de un tazón. El polvo resultante no deberá tener partículas grandes una vez que usted haya terminado.</p>	
<p>2. Añada 4 <u>cucharaditas</u> de agua y revuelva hasta que el polvo esté disuelto.</p>	
<p>3. Añada 4 <u>cucharaditas</u> de alguna bebida con sabor (como jugo, soda sin gas, leche achocolatada baja en grasa o fórmula) a la mezcla de KI con agua. Esta mezcla ayudará a ocultar el sabor del KI.</p>	

Dele a su niño esta cantidad de la mezcla. Es una dosis:

Si su niño tiene:	Dele a su niño:
De 4 a 12 años de edad	8 <u>cucharaditas</u> de la mezcla (=1 tableta)
De 1 mes a 3 años de edad	4 <u>cucharaditas</u> de la mezcla (=1/2 tableta)
Hasta 1 mes de nacido	2 <u>cucharaditas</u> de la mezcla (=1/4 tableta)
<p>Una dosis es todo lo que se necesita en un día. No guarde el resto de la mezcla. Escuche los anuncios de emergencia para saber cuántos días más usted deberá suministrar el KI a su niño. Prepare una mezcla nueva para cada día que se suministre.</p>	

Para más información, contacte al Michigan Department of Community Health (Departamento de Salud Comunitaria de Michigan) llamando al 1-800-648-6942, enviando un e-mail a MDCH-KI@michigan.gov o visitando www.michigan.gov/KI.