INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE HEPATITIS PARA EMPLEADOS DE ALIMENTOS

Por favor, revise este poster con los empleados y colóquelo en donde puedan referirse a él fácilmente.

MICHIGAN EXPERIMENTA UN BROTE DE HEPATITIS A.

Toma pasos para protegerte de la hepatitis A: ¡VACÚNATE SI VIVES EN EL ÁREA DONDE ESTÁ EL BROTE! Información sobre el área de brote: michigan.gov/hepatitisAoutbreak

¿Qué es la hepatitis A?

La hepatitis A es una enfermedad muy contagiosa que ataca al hígado. Una persona infectada puede contagiar a otros hasta dos semanas antes de sentirse enferma y, en ocasiones, hasta una semana después de sentirse mejor. No todos los que están infectados presentarán todos los síntomas mencionados más adelante. Los síntomas regularmente comienzan en los 28 días siguientes a la exposición al virus, con un rango de 15 a 50 días.

Síntomas:

- Ictericia (el blanco de los ojos y la piel se ponen amarillentos)
- Diarrea
- · Pérdida de apetito
- Dolor estomacal
- Heces sin color o color arcilla
- Fiebre
- · Fatiga/cansancio
- · Náusea y vómito
- Orina de color oscuro

TO STATE OF THE PARTY OF THE PA

¿Qué necesito hacer si me he expuesto a la hepatitis A o estoy enfermo y presento síntomas?

- Si estás enfermo y presentas síntomas, NO VAYAS A TRABAJAR. Visita a tu médico inmediatamente.
- Avísale inmediatamente a tu gerente si:
- Tienes alguno de los síntomas mencionados arriba.
- Te diagnosticaron hepatitis A.
- Alguna persona que vive en tu casa o alguien con quien hayas tenido un contacto personal cercano fue diagnosticado con hepatitis A en los últimos 30 días.
- Debes recibir una vacuna contra la hepatitis A dentro de los 14 días posteriores a la exposición si aún no te has enfermado ni presentado síntomas.
- Si no tienes seguro médico, llama a tu
 Departamento de Salud local para pedir información
 sobre vacunas gratuitas o de bajo costo. Visita
 michigan.gov/hepatitisAoutbreak para pedir la
 información de contacto.

¿Cómo se propaga la hepatitis A?

- Normalmente al meter a tu boca algo que ha sido contaminado con heces (excremento) de una persona con hepatitis A.
- Al compartir toallas, cepillos de dientes, comer con los mismos cubiertos o tener relaciones sexuales con alguien que está infectado.
- El virus puede estar en alimentos, bebidas, drogas o cigarillos que hayan sido manipulados por una persona infectada.

¿Cómo evito la propagación de la enfermedad?

- No toques alimentos listos para el consumo con tus manos sin guantes.
- Sigue todos los requisitos de seguridad, incluyendo el lavado de manos con agua tibia jabonosa durante 20 segundos en cualquiera de los siguientes casos:
- Inmediatamente antes de preparar alimentos o trabajar con alimentos no pre-empacados, limpiar equipo y utensilios, incluyendo los contenedores y cubiertos para comida para llevar.
- Después de tocar partes del cuerpo humano que no sean manos limpias o porciones expuestas del brazo también limpias.
- Después de usar el baño.
- Después de manejar equipo o utensilios sucios.
- Al cambiar de trabajar con alimentos crudos a trabajar con alimentos listos para el consumo.
- Después de toser, estornudar, usar un pañuelo o pañuelo desechable, usar tabaco, comer o beber.
- Antes de colocarse guantes desechables para empezar a trabajar con los alimentos.
- Durante la preparación de alimentos, ya que con frecuencia es necesario remover suciedad y contaminantes, y al cambiar de asignación, para evitar la contaminación cruzada.
- Antes de dispensar o servir alimentos, o manejar vajillas y cubiertos para servir en el área de servicios de alimentos.



CUANDO TENGAS DUDA, ¡LAVA TUS MANOS!

Lavar tus manos es tu mejor defensa contra las enfermedades por alimentos y muchas enfermedades infecciosas.