



**Todas las vacunas de COVID-19 atraviesan el mismo proceso de autorización de la FDA. Cada vacuna es segura y eficaz. Vacúnese con aquella que está disponible para usted, no espere.**

	<b>Pfizer</b>	<b>Moderna</b>	<b>Janssen</b> (Johnson & Johnson)
<b>Dosis</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Eficaz en la prevención del virus con síntomas (en Estados Unidos)</b>	✓	✓	✓
<b>Eficaz en la prevención de una enfermedad grave</b>	✓	✓	✓
<b>Protege de la hospitalización y la muerte</b>	✓	✓	✓
<b>Edad de uso</b>	<b>16+</b>	<b>18+</b>	<b>18+</b>
<b>Crea protección</b>	Alrededor de los 14 días después de la segunda dosis	Alrededor de los 16 días después de la segunda dosis	Alrededor de los 16 días después de la segunda dosis
<b>Efectos secundarios leves después de la vacunación</b>	Común	Común	Común

Algunos efectos secundarios leves son normales después de la vacunación; es una señal de que su cuerpo está creando protección. Los efectos secundarios más comunes son: dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre y náuseas.