



تخضع كافة اللقاحات
ضد الكوفيد-19
لعملية نفسها
الحصول على تصريح
من إدارة الأغذية
والأدوية. إن كل لقاح
سليم وفعال.
تلق اللقاح المتاح
لك - لا تنتظر.

	فايزر (Pfizer)	موديرنا (Moderna)	جانسن (جونسن وجونسون) Janssen (Johnson & Johnson)
الجرعات	2	2	1
فعال في الوقاية من الفيروس الذي يُظهر عوارض (في الولايات المتحدة)	✓	✓	✓
فعال في الوقاية من المرض الحاد	✓	✓	✓
يحمي من الدخول إلى المستشفى والموت	✓	✓	✓
العمر المناسب للاستعمال	16+	18+	18+
بناء عناصر الحماية	بعد 14 يوماً تقريباً من تلقي الجرعة الثانية	بعد 14 يوماً تقريباً من تلقي الجرعة الثانية	بعد 14 يوماً تقريباً من تلقي الجرعة الثانية
آثار جانبية خفيفة بعد تلقي اللقاح	شائع	شائع	شائع

من الطبيعي أن يظهر بعض الآثار الجانبية الخفيفة بعد تلقي اللقاح، وهذه دلالة على أن جسدك يبني عناصر الحماية. ويشمل معظم الآثار الجانبية الشائعة: الآلام مكان الحقنة، والتعب والصداع والآلام في العضلات والبرودة والحرارة والغثيان.