

گونه های جدید ویروس که راحت تر منتشر می شوند می توانند موارد ابتلا به کووید 19 را افزایش دهند.

در حال حاضر، کاهش روند انتشار بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است

ویروس ها پیوسته از طریق جهش در حال تغییر هستند و انتظار می رود با گذشت زمان، گونه های جدیدی از ویروس به وجود آیند.



مشخص شده است که ویروس عامل کووید 19 به طور متوسط هر دو هفته، یک جهش جدید دارد.



برخی از گونه ها ممکن است قابلیت انتقال بیشتری داشته باشند یا اینکه نسبت به واکسن پاسخ کمتری دهند؛ بنابراین پیشگیری از قرار گرفتن در معرض آنها حائز اهمیت است.




افرادی که به میشیگان سفر کرده اند و یا کسانی که در معرض گونه جدید قرار گرفته اند باید به مدت 14 روز قرنطینه شوند (عدم امکان پایان زود هنگام قرنطینه) و نیز آزمایش دهند.



از ماسک استفاده کنید
برای محافظت بیشتر می توان از یک محافظ صورت (شیلد) روی ماسک استفاده کرد.



فاصله حداقل 6 پای (2 متری) را رعایت کنید



از گردهمایی در محیط های سر بسته خودداری نمایید



آزمایش دهید



در صورت امکان، واکسیناسیون را انجام دهید

