

افحصي نفسك اليوم للكشف عن فيروس أتش أي في - من أجل مصلحة طفلك



الأمهات المصابات بفيروس أتش أي في يمكن أن ينقلن هذه العدوى إلى أطفالهن.

- ◆ لا أحد محصّن ضد الإصابة بعدوى فيروس أتش أي في.
- ◆ النساء الشابات أكثر تعرضاً من غيرهن للإصابة بعدوى فيروس أتش أي في أو مرض الأيدز.
- ◆ يُبين فحص الدم إن كانت الأم مصابة بفيروس أتش أي في.
- ◆ بفضل المعالجة، نادراً ما تنقل الأمهات المصابة بفيروس أتش أي في العدوى إلى أطفالهن.
- ◆ إن كانت نتيجة فحصك إيجابية لفيروس أتش أي في ، فعليك أن تحرصي أيضاً على فحص أطفالك.

أحم صحتك وصحة طفلك

- كلما سارعت بإجراء الفحص، كلما استبقت الأمور في تحسين صحتك وحماية طفلك.
- ولا يمكن أخذ طفلك منك بمجرد أن نتيجة فحصك إيجابية فقط.
- اسأل طبيبك أو ممرضتك لإجراء فحص فيروس أتش أي في اليوم!
- استلني طبيبك عن برنامج Healthy Start ("هيلثي ستارت" - البداية الصحية).
- يقدم برنامج Healthy Start لك ولطفلك المساعدة في الحصول على أفضل رعاية ممكنة أثناء حملك وبعد الوضع!

الفيروس (أتش أي في) هو المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (أيدز). ونظراً لعدم وجود علاج شاف لمرض الأيدز، فتعتبر العدوى تهديداً صحياً خطيراً على جميع الناس. تتزايد عدوى فيروس أتش أي في بين النساء من مختلف مراحل العمر. إن كنت حاملاً ولديك عدوى فيروس أتش أي في ، فيمكن أن تنقلها إلى طفلك. ولكن هناك خطوات يمكنك إتخاذها لحماية طفلك من الإصابة بالعدوى وبحيث تساعدن في نفس الوقت في المحافظة على عافيتك لفترة أطول.



يمكن أن ينتقل فيروس أتش أي في من الأم إلى طفلها خلال الحمل، والمخاض والولادة، والرضاعة من الثدي أيضاً. جميع الأطفال المصابين بعدوى فيروس أتش أي في تقريباً أصيبوا بها من أمهاتهم - والأمهات قادرات على منع هذا!

فحص واحد قد يُنقذ حياة طفلك...

افحصي نفسك اليوم!

ينص القانون أنه يتوجب على جميع الحوامل إجراء فحص فيروس
أتش أي في خلال زيارتهن الأولى للرعاية السابقة للولادة ومن
المستحسن إجراء الفحص مرة أخرى قبل حلول ٣٦ أسبوعاً من الحمل .
اسألي طبيبك عن فحص فيروس أتش أي في .
عليك إعطاء موافقتك الخطية لإجراء فحص فيروس أتش أي في .

كيفية إنتشار عدوى فيروس أتش أي في

يمكن إنتشار عدوى فيروس أتش أي في من خلال ملامسة سوائل بدن الشخص المصاب . تتضمن هذه السوائل كلاً من :

- ◆ الدم (الأمهات إلى الأطفال والمشاركة في استخدام الأبر)
- ◆ المنّي (الجنس)
- ◆ إفرازات المهبل (الجنس)
- ◆ حليب الثدي

الهواتف الساخنة المخصصة للأمراض المنقولة جنسياً / فيروس أتش أي في

باللغة الإنكليزية (في ولاية ميشيغان) - 1-800-872-AIDS (872-2437)

باللغة الإسبانية (في ولاية ميشيغان) - 1-800-872-AIDS (872-2437)

(للصم في ولاية ميشيغان) TTY-TDD - 1-800-649-3777

مراكز مكافحة الأمراض على مستوى وطني - 1-800-CDC-INFO (232-4636)

(بريد الكتروني) cdcinfo@cdc.gov (للصم - TTY) 1-888-232-6348

موارد أخرى

الخط الساخن للتربية الوالدية وصحة العائلة - 1-800-531-5151 أو 1-800-313-961-BABY

برنامج WIC - 1-800-26-BIRTH (24784)

الخط الساخن لبرنامج العنف العائلي (7233) 1-800-799-SAFE

الخط الساخن لبرنامج العنف العائلي للصم TDD - 1-800-787-3224

برنامج المساعدة في تغطية تكاليف أدوية مرض الأيدز بولاية ميشيغان - 1-888-826-6565

(برنامج الباب الرابع من قانون راين وايت للموارد الطارئة الشاملة لمرض الأيدز)

Ryan White CARE Act Title IV Program — 313-456-4365

Department of Human Services (DHS) — 1-877-FIA-AIDS (342-2437)

1-800-EARLY-ON (327-5966) Early On Program — (برنامج التبكير)

برنامج الانقطاع عن التدخين في المرحلة السابقة للولادة - 517-335-9750

خط الإحالة الوطني لشؤون الإدمان على الكحول ومعاقرة المخدرات - 1-800-736-0253

إدارة الصحة المجتمعية لولاية ميشيغان

شعبة شؤون العافية الصحية ومكافحة الأمراض

قسم شؤون الوقاية والتدخل في أمراض فيروس أتش أي في / الأيدز

517-241-5900

<http://www.michigan.gov/mdch>

<http://mihivnews.com>

صممت هذه النشرة من قبل المركز المعني بشؤون التثقيف والأبحاث لفيروس أتش أي في بجامعة جنوب فلوريدا،

جامعة جنوب فلوريدا - الموقع الإلكتروني: www.USFCenter.org

MDCH is an Equal Opportunity Employer, Services, and Programs Provider.

3,500 printed at \$0.616 each with a total cost of \$2,154.71.