អត្ថបទព័ត៌មានថ្នាំបង្ការជម្ងឺ

ថ្នាំបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយធំ

(ថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំ ថ្នាំដំលៃមានមរោគអសកម្ម)

ព័ត៌មានដំលៃអ្នកត្រូវដឹង

2013-2014

Many Vaccine Information Statements are available in Spanish and other languages. See www.immunize.org/vis

មានអត្ថបទព័ត៌មានអំពីថ្នាំបង្ការជាច្រើនដំលៃ ឬនហ៊ាៈពុមពជាភាសាអង់គ្លេស ភាសាអេស្ប៉ាញ និងជាភាសាដទៃទៀត ។ សូមទស្សនាគេហទំព័រដំលៃមានអាសយដ្ឋាន www.immunize.org/vis

1 ហេតុអ្វីអ្នកត្រូវទទួលថ្នាំបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយធំ ?

ជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយធំ ("ផ្តាសាយធំ") គឺជាជម្ងឺធំលង ដំលស្លាយកាយទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅរៀងរាល់រដូវរងារ ដំលជាធមមតា គឺពីរវាងខែតុលា ដល់ខែឧសភា ។

ជម្ងឺផ្តាសាយធំ វាបណ្តាលមកពីមរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ ហើយអាចឆ្លងរាលដាលតាមការកុអក កណ្តាស និងការនៅ កុបរែគ្នា ។

មនុស្សគ្រប់ប្រអាចកើតជម្ងឺផ្តាសាយធំហានទាំងអស់ តហែនិភ័យនក្បែរកើតជម្ងឺនេះ មានភាពខុពស់កុនុងចំណាមកុមារ ។ រាគសញ្ញាជម្ងឺនេះបង្ហាញឡើងភ្លាមៗពលេអ្នកឆ្លងមរោគ ហើយវាស្ថិតនាបីបួនថ្ងៃ រាគសញ្ញាមានដូចជា ៖

- គ្រុនក្តៅ/គ្រុនញាក់
- ឈឺប៉ពង្រុក
- ឈឺសាច់ដុំ
- លុហិតលុហៃ
- កុអួក
- ឈឺកុហាល
- ហ៊ារសំហរ ឬតឹងច្រមុះ

ជម្ងឺផ្តាសាយធំ នេះ វាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សខុលៈឈឺខុលាំងជាងអ្នកដទៃ ។ អ្នកទាំងនាៈមានដូចជា កុមារតូចៗ មនុស្សចាស់មានអាយុ 65 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងនេះ សុតរីមានផ្ទៃពោះ និងអ្នកដំលមានសុខានភាពសុខភាពមិនមាំមួនណាមួយដូចជា—ជម្ងឺបេះដូង សួត និងតមរងនាម ឬអ្នកដំលមានបុរព័នធភាពស្តាំនឹងជម្ងឺខុសាយ ។ ថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំ មានសារៈសំខាន់ពិសសេសមុរាបអ្នកទាំងអស់នេះ និងអ្នកដទៃដំលសុថិតនាជិតអ្នកទាំងនេះ ។

ជម្ងឺផ្តាសាយធំនុះក៏អាចនាំឲ្យកើតជម្ងឺរលាកសួត និងធ្វើឲ្យសុខានភាពជម្ងឺចាស់កានតធ្ងែនធ្ងរឡើង ។ ចំពៈកុមារវ័យអាចបណ្តាលកុមរេាគ និងបុរកាច ។

កុនុងមួយឆ្នាំមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នាំសហរដ្ឋអាមេរិកសុលាប់ហាត់បង់ជីវិតដោយសារ ជម្ងឺផ្តាសាយធំ និងមួយចំនួនធំទៀតត្រូវចូលសមុរាកពទុយ ។

ថ្នាំបង្ការជម្ងឺ ផ្តាសាយធំ គឺជាការការពារដ៏ប្រសើរបំផុត ដំលយើងមានសមុរាប់ការពារជម្ងឺនេះ និងជម្ងឺដទៃដំលែកីតឡើងដោយសារអ្នកឆ្លងជម្ងឺនេះ ។ ថ្នាំបង្ការជម្ងឺ ផ្តាសាយធំកុំអាចជួយការពារមិនឲ្យជម្ងឺនេះឆ្លងពីមនុស្សមុនាក់ទៅមនុស្សមុនាក់ទៀតបានដរែ ។

2 ថ្នាំបង្ការជម្ងឺ ផ្តាសាយធំ មរោគអសកម្ម

ថ្នាំបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយធំ មានពីរប្រភេទ ៖

អ្នកត្រូវទទួលថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំមរោគអសកម្មដំលមិនមានរួមផ្សំដោយមរោគដំលនាំមានជីវិតរបស់ជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយធំឡើយ ។ ថ្នាំបង្ការប្រភេទនេះ តូវផ្តល់ឲ្យការចាក់ចូលកុនុងសាច់ដុំដោយម្ជុល ហើយដំលជាញយៗ តូវហានគហៅថា "ការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំ" ។

ថ្នាំបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយធំមួយប្រភេទទៀតដំលមានបញ្ចូលមរោគផ្តាសាយធំនាវស័តខែសាយ (មរោគដំលមានកមលាំងខុសាយ) តូវប្រើដោយការហាញបញ្ចូលតាមរន្ធច្រមុះ ។ *បង្ការប្រភេទនេះ តូវហានរៀបរាប់បង្ហាញដោយអត្ថបទព័ត៌មានអំពីថ្នាំបង្ការដាច់ដោយឡែកមួយទៀត ។*

គ្រូពទុយសូមណែនាំឲ្យអ្នកត្រូវទទួលថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ ចំពៈកុមារដំលមានអាយុចាប់ពី 6 ខែ ដល់ 8 ឆ្នាំ គួរហានទទួលថ្នាំបង្ការប្រភេទនេះ ចំនួនពីរកមរិតក្នុងថ្នាំដំលែតូវប្រើ នៅ កុនុងឆ្នាំដំបូងដំលពួកគទើបទទួលថ្នាំបង្ការជម្ងឺនេះជាលើកដំបូង ។

ជានិច្ចកាល ថ្នាំបង្ការជម្ងឺ ផ្តាសាយធំ តងែតមានការផ្លាស់ប្តូរ ។ កុនុងឆ្នាំនីមួយៗ ថ្នាំបង្ការជម្ងឺ ផ្តាសាយធំតូវហានផលិតដើមប្បីការពារចំពៈមរោគបុរកទេដំលែអាចនឹងបង្កកឲ្យកើតជម្ងឺនេះកុនុងឆ្នាំនាៈ ។ ដូចយើងហានដឹងហើយថា ថ្នាំបង្ការជម្ងឺ ផ្តាសាយធំ វាមិនអាចបង្ការមិនឲ្យកើតជម្ងឺ ផ្តាសាយធំហានគ្រប់ករណីឡើយ តុអ្វើដំលែយើងធ្វើគឺជាវិធីការពារដ៏ប្រសើរបំផុតរបស់យើងបុរឆាងនឹងជម្ងឺ នេះ ។ ថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំដំលែមានមរោគអសកម្មមានបុរសិទ្ធិភាពបុរឆាងនឹងមរោគគ្រុនផ្តាសាយធំចំនួន 3 ឬ 4 បុរភេទ ផ្សងេៗគ្នា ។

ថ្នាំបង្ការបុរភេទនេះតូវប្រើពលេចំនួនបុរហាលែជា 2សប្តាហ៍កុរាយការទទួល ដើមប្បីអាចបង្កើតរបាងការពារមរោគហាន ហើយរបាងការពារនេះនឹងសុថិតនាមានបុរសិទ្ធិភាពចំនួនបីបួនខែ ទាមួយឆ្នាំ ។

ជម្ងឺមួយចំនួនដំលមិនមុនៃបណ្តាលមកពីមរោគគ្រុនផ្តាសាយធំជាញយៗតូវហានគយេលច្បាស់ថាគឺជា ជម្ងឺផ្តាសាយធំបណ្តាលមកពីមរោគនជម្ងឺនេះ ។ ថ្នាំបង្ការជម្ងឺ ផ្តាសាយធំ នឹងមិនអាចការពារមិនឲ្យជម្ងឺទាំងនេះកើតឡើងហានឡើយ ។ ថ្នាំបង្ការបុរភេទនេះ អាចការពារហានតជែជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយធំតប៉ុណ្ណាៈទេ។

ថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំ "កុនុងកមរិតប្បីបុរាស់ខពស់" មានឲ្យប្បីបុរាស់សមុរាប់មនុស្សចាស់ដំលែមានអាយុចាប់ពី 65 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងនេះ ។ អ្នកដំលែផ្តល់ថ្នាំបង្ការឲ្យអ្នក អាចផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវព័ត៌មានបនុថែមទៀត ។

បុរភេទខុលៈនថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំដំលែមានមរោគអសកម្មមានផ្សំទ្វាដោយសារជាតុហារតដើមប្បីការពារភាពជូរអួម ដំលែហាថាកុនុងបរិមាណដ៏តិចតួចមួយ ដំលែហាថាសារជាតុធមរ៉ូសាល់ (សារជាតុផ្សំះ និងបុរឆាងមរោគផ្សិត) ។ ការសិកុសាសារជុរាវជាច្បើនហានបង្ហាញឲ្យឃើញថា សារជាតុធមមរ៉ូសាលដំលែមានល្អាយនាកុនុងថ្នាំបង្ការមិនបណ្តាលឲ្យមានគ្រាៈថ្នាក់អ្វើឡើយ តបើអ្នកមិនទុកចិត្តចំពៈសុវត្ថិភាពនថ្នាំបង្ការបុរភេទនេះទេ អ្នកអាចជ្រើសរើសប្បីថ្នាំបង្ការជម្ងឺនេះ បុរភេទផ្សងេហាន ។

3 បុរភេទមនុស្សដំលែមិនអាចទទួលថ្នាំបង្ការបុរភេទនេះហាន

ចូរប្រាប់គ្រូពទុយដំលែជាអ្នកផ្តល់ ថ្នាំបង្ការឲ្យអ្នកហានដឹង ៖

- បុរសិនបើអ្នកមានបុរតិកមមធាតុធ្ងន់ធ្ងរ (គ្រាៈថ្នាក់ដល់ជីវិត) ។ បុរសិនបើអ្នកធ្លាប់មានបុរតិកមមធាតុធ្ងន់ធ្ងរដំលែអាចគ្រាៈថ្នាក់ដល់ជីវិត ក្រាយពលេអ្នកហានទទួលមួយកមរិតប្បីនថ្នាំបង្ការជម្ងឺ ផ្តាសាយធំ ឬមានបុរតិកមមធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងធាតុគែណាមួយនថ្នាំបង្ការនេះ អ្នកមិនតូវប្រើថ្នាំបង្ការបុរភេទនេះទៀតឡើយ ភាគច្រើន តមិនទាំងអស់នាៈទេ នបុរភេទថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំ មានលាយទាំងសារជាតុនាកុនុងស៊ិតមានកុនុងបរិមាណតិចតួចមួយ ។
- បើអ្នកធ្លាប់មានបុរជុំរាគសញ្ញាជម្ងឺប្បូព័ន្ធចសរសប្បៃសាទធ្ងន់ធ្ងរ (Guillain-Barré Syndrome) (ជម្ងឺដំលធ្វើឲ្យពិការរាងកាយ

U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

ឬដង្កែគ្រុហៅផ្សេងដែរថា GBS) ។ មនុស្សខ្លះដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិតឹតតែងជម្ងឺនេះ មិនគួរប្រើថ្នាំបង្ការនេះទេ ។ បុរការនេះត្រូវពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។

- បុរសនីមួយៗមិនសូវលូកកូនក្នុងខ្លួន ។ គ្រូពុំទេ្យអាចណែនាំឲ្យអ្នករង់ចាំសិន ។ តក្រៃយពីនេះអ្នកត្រូវត្រឡប់មកជួបគ្រូពេទ្យវិញ ។

4 ហានិភ័យបណ្តាលពីប្រតិកម្មថ្នាំបង្ការ

ថ្នាំបង្ការ ក៏ដូចជាថ្នាំដទៃទៀតដែរ គឺតង្កែអាចកើតមានផលប៉ះពាល់ ។ ផលប៉ះពាល់ទាំងនេះ ជាធម្មតាមិនធ្ងន់ធ្ងរ ហើយនឹងហាត់ទាញដាយខ្លួនឯង ។

ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ក៏អាចកើតឡើងបានដែរ តុជាករណីមួយដែលកម្រកើតមានណាស់ ។ ថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំមានមូរោគអសកម្មជាថ្នាំបង្ការដែលមិនមានបញ្ចូលមូរោគផ្តាសាយធំនៅមានជីវិតឡើយ ដូចនេះ ការដែលគិតថាអ្នកអាចកើតជម្ងឺផ្តាសាយធំបណ្តាលពីការចាក់ថ្នាំបង្ការប្រភេទនេះ គឺជារឿងមួយដែលមិនអាចកើតឡើងបានឡើយ ។

ខ្សោយចង្កូសនុលប់កូនងរយៈពលេខ្លី និងរាគសញ្ញាផ្សងៗទៀតដែលពាក់ពន្ធ (ដូចជាចលនាញាច ឬកនុត្តរាក) អាចកើតឡើងបានក្រោយពីទទួលការធ្វើទម្រង់ការវជ្ជជសាស្ត្រណាមួយ ដាយរួមទាំងការចាក់ឬបន្តក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្សងដែរ ។ ការអង្គុយចុះ ឬទម្រតេខ្លួនដកេប្រហែលជា 15 នាទី ក្រោយការចាក់ ឬបន្តក់ថ្នាំបង្ការ អាច្ជួយការពារពីការខ្សោយចង្កសនុលប់ និងការរងរបួសសុនាមឬបណ្តាលពី ការដួល ។ សូមប្រាប់ឲ្យគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអាយបានដឹង បុរសិនបីបីអ្នកមានអារម្មណ៍វិលមុខ ឬឈឺក្បាលតិចៗ ឬមីលឃើញអ៊ីខុសបុរកុរតី ឬហឹតកុរច្បាក ។

ផលប៉ះពាល់កនុងកម្រិតសុរាល បនទាប់ពីហានទទួលថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំមានមូរោគអសកម្ម ៖

- ឈឺ ឡើងកុរហម ឬហឺម តុរង់បរិវ៉ែណចាក់មុជុលចូលកនុងសាច់
- ភាពសុអកសុអាក កនកែឈឺ ឡើងកុរហម ឬរមាស់ កុអក
- គុរនកុតា
- ឈឺចាប់លីរាងកាយ
- ឈឺក្បាល
- រមាស់លីសុបូកែ
- ល្ហិតល្ហៃ

បីមានប្រវត្តិកម្មមកីតឡើង ជាធម្មមតាវានឹងកីតឡើងកុលាមៗបនទាប់ពីការចាក់ ហើយវានឹងសុចិតនៅ 1 ឬ 2 ថ្ងៃ ។

ផលប៉ះពាល់កនុងកម្រិតមធ្យម បនទាប់ពីហានទទួលថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំមានមូរោគអសកម្ម ៖

- ចំពោះកុមារតូចដែលទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំ និងថ្នាំបង្ការជម្ងឺរលាកសួត (PCV13) កនុងពលេតមួយ្ល អាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យខ្ពសចំពោះភាពបុរកាច បុណ្តាលពីគុរនកុតា ។ សូមសួរគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ដើមបីហានទទួលព័ត៌មានបនថែម ។ សូមប្រាប់ឲ្យគ្រូពេទ្យអាយហានដឹងផង បុរសិនបីកុមារដែលនឹងចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំ ធ្លាប់បុរកាចកាលពីពលេមុន ។

ផលប៉ះពាល់កនុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ បនទាប់ពីហានទទួលថ្នាំបង្ការផ្តាសាយធំមានមូរោគអសកម្ម ៖

- ប្រតិកម្មធាតុធ្ងន់ធ្ងរអាច្កើតមាន ក្រាយពលេទទួលថ្នាំបង្ការប្រភេទណាមួយរួច (ការហានសុមានគឺថាប្រតិកម្មកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរបបែននេះ អាចកើតមានតិចជាង 1 ដងកនុងមួយលានកម្រិតប៉ុនី) ។
- មានភាពដែលអាចកើតឡើងហានកនុងកម្រិតទាបចំពោះលទ្ធភាពដែលថា ថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំដែលមានមូរោគអសកម្ម អាចមានបណ្តាគុណសញ្ញាជម្ងឺបុរពន្ធសរសុបេ្រសាទធ្ងន់ធ្ងរ (GBS) គឺមិនមានកើតឡើងច្រុនជាង 1 ឬ 2 ករណីឡើយ កនុងមនុស្សមួយលាននាក់ដែលហានចាក់ថ្នាំបង្ការនេះ ។ បុរតិកម្មមបុរកទេនេះ គឺមានកម្រិតទាបឆ្ងាយជាងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កកឡើងដាយជម្ងឺផ្តាសាយធំ ដែលអាចការពារហានដាយការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំ ។

សុវត្ថិភាពនថ្នាំបង្ការ ជានិចកាលតង្កែហានទទួលការតុរតពិនិត្យ ។ សមុរាបព័ត៌មានបនថែមសូមទសុសនា គហេទំព័រ ៖
www.cdc.gov/vaccinesafety/

Translation provided by the California Department of Public Health
DCH–0457CA

5 តើតុរូវធ្វើដូចម្តេចបើបុរតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើង?

តីខ្ញុំតុរូវរកមីលអ្វី?

- តុរូវរកមីលអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកហរមុត ដូចជាសញ្ញានានាអ៊ំពីបុរតិកម្មមធ្ងន់ធ្ងរ គុរនកុតាខ្លាង ឬការបុរបែួលអាកបបកិរយារបស់អ្នកជម្ងឺ ។

  សញ្ញានានាអំពីប្រតិកម្មកនុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរអាចមានរួមបញ្ចូលនូវការឡើងបនទាលតុរអាក ហឹមមុខ និងបំពង់ក ពីហាកដក ដង្ហើម បះដួងដរញាប់ វិលមុខ និងខ្សោយកមុលាង ។ សញ្ញាទាំងនេះ អាចកើតឡើងពីរបីនាទី ទាពីរបីម៉ាង កុរាយពីការទទួលថ្នាំបង្ការរួច ។

តីខ្ញុំតុរូវធ្វើអ៊ីខ្លះ?

- បីអ្នកគិតថាវាគឺជាប្រតិកម្មមកនុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ ឬជាភាពអាសន្នដទៃទៀតដែលអ្នកមីនអាចរង់ចាំហាន សូមហៅទូរស័ពទទាកាន់លខេ 9-1-1 ឬយកអ្នកជម្ងឺទាកាន់មនុទីរពទេ្យដែលនៅកបរែលាកអ្នកជាទីបំផុត ។ បីមិនដូចនេះទេ សូមហៅទូរស័ពទទាជួបគ្រូពទេ្យរបស់អ្នក ។
- បនទាប់មក អ្នកតុរូវរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មមុនេ ទាកាន់ប្រព័នធរាយការណ៍ហាតុការណ៍ប្រតិកម្មថ្នាំបង្ការជម្ងឺ (Vaccine Adverse Event Reporting System -VAERS) ។ គ្រូពទេ្យរបស់អ្នក អាចរាយការណ៍អពីបញ្ហានេះ ឬអ្នកអាចរាយការណ៍ដាយ្លួនឯង តាមរយៈគហេទំព័ររបស់ VAERS ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vaers.hhs.gov ឬដាយការហៅទូរស័ពទទាកាន់លខេ 1-800-822-7967 ។

VAERS គឺគ្មានតជាកនុលដែសម្រាប់រាយការណ៍អ៊ំពីប្រតិកម្មថ្នាតប៉ុណ្ណោះ ។ ពួកគមិនមនែជាអ្នកផ្តល់ដំបូន្មានវជ្ជសាស្ត្រដល់អ្នកឡើយ ។

6 កម្មវិធីជាតិផ្តល់សំណងចំពោះរបួសសុនាមបណ្តាលពីថ្នាំបង្ការ

កម្មវិធីជាតិផ្តល់សំណងចំពោះរបួសសុនាមបណ្តាលពីថ្នាំបង្ការ (National Vaccine Injury Compensation Program -VICP) គឺជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័នធ ដែលតុរូវបានបង្កើតឡើង សម្រាប់ផ្តល់សំណងដល់ពលរដ្ឋបដែលអាចរងរបួស បណ្តាលពីថ្នាំបង្ការណាមួយ ។

ចំពោះអ្នកណាដែលមានជំនឿថាខ្លួនបានរងរបួសបណ្តាលមកពីថ្នាំបង្ការជម្ងឺ អាចសិកុសាអ៊ំពីកម្មវិធីនេះ និងវិធីដាក់ពាកយទាមទារសំណង ដាយការហៅ ទូរស័ពទមកកាន់លខេ 1-800-338-2382 ឬទសុសនាគហេទំព័ររបស់ VICP ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.hrsa.gov/vaccinecompensation ។

7 តើខ្ញុំអាចហានដឹងព័ត៌មានអំពីថ្នាំបង្ការជម្ងឺដាយវិធីណា?

- សូមសួរគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ។ 1–888–767–4687
- ហៅទូរស័ពទមកកាន់នាយកដ្ឋានសុខាភិបាលបុរចាំមូលដ្ឋាន ឬបុរចារដ្ឋបរបស់អ្នក ។
- ទំនាក់ទំនងដាមួយនឹងមជ្ឈ មណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងការពារជម្ងឺ
  - ហៅទូរស័ពទមកកាន់លខេ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
  - ទសុសនាគហេទំព័ររបស់ CDC ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.cdc.gov/flu

Vaccine Information Statement (Interim)
Inactivated Influenza Vaccine
Cambodian
07/26/2013
42 U.S.C. § 300aa-26
AUTH: P.H.S., Act 42, Sect. 2126.

Office Use Only

ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខភាពស្នើសុំនូវពត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគពេញលក្ខណាត្រឹមត្រូវ, ការពិនិត្យមើលនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ បើយនិងការតម្រូវដាក់ពេលវលា សំរាប់ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៅអនាគត, ពត៌មានអំពីការចាក់បង្ការរោគនឹងថ្មើទៅមនីរ Michigan Care Improvement Registry ។ បុគ្គលទាំងឡាយមានសិទ្ធិស្នើសុំអោយអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខ ភាពមិនអោយបញ្ជូនពត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះទៅឲ្យកន្លែងទុកសំណុំរឿងបាន។