

សន្លឹកព័ត៌មានស្តីពីថ្នាំវ៉ាក់សាំង

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV Gardasil®
អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង

(Human Papillomavirus)

Many Vaccine Information Statements are available in Khmer and other languages. See www.immunize.org/vis
សន្លឹកព័ត៌មានស្តីពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាច្រើនមានជាភាសាខ្មែរ និងភាសាផ្សេងទៀត។ សូមចូលទៅ www.immunize.org/vis

1 តើមេរោគ HPV គឺជាមេរោគអ្វី?

មេរោគ human papillomavirus (HPV) គឺជាមេរោគតូចមួយដែលរកឃើញនៅទូទាំងប្រទេស។ បុរស និងស្ត្រីរួមភេទចំនួនជាងពាក់កណ្តាលឆ្លងមេរោគ HPV នៅពេលណាមួយក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។

បច្ចុប្បន្ន ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 20 លាននាក់ឆ្លងមេរោគនេះ ហើយមនុស្សប្រហែល 6 លាននាក់បន្ថែមទៀតបានឆ្លងមេរោគនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ជាធម្មតា មេរោគ HPV ឆ្លងតាមការប៉ះពាល់ផ្លូវភេទ។

មេរោគ HPV ភាគច្រើនពុំបង្កជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទេ ហើយបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯង។ ប៉ុន្តែ HPV អាចបង្កជំងឺមហារីកកស្វន់ចំពោះស្ត្រី។ ជំងឺមហារីកកស្វន់គឺជាជំងឺមហារីកនាំមុខទី 2 ដែលបណ្តាលឲ្យស្ត្រីស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅទូទាំងពិភពលោក។ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ស្ត្រីប្រហែល 12,000 នាក់កើតជំងឺមហារីកកស្វន់រៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយមនុស្សប្រហែល 4,000 នាក់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងស្លាប់បាត់ជីវិតដោយសារជំងឺនេះ។

មេរោគ HPV ក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺមហារីកជាច្រើនផងដែរដែលមិនសូវទូទៅ ដូចជាជំងឺមហារីករន្ធនិងប្រហោងយោនីចំពោះស្ត្រី និងជំងឺមហារីករន្ធតូច និងមាត់បំពង់ក (បំពង់ក គុលអណ្តាត និងដុំសាច់បំពង់ក) ចំពោះទាំងបុរស និងស្ត្រី។ មេរោគ HPV ក៏អាចបង្កជំងឺឫសលើប្រដាប់ភេទ និងឫសក្នុងបំពង់ក។

ពុំមានថ្នាំព្យាបាលមេរោគ HPV ទេ ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយចំនួន ដែលមេរោគនេះបង្ក អាចព្យាបាលបាន។

2 ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV៖ ហេតុអ្វីត្រូវចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង?

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV ដែលលោកអ្នកកំពុងទទួលនេះ គឺជាប្រភេទមួយនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងពីរប្រភេទ ដែលអាចចាក់ដើម្បីបង្ការមេរោគ HPV បាន។ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះអាចចាក់បានទាំងបុរស និងស្ត្រី។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះអាចបង្ការការណាត់ច្រើននៃជំងឺមហារីកកស្វន់ចំពោះស្ត្រី ប្រសិនបើបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមុនពេលឆ្លងមេរោគនេះ។ លើសពីនេះ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះអាចបង្ការជំងឺមហារីករន្ធនិងប្រហោងយោនីបានចំពោះស្ត្រី និងឫសលើប្រដាប់ភេទ និងជំងឺមហារីករន្ធតូចចំពោះទាំងបុរស និងស្ត្រី។

ការការពារដោយថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV នេះត្រូវបានរំពឹងថា មានរយៈពេលវែង។ ប៉ុន្តែការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមិនអាចជំនួសការពិនិត្យរកជំងឺមហារីកកស្វន់ឡើយ។ ស្ត្រីគួរតែធ្វើតេស្តរកជំងឺមហារីកកស្វន់ជាប្រចាំ។

3 តើអ្នកណាគួរទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV នេះ ហើយនៅពេលណា?

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV គឺចាក់ 3 ដូស។
ដូសទី 1 ឥឡូវនេះ
ដូសទី 2 1 ទៅ 2 ខែ បន្ទាប់ពីដូសទី 1
ដូសទី 3 6 ខែបន្ទាប់ពីដូសទី 1

ដូសបន្ថែម (ដូសរំពួក) ពុំបានណែនាំឲ្យចាក់ទេ។

ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាទម្លាប់

- ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV នេះត្រូវសម្រាប់ក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុសអាយុ 11 ឬ 12 ឆ្នាំ។ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះអាច ចាក់ចាប់ផ្តើមនៅអាយុ 9 ឆ្នាំ។

ហេតុអ្វីថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV ត្រូវបានណែនាំឲ្យចាក់នៅអាយុ 11 ឬ 12 ឆ្នាំ? មេរោគ HPV គឺជាមេរោគងាយឆ្លង សូម្បីតែជាមួយដៃគូរួមភេទតែម្នាក់ក៏ដោយ។ នោះជាមូលហេតុដែលជាការសំខាន់ត្រូវចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV មុនពេលមានការប៉ះពាល់ផ្លូវភេទ។ ម្យ៉ាងទៀត ការឆ្លើយតបនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងគឺល្អប្រសើរនៅវ័យនេះជាងវ័យចាស់ជាងនេះ។

ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងឲ្យទាន់ពេល


ថ្នាំវ៉ាក់សាំងត្រូវបានណែនាំសម្រាប់មនុស្សដូចខាងក្រោម ដែលពុំបានទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងគ្រប់ 3 ដូស។

- ស្ត្រីអាយុ 13 ដល់ 26 ឆ្នាំ
- បុរសអាយុ 13 ដល់ 21 ឆ្នាំ

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះអាច ផ្តល់ឲ្យបុរសអាយុ 22 ឆ្នាំដល់ 26 ឆ្នាំដែលពុំបានទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះគ្រប់ 3 ដូស។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានណែនាំសម្រាប់បុរសអាយុ 26 ឆ្នាំ ដែលរួមភេទជាមួយនឹងបុរស ឬដែលប្រព័ន្ធស៊ាចុះខ្សោយ ដោយសារមេរោគអេដស៍ ជំងឺ ឬឱសថដទៃទៀត។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV អាចចាក់ក្នុងពេលដំណាលគ្នានឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងដទៃទៀត។



4 មនុស្សមួយចំនួនមិនគួរចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV ទេ ឬគួររង់ចាំ។

- ជនណាដែលធ្លាប់មានប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីនិងធាតុផ្សំនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV ឬដូសមុននៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV ដែលគំរាមដល់អាយុជីវិត មិនគួរទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះទេ។ សូមប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក ប្រសិនបើអ្នកដែលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង មានប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីទៅនឹងមេដំបែ។
- ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV ពុំត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV ពេលមានផ្ទៃពោះ មិនមែនជាហេតុផលក្នុងការពិចារណាបញ្ចប់ការមានផ្ទៃពោះឡើយ។ ស្ត្រីបំបៅដោះកូនអាចទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះបាន។
- អ្នកដែលមានជំងឺស្រាល ពេលគ្រោងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV នេះ នៅតែអាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបាន។ អ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬធ្ងន់ធ្ងរ គួររង់ចាំសិនរហូតទាល់តែពួកគេជាសះស្បើយសិន។

5 តើមានហានិភ័យអ្វីខ្លះដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះ?

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងទូទាំងពិភពលោករយៈពេលប្រហែល ៨ ឆ្នាំកន្លងមកហើយ ហើយថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះមានសុវត្ថិភាពណាស់។

ទោះជាយ៉ាងណា ថ្នាំវ៉ាក់សាំងអាចបង្កបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ។ ហានិភ័យដែលថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬធ្វើឲ្យស្លាប់បានបំផុតនោះ គឺមានកម្រិតតិចតួចបំផុត។

កម្រមានប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីដែលគំរាមដល់អាយុជីវិតដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំងណាស់។ ប្រសិនបើមានប្រតិកម្ម វានឹងមានរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីទៅប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង។

បញ្ហាស្រាល និង ធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើន ត្រូវបានគេដឹងថា កើតឡើងជាមួយនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV នេះ។ បញ្ហាទាំងនេះមិនកើតឡើងរយៈពេលយូរទេ ហើយបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯង។

- ប្រតិកម្មលើដៃដែលចាក់ថ្នាំ
 - ការឈឺចុកចាប់ (មនុស្សប្រហែល ៨ នាក់ក្នុងចំណោម ១០ នាក់)
 - ឡើងក្រហម ឬហើម (មនុស្សប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោម ៤ នាក់)
- គ្រុនក្តៅ ៖
 - ស្រាល (100° F) (មនុស្សប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោម 10 នាក់)
 - ធ្ងន់ធ្ងរ (102° F) (មនុស្សប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោម 65 នាក់)
- បញ្ហាដទៃទៀត ៖
 - ឈឺក្បាល (មនុស្សប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោម 3 នាក់)
- ការសន្លប់ ៖ ការសន្លប់រយៈពេលខ្លី និងរោគសញ្ញាពាក់ព័ន្ធ (ដូចជា កន្ត្រាក់) អាចកើតឡើង បន្ទាប់ពីដំណើរការវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផងដែរ។ ការអង្កេត ឬដេកប្រហែល 15 នាទីបន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងអាចជួយបង្ការការសន្លប់ និងរបួសដោយសារដួល។ សូមប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក ប្រសិនបើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍វិលមុខ ឬការមើលឃើញមានការប្រែប្រួល ឬហឹងក្រចៀក។

ដូចថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ដែរ គេនឹងបន្តតាមដានរបបបញ្ជាខុសធម្មតា ឬធ្ងន់ធ្ងរនានា ដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគ HPV។

DCH-1339CA
 AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.
 Translation provided by the Immunization Action Coalition

6 ចុះបើមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ?

តើខ្ញុំគួរប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីខ្លះ?

• សូមប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកក្រហម ដួចជាសញ្ញាបង្ហាញពីប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ គ្រុនក្តៅខ្លាំង ឬការប្តូរឥរិយាបថ។

សញ្ញាបង្ហាញពីប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ អាចរួមបញ្ចូលកន្ទួល ហើមមុខ និងបំពង់ ពិបាកដកដង្ហើម ចង្វាក់បេះដូងញាប់ វិលមុខ និងកម្លាំងចុះខ្សោយ។ បញ្ហាទាំងនេះនឹងចាប់ផ្តើមកើតឡើងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីទៅប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង។

តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីខ្លះ?

• ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថា វាគឺជាប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ ឬស្ថានភាពណាមួយបន្ទាន់ដទៃទៀតដែលមិនអាចរង់ចាំបាន សូមទូរស័ព្ទទៅ 9-1-1 ឬយកអ្នកជំងឺទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលជិតបំផុត។ បើមិនអញ្ចឹងទេ សូមទូរស័ព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក។

• បន្ទាប់មក ប្រតិកម្មគួររាយការណ៍ទៅប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំវ៉ាក់សាំង (Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS))។ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអាចដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍នេះ ឬលោកអ្នកអាចរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់តាមរយៈវេបសាយ VAERS នៅ www.vaers.hhs.gov ឬតាមរយៈហៅទូរស័ព្ទមក 1-800-822-7967។

VAERS គឺសម្រាប់តែការរាយការណ៍ប្រតិកម្មផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះ។ ប្រព័ន្ធនេះពុំផ្តល់ជំនួយសេវាវេជ្ជសាស្ត្រទេ។

7 កម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង (National Vaccine Injury Compensation Program)

កម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង (National Vaccine Injury Compensation Program (VICP)) គឺជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធ ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង់សងអ្នកទាំងឡាយដែលអាចរងរបួសដោយសារតែថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយចំនួន។

បុគ្គលដែលជឿជាក់ថា ខ្លួនអាចធ្លាប់រងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយ អាច ធ្វើការសិក្សាអំពីកម្មវិធី និងអំពីការដាក់ពាក្យទាមទារសំណង ដោយទូរស័ព្ទមក 1-800-338-2382 ឬចូលទៅវេបសាយ VICP នៅ www.hrsa.gov/vaccinecompensation។

8 តើខ្ញុំអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតដោយរបៀបណា?

- សូមសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក។ 1-888-767-4687
- សូមទូរស័ព្ទទៅក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ ឬនៅមូលដ្ឋានរបស់លោកអ្នក។
- ទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺឆ្លង (CDC) ៖
 - ទូរស័ព្ទមកលេខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
 - ចូលទៅវេបសាយ CDC នៅ www.cdc.gov/vaccines

Vaccine Information Statement (Interim)
HPV Vaccine (Gardasil)

5/17/2013 Khmer
 42 U.S.C. § 300aa-26



ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខភាពស្មើស្ម័គ្រនូវព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគពេញលក្ខណ៍ត្រឹមត្រូវ. ការពិនិត្យមើលនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ហើយនិងការកម្រិតដាក់ពេលវេលា សំរាប់ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៅអនាគត. ព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនឹងផ្ញើទៅមន្ទីរ Michigan Care Improvement Registry ។ បុគ្គលទាំងឡាយមានសិទ្ធិស្មើស្ម័គ្រអោយអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខ ភាពមិនអោយបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំ បង្ការរោគនេះទៅឲ្យកន្លែងទុកសំណុំរឿងបាន។