

សន្លឹកព័ត៌មានស្តីពីថ្នាំវ៉ាក់សាំង

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង

Many Vaccine Information Statements are available in Khmer and other languages. See www.immunize.org/vis
សន្លឹកព័ត៌មានស្តីពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាច្រើនមានជាភាសាខ្មែរ និងភាសាផ្សេងទៀត។ សូមចូលទៅ www.immunize.org/vis

1 តើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាជំងឺអ្វី?

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ដល់ថ្លើម។ ជំងឺនេះបង្កឡើងដោយមេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B។

- ក្នុងឆ្នាំ 2009 មានមនុស្សប្រហែល 38,000 នាក់បានឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B។
- មួយឆ្នាំៗ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក មនុស្សប្រហែល 2,000 ទៅ 4,000 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ដោយសារជំងឺក្រិនថ្លើម ឬជំងឺមហារីកថ្លើម ដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B។

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចបង្ក្រាប៖

ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ (រយៈពេលខ្លី)។ ជំងឺនេះអាចបណ្តាលឲ្យ៖

- បាត់បង់ចំណង់អាហារ • រោគរាគរូស និងក្អក
- ឆ្អឹងឈាម • ជំងឺខាងលើ (ស្បែក ឬភ្នែកពណ៌លឿង)
- ឈឺចុកចាប់សាច់ដុំ សន្លាក់ និងក្រពេច

ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលមានរោគសញ្ញាកើតឡើងជាទូទៅក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យ។ ជាធម្មតា កុមារដែលឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នេះ ពុំបង្ហាញរោគសញ្ញាទេ។

ជំងឺវ៉ែរ (រយៈពេលវែង)។ មនុស្សមួយចំនួនវិញកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B វ៉ែរ។ មនុស្សភាគច្រើនគ្មានរោគសញ្ញាទេ ប៉ុន្តែជំងឺនៅតែធ្ងន់ធ្ងរ ហើយអាចបណ្តាលឲ្យ៖

- ខូចថ្លើម (ជំងឺក្រិនថ្លើម) • ជំងឺមហារីកថ្លើម • ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត

ជំងឺវ៉ែរកើតឡើងជាទូទៅក្នុងចំណោមទារក និងកុមារជាងក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យ។ មនុស្សដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B វ៉ែរអាចចម្លងមេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទៅអ្នកដទៃទៀត បើទោះបីជាពួកគេហាក់បីដូចជាមិនឈឺ ឬគ្មានអារម្មណ៍ឈឺក៏ដោយ។ មនុស្សដល់ទៅ 1.4 លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក អាចមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B វ៉ែរ។

មេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចចម្លងបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈការប៉ះពាល់ឈាម ឬវត្ថុរាវដទៃទៀតពីខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកដទៃនោះ។ មនុស្សក៏អាចឆ្លងជំងឺនេះផងដែរដោយសារតែការប៉ះពាល់វត្ថុខ្លះៗ ដែលមេរោគជំងឺនេះអាចមានជីវិតរហូតដល់ទៅ 7 ថ្ងៃ។

- ទារក ដែលមានម្តាយកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទនេះ អាចឆ្លងមេរោគជំងឺនេះនៅពេលកើត។
- កុមារ យុវជន និងមនុស្សពេញវ័យអាចឆ្លងមេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B តាមរយៈ៖
 - ការប៉ះពាល់ឈាម និងវត្ថុរាវនៃខ្លួនប្រាណ តាមរយៈកន្លែងដាច់ស្បែក ដូចជាកន្លែងខាំ កន្លែងមុត ឬដំបៅ
 - ប៉ះពាល់វត្ថុដែលប្រឡាក់ឈាម ឬវត្ថុរាវនៃខ្លួនប្រាណ ដូចជា (ប្រាស់ដុសធ្មេញ ឡាម ឬឧបករណ៍តាមដាន និងព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម
 - រួមភេទដោយគ្មានការការពារជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំងឺនេះ
 - ប្រើប្រាស់មូលចាក់ថ្នាំញៀនរួមគ្នា
 - មុតមូលដែលបានប្រើរួច។

2 ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B៖ ហេតុអ្វីត្រូវទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំង?

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចបង្ការជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នេះ ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងជំងឺមហារីក និងជំងឺក្រិនថ្លើម។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចចាក់តែឯង ឬក្នុងមូលតែមួយដែលមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងដទៃទៀត។

ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជាធម្មតា ត្រូវបានណែនាំសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ និងកុមារមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិក នៅឆ្នាំ 1982 និងកុមារទាំងអស់នៅឆ្នាំ 1991។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1990 មក ករណីឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ថ្មីៗ ក្នុងចំណោមកុមារ និងយុវជន បានធ្លាក់ចុះជាង 95%— និង 75% ចំពោះក្រុមអាយុដទៃទៀត។

ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផ្តល់នូវការការពាររយៈពេលវែងចំពោះជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលការការពារនេះអាចមានរយៈពេលមួយជីវិត។

3 តើអ្នកណាគួរទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហើយនៅពេលណា?

កុមារ និងយុវជន

- ជាធម្មតា ទារកទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ចំនួន 3 ដូស៖

ដូសទី 1៖	ពេលកើត
ដូសទី 2៖	អាយុ 1-2 ខែ
ដូសទី 3៖	អាយុ 6-18 ខែ

ឧទាហរណ៍ ទារកមួយចំនួនអាចទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងចំនួន 4 ដូស ប្រសិនបើគេប្រើប្រាស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរួមផ្សំដែលមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B។ (ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរួមផ្សំនេះគឺជាថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយមូលដែលមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងច្រើនប្រភេទ) ការចាក់ដូសបន្ថែមពុំបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ។

- ជនណាដល់វ័យ 18 ឆ្នាំ ដែលមិនទាន់ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នៅពេលក្មេងនោះ គួរតែចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះផងដែរ។

មនុស្សពេញវ័យ

- មនុស្សពេញវ័យទាំងអស់ ដែលមិនបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង និងដែលមានហានិភ័យឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គួរចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះ។ នេះរួមបញ្ចូល៖
 - ដៃគូរួមភេទរបស់អ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B
 - បុរសដែលរួមភេទជាមួយនឹងបុរសដូចគ្នា
 - អ្នកដែលចាក់ថ្នាំញៀនតាមផ្លូវ
 - អ្នកដែលមានដៃគូរួមភេទច្រើនជាងម្នាក់
 - អ្នកដែលមានជំងឺតម្រងនោម ឬថ្លើមវ៉ែរ
 - អ្នកអាយុក្រោម 60 ឆ្នាំដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម
 - អ្នកមានការងារ ដែលប៉ះពាល់ឈាមមនុស្ស ឬវត្ថុរាវនៃខ្លួនប្រាណដទៃទៀត



- ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B
- អ្នកស្នាក់នៅ និងបុគ្គលក្នុងគ្រឹះស្ថានអ្នកពិការខាងការលូតលាស់
- អ្នកជំងឺលាងឈាមសម្អាតតម្រងនោម
- អ្នកដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជាទូទៅ
- អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍
- អ្នកដទៃទៀតអាចត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកគេឲ្យទទួលថ្នាំ វ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឧទាហរណ៍ មនុស្សពេញវ័យអាយុ 60 ឆ្នាំនិង លើសពី 60 ឆ្នាំដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម។ អ្នកផ្សេងទៀតដែលចង់ទទួលបាន ការការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះបាន។
- ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដែលមានហានិភ័យដោយសារមូលហេតុណាមួយដែលចែង ខាងលើ គួរចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះ។ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដទៃទៀត ដែលចង់បានការ ការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះបាន។ មនុស្សពេញវ័យដែលកំពុងទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គួរទទួល ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះចំនួន 3 ដូស ដោយដូសទី 2 ត្រូវចាក់ 4 សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីដូស ទី 1 ហើយដូសទី 3 គឺ 5 ខែបន្ទាប់ពីដូសទី 2។ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអាច ប្រាប់លោកអ្នកអំពីកាលវិភាគផ្សេងទៀតសម្រាប់ការចាក់ដូសថ្នាំវ៉ាក់សាំង ដែល អាចប្រើក្នុងស្ថានភាពណាមួយចំនួន។

4 តើអ្នកណាមិនគួរទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើម ប្រភេទ B

- ជនណាដែលមានប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីនីមមេដបៃ (yeast) ឬបាតូជីនដទៃទៀតនៃ ថ្នាំវ៉ាក់សាំង ដែលគំរាមដល់អាយុជីវិត មិនគួរទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើម ប្រភេទ B ទេ។ សូមប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក ប្រសិនបើលោកអ្នកមាន ប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីនីមណាមួយនោះ។
- ជនណាដែលមានប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីនីមដូសមុននៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើម ប្រភេទ B ដែលគំរាមដល់អាយុជីវិតនោះ មិនគួរទទួលដូសមួយទៀតនៃថ្នាំ វ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទេ។
- ជនណាដែលឈឺធ្ងន់ល្មម ឬធ្ងន់ធ្ងរ នៅពេលត្រូវចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើម ប្រភេទ B ប្រហែលគួររង់ចាំសិន រហូតទាល់តែគេជាសះស្បើយ ទើបចាក់ថ្នាំ វ៉ាក់សាំងនេះបាន។

វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអាចផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់លោកអ្នកអំពីការប្រយ័ត្នជា មុនទាំងនេះ។

សម្គាល់៖ គេអាចស្នើឲ្យលោកអ្នករង់ចាំ 28 ថ្ងៃ មុននឹងបរិច្ចាគឈាម បន្ទាប់ពីបាន ទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B។ នេះគឺដោយសារថា គេស្នើនិរ្យាបភ័យ ច្រឡំថ្នាំវ៉ាក់សាំងក្នុងឈាម (ដែលមិនមែនជាជំងឺ) ចាជាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B។

5 តើមានហានិភ័យអ្វីខ្លះដោយសារ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B?

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពណាស់។ មនុស្សភាគច្រើនគ្មានបញ្ហាជាមួយនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះទេ។ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះរៀបចំមានមេរោគចម្លងទេ ហើយមិនអាចបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺរលាក ថ្លើមប្រភេទ B ឡើយ។

- បញ្ហាស្រាលមួយចំនួនត្រូវបានរាយការណ៍ ដូចជា៖
- ដំបៅនៅកន្លែងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង (មនុស្សប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោម 4 នាក់)
- សីតុណ្ហភាព 99.9°F ឬខ្ពស់ជាងនេះ (មនុស្សប្រហែលម្នាក់ក្នុង ចំណោម 15 នាក់)

បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរគឺកម្រណាស់។ ប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីនីមត្រូវបានគេជឿជាក់ថា កើត ឡើងប្រហែលម្តងក្នុងចំណោម 1.1 លានដូស។
 DCH-0450CA AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.
 Translation provided by the Immunization Action Coalition

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង គឺដូចឱសថផងដែរ គឺអាចបង្កប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ។ ប៉ុន្តែ ហានិភ័យដែលថ្នាំ វ៉ាក់សាំងបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬធ្វើឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះ គឺមានកម្រិតតិចតួច បំផុត។ មនុស្សជាង 100 លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ រលាកថ្លើមប្រភេទ B។

6 ចុះបើមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ?

តើខ្ញុំគួរប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីខ្លះ?

- សូមប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកព្រួយបារម្ភ ដូចជាសញ្ញាបង្ហាញពី ប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីនីមធ្ងន់ធ្ងរ គ្រុនក្តៅខ្លាំង ឬការប្តូរឥរិយាបថ។
- សញ្ញាបង្ហាញពីប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីនីមធ្ងន់ធ្ងរ អាចរួមបញ្ចូលកន្ទួល ហើមមុខ និង បំពង់ក ពិបាកដកដង្ហើម ចង្ហាក់បេះដូងធ្លាប់ វិលមុខ និងកម្លាំងចុះខ្សោយ។ បញ្ហាទាំងនេះនឹងចាប់ផ្តើមកើតឡើងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីទៅប៉ុន្មានម៉ោង ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង។

តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីខ្លះ?

- ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថា វាគឺជាប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីនីមធ្ងន់ធ្ងរ ឬស្ថានភាពណាសម្រោះ បន្ទាន់ដទៃទៀតដែលមិនអាចរង់ចាំបាន សូមទូរស័ព្ទទៅ 9-1-1 ឬយកអ្នកជំងឺទៅកាន់ មន្ទីរពេទ្យដែលជិតបំផុត។ បើមិនអញ្ចឹងទេ សូមទូរស័ព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក។
- បន្ទាប់មក ប្រតិកម្មគួររាយការណ៍ទៅប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំ វ៉ាក់សាំង (Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS))។ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអាចដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍នេះ ឬលោក អ្នកអាចរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់តាមរយៈវេបសាយ VAERS នៅ www.vaers.hhs.gov ឬតាមរយៈហៅទូរស័ព្ទមក 1-800-822-7967។

VAERS គឺសម្រាប់តែការរាយការណ៍ប្រតិកម្មផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះ។ ប្រព័ន្ធនេះពុំផ្តល់ ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រទេ។

7 កម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំ វ៉ាក់សាំង (National Vaccine Injury Compensation Program)

កម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង (National Vaccine Injury Compensation Program (VICP)) គឺជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធ ដែលបាន បង្កើតឡើងដើម្បីបង់សងអ្នកទាំងឡាយដែលអាចរងរបួសដោយសារតែថ្នាំវ៉ាក់សាំង មួយចំនួន។

បុគ្គលដែលជឿជាក់ថា ខ្លួនអាចធ្លាប់រងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយ អាចធ្វើការសិក្សា អំពីកម្មវិធី និងអំពីការដាក់ពាក្យទាមទារសំណង ដោយទូរស័ព្ទមក 1-800-338-2382 ឬ ចូលទៅវេបសាយ VICP នៅ www.hrsa.gov/vaccinecompensation។

8 តើខ្ញុំអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតដោយរបៀបណា?

- សូមវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក។ 1-888-767-4687
- ទូរស័ព្ទទៅក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ ឬនៅមូលដ្ឋានរបស់លោកអ្នក។
- ទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ និងបង្ការជំងឺឆ្លង (CDC):
 - ទូរស័ព្ទមកលេខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
 - ចូលទៅវេបសាយ CDC នៅ www.cdc.gov/vaccines

Vaccine Information Statement (Interim) Hepatitis B Vaccine

2/2/2012 Khmer
 42 U.S.C. § 300aa-26



ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខភាពស្នើសុំនូវព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគពេញលក្ខណ៍ត្រឹមត្រូវ, ការពិនិត្យមើលនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ហើយនិងការតម្រូវដាក់ពេលវេលា សំរាប់ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៅអនាគត. ព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនឹងធ្វើទៅមន្ទីរ Michigan Care Improvement Registry ។ បុគ្គលទាំងឡាយមានសិទ្ធិស្នើសុំអោយអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខ ភាពមិនអោយបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំ បង្ការរោគនេះទៅឲ្យកន្លែងទុកសំណុំរឿងប៉ុន្តែ។