

ខិត្តិប័ណ្ណណាត់មានចុនាំបង្កការជំងឺ

ចុនាំបង្កការបញ្ចូលគុណាការពារជម្ងឺបន្លំម៉ូក្រូក (មរោគរលាកសួត) អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង

Many Vaccine Information Statements are available in Spanish and other languages. See www.immunize.org/vis. សារអំពីព័ត៌មានចុនាំបង្កការមួយចំនួន មានសរសេរជាភាសាអង្គការ និងភាសាដទៃទៀត។ សូមទស្សនា គេហទំព័រ www.immunize.org/vis ។

គួរទេយរបស់អ្នកណាដែលទុយអ្នក ឬកូនអ្នក ត្រូវចាក់ចុនាំបង្កការ PCV13 តាមចំនួនកំណត់ក្នុងចុងនេះ ។

1 ហេតុអ្វីត្រូវចាក់ចុនាំបង្កការ?

ចុនាំបង្កការបញ្ចូលគុណាការពារជម្ងឺបន្លំម៉ូក្រូក (ដដែលហៅថា PCV 13 ឬ Prevnar 13) ត្រូវបានគូរទេយណាដែលទុយអ្នក ដើម្បីការពារកុមារ និងទារក និងកុមារធំមួយចំនួន ព្រមទាំង មនុស្សសព្វថ្ងៃ ដែលមានសុខភាពសុខភាពមិនល្អ ដដែល បណ្តាលមកពីជម្ងឺរលាកសួត ។

ជម្ងឺរលាកសួតគឺជាបណ្តាលមកពីការឆ្លងបាក់តេរីដៃម្លីរលាក សួតស្តីបញ្ចូលគុណ ។ បាក់តេរីជាមរោគដែលអាចឆ្លងពី មនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់តាមរយៈការដេញដោលជិតគ្នា ។

ជម្ងឺបន្លំម៉ូក្រូកអាចបណ្តាលទុយមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ រួមទាំងមរោគហើមទងសួត ការឆ្លងមរោគតាមឈាមនិង ជម្ងឺរលាកសួតរោមខ្លះ ។

ជម្ងឺរលាកសួតរោមខ្លះគឺជាជម្ងឺរាតត្បាតលើសរោមខ្លះ កុបាល ។ ជម្ងឺរលាកសួតរោមខ្លះបន្លំម៉ូក្រូកជាជម្ងឺមួយដែល កម្រកើតមានណាស់ (គិតជា 1 ករណីក្នុងមនុស្ស 100,000 ក្នុងមួយឆ្នាំ) តែជម្ងឺនេះអាចទុយមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ ចំពោះសុខភាព រួមទាំងចូល និងការខូចខ្លះកុបាល ។ ចំពោះ កុមារ វាអាចបណ្តាលទុយកុមារនាក់ស្លាប់ក្នុងចំណោម កុមារ១០នាក់ដែលកើតជម្ងឺនេះ ។

កុមារដែលមានអាយុកុមារពីរឆ្នាំ គឺជាអ្នកដែលស្ថិតក្នុង ហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងកុមារដែលមាន អាយុច្រើនជាងនេះ ។

មនុស្សដែលមានសុខភាពមិនល្អ មនុស្សដែលមានអាយុ ច្រើនជាង 65ឆ្នាំ និងអ្នកជំងឺ ក៏ជាអ្នកដែលមានហានិភ័យ ខ្ពស់ផងដែរ ។

មុនមានចុនាំបង្កការ ជម្ងឺឆ្លងបន្លំម៉ូក្រូក បង្កកទុយមានបញ្ហាជា ច្រើនក្នុងឆ្នាំនីមួយៗនៃសហរដ្ឋអាមេរិក លើកុមារដែល មានអាយុកុមារ 5ឆ្នាំ ដោយរួមទាំង ៖

- បង្កកទុយមានជម្ងឺរលាកសួតរោមខ្លះកុបាលច្រើនជាង 700 ករណី
- 13,000 ជម្ងឺឆ្លងក្នុងឈាម
- ដំបៅក្នុងត្រចៀកច្រើនជាង 5 លាននាក់ និង
- ប្រហែល 200 បានស្លាប់បាក់បង្កជីវិត ។

មានមនុស្សសរុបប្រហែល 4,000 នាក់ នៅស្រុកស្រាបៀងរាល់ ឆ្នាំបណ្តាលពីការឆ្លងជម្ងឺបន្លំម៉ូក្រូក ។

PCV13 Vaccine - Cambodian 2/27/2013

ការឆ្លងជម្ងឺបន្លំម៉ូក្រូក អាចពិបាកព្យាបាលដោយសារថា វាគឺជាជម្ងឺដែលមានភាពស្ថិតជាមួយនឹងចុនាំអង្គចិញ្ចឹម ។ ដូចនេះ ចុនាំបង្កការពារជម្ងឺតាមរយៈការចាក់ចុនាំបង្កការការ ពារមានសារៈសំខាន់ខ្ពស់ឡើង ។

2 ចុនាំបង្កការជម្ងឺ PCV13

បាក់តេរីបន្លំម៉ូក្រូក មានច្រើនជាង 90 ប្រភេទ ។ ចុនាំបង្កការជម្ងឺ PCV 13 អាចជួយការពារប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីបានចំនួន 13 ប្រភេទ ។ បាក់តេរីទាំង 13 ប្រភេទនេះ ជាពួកមរោគដែលបង្កការ ឆ្លងខ្ពស់ក្នុងកុមារ ហើយការឆ្លងប្រហែលជា ពាក់កណ្តាលពីចំពោះមនុស្សចាស់ ។

ចុនាំបង្កការជម្ងឺ PCV 13 ត្រូវបានចាក់ទុយកុមារតាមការកំណត់ ពី ពេលដំបូងមានអាយុ 2, 4, 6 និង 12-15 ខែ ។ កុមារដែលស្ថិត ក្នុងលំដាប់អាយុនេះ ជាពួកដែលស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់បំផុត ចំពោះការកើតជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្តាលពីការឆ្លងជម្ងឺ បន្លំម៉ូក្រូក ។

ចុនាំបង្កការជម្ងឺ PCV 13 ក៏អាចណាដែលទុយកុមារធំ ឬមនុស្ស នួនចាក់ផងដែរ ។ គួរទេយរបស់អ្នកអាចប្រាប់ព័ត៌មាន លម្អិតដល់អ្នកបាន ។

ចុនាំការពារជម្ងឺបន្លំម៉ូក្រូកប្រភេទទីពីរ ត្រូវបានគេហៅថា PPSV23 ដែលអាចត្រូវចាក់លើកុមារ និងមនុស្សធំមួយចំនួន ដោយរួមទាំងមនុស្សចាស់ដែលមានអាយុច្រើនជាង 65ឆ្នាំ ផងដែរ ។ ចំពោះចុនាំបង្កការមួយនេះ មានខិត្តិប័ណ្ណណាត់មាន ដាច់ដោយឡែកមួយ ។

3 ការប្រុងប្រយ័ត្ន

ចំពោះអ្នកណាដែលឆ្លងប្រតិកម្មមុនចុនាំបង្កការដល់ សុទ្ធតែបាក់បង្កជីវិតចំពោះចុនាំបង្កការនេះ ចាក់ចុនាំបង្កការ ជម្ងឺបន្លំម៉ូក្រូកដំបូងដដែលហៅថា PCV7 (ឬ Prevnar) ឬចាក់ចុនាំ បង្កការដទៃទៀតដែលមានមរោគបង្កការជម្ងឺខាន់ស្កាត់ (ឧទាហរណ៍ ចុនាំបង្កការ DTaP) នោះអ្នកមិនត្រូវចាក់ចុនាំបង្កការ PCV 13 ឡើយ ។

ចំពោះអ្នកណាដែលមានប្រតិកម្មខ្ពស់ជាមួយនឹងចុនាំ បង្កការជម្ងឺ PCV 13 ណាមួយ មិនត្រូវចាក់ចុនាំបង្កការនេះឡើយ ។ សូមប្រាប់គូរទេយទុយបានដឹងផង ប្រសិនបើអ្នកដែលត្រូវ ចាក់ចុនាំបង្កការនេះ ឆ្លងប្រតិកម្មមុនចុនាំធ្ងន់ធ្ងរ ។



បុរសិទ្ធិបរិស្ថានក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានណែនាំឱ្យប្រជាជនចុះបញ្ជីបង្ការជម្ងឺ
គ្រុនចាញ់ដោយប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺ ។

គ្រុនចាញ់ដោយប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺ គឺជាការប្រុង
ប្រយ័ត្នទាំងនេះ ។

4 ហានិភ័យ

ជាមួយនឹងចុះបញ្ជីបង្ការជម្ងឺ គឺតែងតែមានឱកាស
កើតមានផលប៉ះពាល់ ។ ផលប៉ះពាល់ទាំងនេះ ជាធម្មតាមិន
ធ្ងន់ធ្ងរ ហើយនឹងបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯង តែប្រសិនបើ
ធ្ងន់ធ្ងរក៏អាចកើតឡើងបានដែរ ។

បញ្ហាប្រតិកម្មដែលត្រូវបានរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងចុះ
បង្ការជម្ងឺ PCV 13 មានភាពខុសគ្នាទៅតាមកម្រិតនៃការ
ប្រើប្រាស់ តែជាទូទៅគឺ ៖

- កុមារបុរសដែលជាពាក់កណ្តាលឯងយកឯងបន្ទាប់ពីចាក់ចុះ
នេះរួច មិនយូរមានអាការៈមួយរយៈពេលខ្លី ឬឡើងកន្ទួល
ក្រហម ឬឈឺក្បាលបរិវេណចាក់ចុះ ។
- បុរសដែលជា 1 កូន និង 3 ករណី ហើយក្នុងបរិវេណចាក់ចុះ ។
- បុរសដែលជា 1 កូន និង 3 ករណី មានគុនក្នុងចំណោមបន្ទុក
ហើយបុរសដែលជា 1 កូន និង 20 ករណី គុនក្នុងចំណោម
(ក្នុងពេលសីតុណ្ហភាព 102.2°F) ។
- រហូតដល់ទៅបុរសដែលជា 8 កូន និង 10 ករណី កើតមានផ្លូវចិត្ត
ឬឆាប់ខឹង ។

មនុស្សធំដែលចាក់ចុះបង្ការជម្ងឺនេះ បានរាយការណ៍ថា មាន
ឡើងក្រហម ឈឺ និងហើមក្នុងបរិវេណចាក់ចុះ ។ គុនក្នុងចំណោម
បន្ទុកបន្ទុក លុបចោលហើយ ឬក៏បាត់ រងាញាក់ ឬឈឺសាច់ដុំ ក៏
ត្រូវបានរាយការណ៍ឱ្យដឹងផងដែរ ។

ចំពោះប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរតម្រូវឱ្យរក្សាទុកប្រតិកម្មបណ្តាល
ពីចុះបង្ការជម្ងឺ គឺជាករណីដែលកម្រកើតមានឡើងណាស់ ។

**5 ចុះប្រើមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ ត្រូវ
ផ្អាកប្រើប្រាស់?**

តើខ្ញុំត្រូវរកមើលអ្វី?

- ត្រូវរកមើលអ្វីក៏ដោយដែលធ្លាប់ឱ្យអ្នកបារម្ភ
ដូចជាសញ្ញាប្រតិកម្មក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ គុនក្នុងចំណោម
ខ្ពស់ ឬការប្រតិកម្មប្រតិកម្ម ។
- សញ្ញាអំពីប្រតិកម្មក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ អាចមានរួមទាំង
ការឡើងបន្ទាត់ក្រហម ហើមមុខ និងបំពង់ក ពិបាក
ដកដង្ហើម បេះដូងដើរញាប់វិលមុខ និងខ្ពស់ដោយ
កម្ពស់ ។ ប្រតិកម្មទាំងនេះ អាចកើតឡើងពីរថ្ងៃទី
ទៅពីរម៉ោងក្រោយពេលចាក់ចុះបង្ការជម្ងឺ ។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វី?

- បើអ្នកគិតថាវាជាប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ ឬមាន
ហេតុការណ៍ដទៃទៀតដែលអ្នកមិនអាចរង់ចាំបាន សូម
DCH-0955CA

យកអ្នកជម្ងឺទៅ
គុន ឬហៅទូរស័ព្ទទមកកាន់លេខ 9-1-1 ។ បើមិនដូច្នោះ
ទេសូមហៅទូរស័ព្ទទមកជួបគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ។

- បន្ទាប់មកទៀត ត្រូវរាយការណ៍ហេតុការណ៍ប្រតិកម្មធ្ងន់
បង្ការជម្ងឺទៅកាន់ «ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ហេតុការណ៍ចុះ
បង្ការ (Vaccine Adverse Event Reporting System) (VAERS)
។ គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអាចជាអ្នកផ្តល់សេចក្តីរាយការណ៍
នេះ ឬអ្នកអាចផ្តល់ដោយខ្លួនឯងបានតាមរយៈវិបសាយ
របស់ VAERS ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vaers.hhs.gov
ឬដោយការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ 1-800-822-7967 ។

VAERS គឺសម្រាប់តែរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ ។ ពួកគេមិន
អាចផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកសាស្ត្រឱ្យអ្នកបានឡើយ ។

**6 កម្មវិធីជាតិផ្តល់សំណងទូទាត់
ចំពោះរបួសសុនាមបណ្តាលពីចុះ
បង្ការជម្ងឺ**

កម្មវិធីជាតិផ្តល់សំណងទូទាត់ចំពោះរបួសសុនាមបណ្តាល
ពីចុះបង្ការជម្ងឺ (National Vaccine Injury Compensation Pro-
gram (VICP)) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1986 ។
នរណាដែលជឿថាខ្លួនមានរបួសសុនាមបណ្តាលពីចុះ
បង្ការ អាចសិក្សាអំពីកម្មវិធីនេះ និងសិក្សាអំពីរបៀប
ដាក់ពាក្យបណ្តឹងទារសំណង ដោយការហៅទូរស័ព្ទ
ទៅកាន់លេខ 1-800-338-2382 ឬទូរសុនាមហៅទំព័រដែលមាន
អាសយដ្ឋាន www.hrsa.gov/vaccinecompensation.

**7 តើខ្ញុំអាចទទួលបានព័ត៌មាន
បន្ថែមដោយរបៀបណា?**


- សួរគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ។
- ហៅទូរស័ព្ទទមកកាន់នាយកដ្ឋានសុខភាពក្នុងមូលដ្ឋាន
ឬបុរេប្រវត្តិរបស់អ្នក ។ 1-888-767-4687
- ទំនាក់ទំនងជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងការពារជម្ងឺ
(Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) ៖
- ហៅទមកលេខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)
ឬ
- ទូរសុនាមហៅទំព័ររបស់ CDC ដែលមានអាសយដ្ឋាន
www.cdc.gov/vaccines

Vaccine Information Statement (Interim)
PCV13 Vaccine

Cambodian
2/27/2013

42 U.S.C. § 300aa-26
Translation provided by the California Department of Public Health
AUTH: P.H.S., Act 42, Sect. 2126.

Office Use Only



ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខភាពស្នើសុំនូវព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺសម្រាប់បង្ការជម្ងឺ
ហើយនិងការកាត់បន្ថយហានិភ័យសំណង់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺនៅអនាគត. ព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺនេះផ្ញើទៅឱ្យ Michigan Care
Improvement Registry ។ បុគ្គលទាំងឡាយមានសិទ្ធិស្នើសុំអោយអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខ ភាពមិនអាចបញ្ជាក់ព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំ
បង្ការជម្ងឺនេះទៅឱ្យក្រុមគ្រូពេទ្យសំណើបាន។