ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួត
អ្វីដែលអ្នកត្រូវការដឹង

របាយការណ៍ព័ត៌មានស្តីអំពីថ្នាំបង្ការជាច្រើនមាន ជាភា សាអេស្ប៉ាញនិងភាសាដទៃទៀត។
សូមមើលនៅ ក្នុងគេហទំព័រ
www.immunize.org/vis

1 ជំងឺឆ្កែឆ្កួតគឺជាអ្វី?

ជំងឺឆ្កែឆ្កួតភាគច្រើនជាជំងឺរបស់សត្វ។
មនុស្សកើតជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅពេលពួកគេត្រូវបានខាំដោយសត្វមានផ្ទុកមេរោគ។
ជាបឋម អាចនឹងមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីនោះឡើយ។
ប៉ុន្តែជាច្រើនសប្តាហ៍ឬដល់ថ្នាក់ច្រើនខែបន្ទាប់ពី ការខាំមក,
ជំងឺឆ្កែឆ្កួតអាចបណ្តាលឲ្យមានការឈឺចាប់ អស់កំលាំង ឈឺក្បាល
គ្រុនក្តៅនិងភាពម៉ូម៉ៅឆាប់ច្រឡោត។
រោគសញ្ញាទាំងនេះតាមមកដោយការប្រកាច់ ភាពមើមមាយ
និងភាពខ្វិនកំរើកលែងបាន។ ជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅលើមនុស្សជា
និច្ចកាលគឺសឹងតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់។
សត្វព្រៃ - ជាពិសេសប្រចៀវ -
គឺជាប្រភពឃើញមានច្រើនញឹក
ញាប់បំផុតនៃការបង្កជំងឺឆ្កែឆ្កួត
របស់មនុស្សនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។

សត្វស្តុង សំពោចអាមេរិក ឆ្កែ ឆ្មា
ចចកអាមេរិកខាងជើង កញ្ជ្រោង
និងថនិកសត្វដទៃទៀតក៏អាចចំលងជំងឺនេះ
បានដែរ។

ជំងឺឆ្កែឆ្កួតមនុស្សគឺកំរឃើញមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ មានត្រឹមតែ
55 ករណីដែលត្រូវ បានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1990 មក។
យ៉ាងនេះក្តី មនុស្សចន្លោះពី 16 000 នាក់ដល់ 39 000
នាក់ត្រូវបានផ្តល់ថ្នាំបង្ការជារៀងរាល់ឆ្នាំជាបំរុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីសត្វខាំ។
ដូចគ្នានេះដែរ ជំងឺ
ឆ្កែឆ្កួតគឺឃើញមានញឹកញាប់ឆ្ងាយខ្លាំងណាស់នៅផ្នែកដទៃទៀតនៃពិភព
លោក ដោយមានមរណភាពពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតប្រហែល 40 000-70
000 ករណីនៅទូទាំងពិភពលោកជារៀងរាល់ ឆ្នាំ។
ការខាំមកពីសត្វឆ្កែដែលមិនបានទទួលថ្នាំបង្ការបង្កឲ្យមាននូវករណីស្លាប់
មួយភាគធំស្មើរទាំងអស់នៃករណីស្លាប់ទាំងនេះ។
ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតអាចបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតបាន។

2 ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួត

ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតត្រូវបានផ្តល់អោយអ្នកដែលស្ថិតនៅប្រឈមនឹងហានិ
ភ័យខ្ពស់នៃជំងឺឆ្កែឆ្កួតដើម្បី
ការពារពួកគេប្រសិនបើពួកគេរងប៉ះពាល់នឹងវា។
វាក៏អាចបង្ការជំងឺផងដែរប្រសិនបើវាត្រូវបានផ្តល់ឲ្យដល់មនុស្សបន្ទាប់ពី
ពួកគេត្រូវបានរងប៉ះពាល់នឹងវា។ ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតត្រូវបាន
ផលិតឡើងពីវីរុសជំងឺឆ្កែឆ្កួតដែលបានសំលាប់ឲ្យងាប់ហើយ។ វាមិនអាច
បង្កជាជំងឺឆ្កែឆ្កួតបានឡើយ។

3 តើនរណាគេខ្លះគួរទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតហើយនៅពេលណា?

ការផ្តល់ថ្នាំបង្ការបង្ការជាមុន (គ្មានការរងប៉ះពាល់នឹងវីរុសឆ្កែឆ្កួត)

- អ្នកដែលប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់នឹងការរងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងជំងឺឆ្កែឆ្ក
  ត ដូចជាពេទ្យសត្វ អ្នកចាប់កាន់ដឹកជញ្ជូនសត្វ
  បុគ្គលិកបំរើការនៅមន្ទីរពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួត
  អ្នកដើរលុកលុយរូងភ្នំ
  និងបុគ្គលិកបំរើការនៅក្នុងផលិតកម្មផលិតផលជីវសាស្ត្រវីរុសឆ្កែឆ្កួត
  គួរតែត្រូវបានផ្តល់ជូននូវថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួត។
- ថ្នាំបង្ការនេះក៏គួរត្រូវបានពិចារណាផងដែរសំរាប់៖
  - អ្នកដែលសកម្មភាពរបស់ខ្លួននាំពួកគេឲ្យមានការប៉ះពាល់ញឹក
    ញាប់
    ជាមួយនឹងវីរុសជំងឺឆ្កែឆ្កួតឬជាមួយនឹងសត្វដែលអាចនឹងឆ្កួត។
  - អ្នកដំណើរអន្តរជាតិដែលទំនងនឹងប៉ះពាល់ជាមួយសត្វនៅក្នុងផ្នែ
    កនៃពិភពលោក ដែលជំងឺឆ្កែឆ្កួតឃើញកើតមានជាញឹកញាប់។

កាលវិភាគផ្តល់ថ្នាំបង្ការមុនរងការប៉ះពាល់សំរាប់ការផ្តល់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្ក
តគឺ **3 កំរិតថ្នាំបង្ការ** ផ្តល់ឲ្យ នៅពេលដូចខាងតទៅនេះ៖
កំរិតទី 1៖ នៅពេលដែលសមគួរ
កំរិតទី 2៖ 7 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកំរិតទី 1
កំរិតទី 3៖ 21 ថ្ងៃឬ 28 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកំរិតទី 1
សំរាប់បុគ្គលិកបំរើការនៅមន្ទីរពិសោធន៍និងអ្នកដទៃទៀតដែលអាចនឹង
ត្រូវរងប៉ះពាល់ជួនៗគ្នានឹងវីរុស ជំងឺឆ្កែឆ្កួត
ការិវិភាគពិសោធន៍ឃ្លាំមើលភាពស៊ាំត្រូវបានគេណែនាំឲ្យជាអនុ
សាសន៍ ហើយកំ
រិតថ្នាំបង្ការសំរាប់រំលឹកគួរត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមដែលត្រូវការចាំបាច់។
(ការធ្វើវិភាគរកកំរិតភាពស៊ាំ
ឬកំរិតថ្នាំបង្ការសំរាប់រំលឹកមិនត្រូវបានណែនាំជាអនុសាសន៍សំរាប់អ្នកដំ
ណើរឡើយ)។ សូមសាកសួរ វេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកដើម្បីបានសេចក្តីលំអិត។

ការផ្តល់ថ្នាំបង្ការបន្ទាប់ពីត្រូវរងប៉ះពាល់នឹងមេរោគ

គ្រប់គ្នាដែលត្រូវសត្វខាំ
ឬមិនដូចនោះដែលអាចនឹងត្រូវរងប៉ះពាល់ទៅនឹងវីរុសឆ្កែឆ្កួត
គួរតែសំអាតរបួសហើយជូបវេជ្ជបណ្ឌិតជាបន្ទាន់។
វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងធ្វើការកំនត់ថាតើពួកគេត្រូវតែទទួលថ្នាំបង្ការឬ អត់។
អ្នកដែលត្រូវរងប៉ះពាល់នឹងវីរុសហើយមិនដែលទទួលថ្នាំបង្ការការពារជំងឺ
ឆ្កែឆ្កួតគួរតែទទួល **4 កំរិត**នៃ ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួត - មួយកំរិតភ្លាមៗ ហើយ
កំរិតបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី 3 ទី 7 និងទី 14។ពួកគេគួរតែ
ទទួលការចាក់ថ្នាំមួយផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះថា
ប្រតេអ៊ីនអង្គបដិបក្ខប្រាណសំរាប់ប្រឆាំងវីរុសឆ្កែឆ្កួតនៅ
ព័ត៌ព្រមជាមួយគ្នានឹងកំរិតថ្នាំបង្ការលើកទីមួយ។
អ្នកដែលត្រូវបានផ្តល់ថ្នាំបង្ការពីមុនមកហើយគួរទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួត
ចំនួន **2 កំរិត** - មួយកំរិតនៅ
ពេលភ្លាមៗហើយមួយកំរិតផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី 3។
ប្រតេអ៊ីនអង្គបដិបក្ខប្រាណប្រឆាំងវីរុសឆ្កែឆ្កួតគឺ មិនត្រូវការឡើយ។

CDC
U.S. Department of Health and Human Services

4 ប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកប្រសិនបើ.....

ពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកមុនពេលទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតប្រសិនបើអ្នក៖

1- ធ្លាប់មានប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ (គំរាមកំហែងជីវិត) ទៅនឹងកំរិតថ្នាំបង្ការពីពេលមុននៃថ្នាំ បង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួត, ឬទៅនឹងសមាសធាតុផ្សំណាមួយនៃថ្នាំបង្ការ; ប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកប្រសិនបើ អ្នកមានប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ

2- មានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្សោយដោយសារតែ៖
   - វីរុសឬជំងឺអេដស៍ឬជំងឺមួយផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ
   - ការព្យាបាលជាមួយឱសថដែលជះឥទ្ធិពលលើប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ដូចជាឱសថក្រម Steroid
   - ជំងឺមហារីក ឬការព្យាបាលជំងឺមហារីកដោយកាំរស្មីឬដោយឱសថ។

ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺស្រាលតិចតួច ដូចជាផ្តាសាយ អ្នកអាចទទួលថ្នាំបង្ការបាន។ ប្រសិនបើអ្នកឈឺ កំរិតមធ្យមឬធ្ងន់ធ្ងរ អ្នកប្រហែលជាគួរតែរង់ចាំរហូតដល់អ្នកបានជាសះស្បើយមុនពេលទទួលកំរិតថ្នាំ បង្ការតាមធម្មតាជាប្រចាំ(មិនទាន់ត្រូវរងប៉ះពាល់នឹងវីរុស) នៃថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួត។

ប្រសិនបើអ្នកបានត្រូវរងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងវីរុសជំងឺឆ្កែឆ្កួត អ្នកគួរតែទទួលថ្នាំបង្ការមិនថាឡើយអ្នកអាចនឹងមានជំងឺអ្វីមួយនោះឡើយ។

5 តើអ្វីខ្លះជាគ្រោះថ្នាក់មកពីថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួត?

ថ្នាំបង្ការ ដូចជាឱសថគ្រប់យ៉ាងទូទៅដែរ គឺអាចនឹងបង្កបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបានដូចជាប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរជាដើម។
គ្រោះថ្នាក់នៃថ្នាំបង្ការបង្កនូវទុក្ខទោសធ្ងន់ធ្ងរ ឬសេចក្តីស្លាប់ គឺមានតិចតួចជាខ្លាំង។
បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមកពីថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតគឺកំរមានខ្លាំងណាស់។

បញ្ហាកំរិតស្រាល

- ការឈឺចាប់ ការឡើងក្រហម ការហើម ឬរមាស់នៅត្រង់កន្លែងចាក់ (30%-74%)
- ឈឺក្បាល ចង្អោរ ឈឺពោះ ឈឺសាច់ដុំ រំលមុខ (5%-40%)

បញ្ហាកំរិតមធ្យម

- ឡើងហើមកន្ទួលរោលស្បែក ឈឺចាប់នៅត្រង់សន្លាក់ គ្រុនក្តៅ (ប្រហែល 6% នៃការផ្តល់ថ្នាំ បង្ការកំរិតរំលឹក)

វិបត្តិខុសប្រក្រតីដទៃទៀតនៅលើប្រព័ន្ធប្រសាទ ដូចជាប្រជុំរោគសញ្ញា Guillain-Barré (GBS)
ត្រូវបានរាយការណ៍មកដែរក្រោយទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតរួចមក ប៉ុន្តែប្រការនេះកើតមានយ៉ាងកំរហូត
ដល់ថ្នាក់គេមិនដឹងថាតើវាមានទាក់ទងទៅនឹងថ្នាំបង្ការឬក៏អត់ទេ។
កំណត់សំគាល់៖
មានម៉ាកយីហោជាច្រើននៃថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយប្រតិកម្ម អាចនឹងប្រែប្រួលខុសៗគ្នារវាងម៉ាកយីហោទាំងឡាយ។
អ្នកផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នកអាច៍ផ្តល់នូវព័ត៌មានបន្ថែមអំពីម៉ាកយីហោជាក់លាក់ណាមួយ។

6 ចុះបើមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរវិញ?

តើខ្ញុំគួរស្វែងរកអ្វី?

- ស្វែងរកនូវអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានការបារម្ភ ដូចជាសញ្ញានៃប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ គ្រុនក្តៅខ្ពស់យ៉ាងខ្លាំង ឬបំលាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយា។
  សញ្ញានៃប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរអាចរួមមានការឡើងហើមកន្ទួលលើស្បែក ការហើមត្រង់មុខ និងបំពង់ក លំបាកដកដង្ហើម ចង្វាក់ដង្ហើមញាប់ រំលមុខ និងខ្សោយ។
  រោគសញ្ញាទាំងនេះនឹងចាប់ផ្តើមចេញតែប៉ុន្មាននាទីរហូតដល់ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ។

តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីខ្លះ?

- ប្រសិនបើអ្នកគិតថាវាជាប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរឬស្ថានភាពបន្ទាន់ដទៃទៀតដែលអ្នកមិន អាចពន្យារពេលរង់ចាំបាន សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ 9-1-1 ឬយកមនុស្សនោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅជិតបំផុត។ មិនដូច្នោះទេ សូមទូរស័ព្ទរកវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។
- បន្ទាប់មក ប្រតិកម្មនោះគួរតែរាយការណ៍ជូនទៅ "ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ពីហេតុគេទមិនល្អរបស់ ថ្នាំបង្ការ" (VAERS)។ វេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកអាចនឹងរក្សាទុកជាឯកសារនូវរបាយការណ៍នេះ ឬអ្នកអាច ធ្វើវាដោយខ្លួនឯងតាមរយៈគេហទំព័រ VAERS: **www.vaers.hhs.gov** ឬដោយទូរស័ព្ទទៅកាន់ លេខ **1-800-822-7967**។

VAERS គឺសំរាប់តែរាយការណ៍ពីប្រតិកម្មប៉ុណ្ណោះ។ គេមិនផ្តល់នូវដំបូន្មានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រឡើយ។

7 តើខ្ញុំស្វែងយល់បន្ថែមយ៉ាងដូចម្តេច?

- សាកសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។ 1-888-767-4687
- ទូរស័ព្ទទៅកាន់នាយកដ្ឋានសុខាភិបាលក្នុងតំបន់ឬប្រចាំរដ្ឋអ្នក។
- ទាក់ទងទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ (CDC)៖
  - ចូលទៅកាន់គេហទំព័រជំងឺឆ្កែឆ្កួតរបស់ CDC នៅ **www.cdc.gov/rabies/**

DCH-1238CA
AUTH: P.H.S, Act 42, Sect. 2126.

Vaccine Information Statement

Rabies Vaccine

Cambodian

10/6/2009

Office Use Only

Translation provided by the California Department of Public Health

ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខភាពស្នើសុំនូវពត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគពេញលក្ខណាត្រឹមត្រូវ, ការពិនិត្យមើលនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ហើយនិងការតម្រូវដាក់ពេលវេលា សំរាប់ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៅអនាគត, ពត៌មានអំពីការចាក់បង្ការរោគនឹងធ្វើទៅមន្ទីរ Michigan Care Improvement Registry ។ បុគ្គលទាំងឡាយមានសិទ្ធិស្នើសុំអោយអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខ ភាពមិនអោយបញ្ជូនពត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះទៅឲ្យកន្លែងទុកសំណុំរឿងបាន។