

សន្លឹកព័ត៌មានស្តីពីថ្នាំវ៉ាក់សាំង

# ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយ

## អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង

Many Vaccine Information Statements are available in Khmer and other languages. See [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)  
សន្លឹកព័ត៌មានស្តីពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាច្រើនមានជាភាសាខ្មែរ និងភាសាផ្សេងទៀត។ សូមចូលទៅ [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)

### 1 ហេតុអ្វីត្រូវចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង?

ជំងឺអុតស្វាយគឺជាជំងឺកុមារដែលកើតជាទូទៅ។ ជាធម្មតា ជំងឺនេះគឺជាជំងឺស្រាល ប៉ុន្តែវាអាចជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិសេសចំពោះទារក និងមនុស្សពេញវ័យ។

- ជំងឺនេះបង្ករោគកន្ទួល រមាស់ គ្រុនក្តៅ និងនឿយហត់។
- ជំងឺនេះអាចបណ្តាលឲ្យកើតរោគស្បែកធ្ងន់ធ្ងរ មានស្លាកស្នាម កើតជំងឺហើមសួត ខូចខួរក្បាល ឬស្លាប់បាត់បង់ជីវិត។
- មេរោគជំងឺអុតស្វាយអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមខ្យល់ ឬដោយប៉ះពាល់វត្ថុរាវរចនាពីពងទឹកជំងឺអុតស្វាយ។
- អ្នកដែលធ្លាប់កើតជំងឺអុតស្វាយ អាចកើតរោគកន្ទួលដែលឈឺចុកចាប់ ដែលគេហៅថាជំងឺរើម រយៈពេលច្រើនឆ្នាំក្រោយមក។
- នៅសហរដ្ឋអាមេរិក មុនពេលមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះ មនុស្សប្រហែល 11,000 នាក់ បានដេកសម្រាកព្យាបាលជំងឺអុតស្វាយនៅមន្ទីរពេទ្យ រៀងរាល់ឆ្នាំ។
- នៅសហរដ្ឋអាមេរិក មុនពេលមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះ មនុស្សប្រហែល 100 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារជំងឺអុតស្វាយ។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយអាចបង្ការជំងឺអុតស្វាយបាន។ មនុស្សភាគច្រើន ដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយ នឹងមិនកើតជំងឺអុតស្វាយទេ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើអ្នកដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរួចកើតជំងឺអុតស្វាយនោះ ជាធម្មតា ជំងឺអុតស្វាយមានកម្រិតស្រាលណាស់។ ពួកគេនឹងមានពងទឹកចំនួនតិចតួច មិនសូវក្តៅខ្លួនទេ ហើយនឹងជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

### 2 តើអ្នកណាគួរចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយ ហើយនៅពេលណា?

ការទទួលវ៉ាក់សាំងជាទម្រង់កុមារដែលមិនធ្លាប់មានជំងឺអុតស្វាយ គួរទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងចំនួន 2 ដូស នៅអាយុ៖

- ដូសទី 1៖ អាយុ 12-15 ខែ
- ដូសទី 2៖ អាយុ 4-6 ឆ្នាំ (អាចចាក់ឆាប់ជាងនេះ បើយ៉ាងហោចណាស់ 3 ខែ បន្ទាប់ពីដូសទី 1)

មនុស្សអាយុ 13 ឆ្នាំ និងច្រើនជាងនេះ (ដែលដែលមិនធ្លាប់មានជំងឺអុតស្វាយ ឬទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយ) គួរទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងចំនួនពីរដូស រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ 28 ថ្ងៃដាច់ពីគ្នា។

ការទទួលវ៉ាក់សាំងឲ្យទាន់ពេល អ្នកណាដែលមិនបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងពេញលេញ ហើយមិនធ្លាប់កើតជំងឺអុតស្វាយ គួរទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយ 1 ឬ 2 ដូស។ ការកំណត់ពេលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដូសទាំងនេះ អាស្រ័យទៅលើអាយុ។ សូមសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយអាចចាក់ក្នុងពេលដំណាលគ្នានឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងដទៃទៀត។

សម្គាល់៖ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរួមផ្សំមួយ ហៅថា ថ្នាំវ៉ាក់សាំង MMRV ដែលមានទាំងថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយ និងថ្នាំវ៉ាក់សាំង MMR (ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកញ្ជ្រៀល ក្រឡុំទែន និងកញ្ជ្រៀលស្រាល) និងអាចចាក់ជាថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយជំនួសថ្នាំវ៉ាក់សាំងពីរចំពោះអ្នកមានអាយុ 12 ឆ្នាំ និងក្រោម 12 ឆ្នាំ។

### 3 មនុស្សមួយចំនួនមិនគួរចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយទេ ឬគួររង់ចាំ។

- គេមិនគួរចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយឡើយ ប្រសិនបើគេធ្លាប់មានប្រតិកម្មអាល្លែហ្ស៊ីស៊ីដែលរាងដល់អាយុជីវិតទៅនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយដូសមុន ឬទៅនឹងជាតិអន្ទិល (gelatin) ឬថ្នាំជ្រុះ neomycin។
- ជាធម្មតា អ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬធ្ងន់ធ្ងរ នៅពេលត្រូវដាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងគួររង់ចាំរហូតទាល់តែពួកគេជាសះស្បើយសិន មុនពេលទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយ។
- ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួររង់ចាំសម្រាលកូនរួចសិនទើបចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយបាន។ ស្ត្រីមិនគួរមានផ្ទៃពោះរយៈពេល 1 ខែ បន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយ។
- មនុស្សមួយចំនួនគួរតែជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ខ្លួនអំពីថា ពួកគេគួរទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយ ឬយ៉ាងណា ហើយមនុស្សទាំងនោះរួមបញ្ចូលអ្នក៖
  - មានមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ ឬជំងឺផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធស៊ាំ
  - កំពុងទទួលការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធស៊ាំ ដូចជាថ្នាំ steroids សម្រាប់រយៈពេល 2 សប្តាហ៍ ឬយូរជាងនេះ
  - មានជំងឺមហារីក
  - កំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺមហារីកដោយប្រើកាំរស្មី ឬឱសថ
- មនុស្សដែលទើបតែបញ្ចូលឈាមថ្មីៗ ឬទទួលបានផលិតផលឈាមដទៃទៀត គួរសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ខ្លួនថា តើ ពេលណាពួកគេអាចទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយបាន។

សូមសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។



**4 តើមានហានិភ័យអ្វីខ្លះដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយ?**

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង គឺដូចខ្លួនឯងដែរ គឺអាចបង្កបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ។ និយមន័យដែលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬធ្វើឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះ គឺមានកម្រិតតិចតួចបំផុត។

ការទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយគឺមានសុវត្ថិភាពច្រើនជាងការឆ្លងជំងឺអុតស្វាយ។ មនុស្សភាគច្រើន ដែលទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយ ពុំមានបញ្ហាជាមួយនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងទេ។ ជាធម្មតា ប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីអាចកើតឡើងញឹកញាប់បន្ទាប់ពីដូសទី 1 ជាដូសទី 2។

**បញ្ហាស្រាល**

- ជំពៅ ឬហើមនៅត្រង់កន្លែងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង (កម្រប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោម 5 នាក់ និងម្នាក់ក្នុងចំណោមយុវជន និងមនុស្សពេញវ័យ 3 នាក់)
- គ្រុនក្តៅ (មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម 10 នាក់ ឬទាបជាងនេះ)
- កន្ទួលស្រាលរយៈពេលរហូតដល់ទៅ 1 ខែបន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះ (មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម 25 នាក់)។ មនុស្សទាំងនេះអាចចម្លងជំងឺទៅសមាជិកដទៃទៀតក្នុងគ្រួសារ ប៉ុន្តែករណីនេះគឺកម្រណាស់។

**បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ**

- ប្រកាច់ (កន្ត្រាក់ ឬឈរភ្នែក) ដែលបង្កដោយគ្រុនក្តៅ (កម្រណាស់)។

**បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ**

- ជំងឺហើមស្លុត (កម្រណាស់)
- បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដទៃទៀត ដែលរួមបញ្ចូលប្រតិកម្មខួរក្បាលធ្ងន់ធ្ងរ និងចំនួនកោសិកាឈាមទាប ត្រូវបានរាយការណ៍ បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយ។ បញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងណាស់ ដូច្នេះអ្នកជំនាញមិនអាចកំណត់ថា បញ្ហាទាំងនេះបង្កឡើងដោយថ្នាំវ៉ាក់សាំង ឬយ៉ាងណាទេ។ ប្រសិនបើមែន វាកម្រកើតណាស់។

សម្គាល់៖ ដូសទី 1 នៃថ្នាំវ៉ាក់សាំង **MMRV** ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរោគកន្ទួលហើយមានអត្រាគ្រុនក្តៅខ្ពស់ជាងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង MMR និងថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ រោគកន្ទួលត្រូវបានរាយការណ៍កើតឡើងចំពោះមនុស្សប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោម 20 នាក់ ហើយគ្រុនក្តៅត្រូវបានរាយការណ៍កើតឡើងចំពោះមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម 5 នាក់។

រោគប្រកាច់ ដែលបង្កឡើងដោយគ្រុនក្តៅ ក៏ត្រូវបានរាយការណ៍កើតឡើងញឹកញាប់ផងដែរ បន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង MMRV។ ជាធម្មតា បញ្ហាទាំងនេះកើតឡើង 5-12 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចាក់ដូសទី 1។

**5 ចុះបើមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ?**

**តើខ្ញុំគួរប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីខ្លះ?**

- សូមប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកព្រួយបារម្ភ ដូចជាសញ្ញាបង្ហាញពីប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ គ្រុនក្តៅខ្លាំង ឬការប្តូរឥរិយាបថ។
- សញ្ញាបង្ហាញពីប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ អាចរួមបញ្ចូលកន្ទួល ហើមមុខ និងបំពង់ក ពិបាកដកដង្ហើម ចង្កាក់បេះដូងញាប់ វិលមុខ និងកម្លាំងចុះខ្សោយ។ បញ្ហាទាំងនេះនឹងចាប់ផ្តើមកើតឡើងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីទៅប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង។

**តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីខ្លះ?**

- ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថា វាគឺជាប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ ឬស្ថានភាពណាមួយដទៃទៀតដែលមិនអាចរង់ចាំបាន សូមទូរស័ព្ទទៅ 9-1-1 ឬយកអ្នកជំងឺទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលជិតបំផុត។ បើមិនអញ្ចឹងទេ សូមទូរស័ព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក។
- បន្ទាប់មក ប្រតិកម្មគួររាយការណ៍ទៅប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំវ៉ាក់សាំង (Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS))។ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអាចដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍នេះ ឬលោកអ្នកអាចរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់តាមរយៈវេបសាយ VAERS នៅ [www.vaers.hhs.gov](http://www.vaers.hhs.gov) ឬតាមរយៈហៅទូរស័ព្ទមក 1-800-822-7967។

VAERS គឺសម្រាប់តែការរាយការណ៍ប្រតិកម្មផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះ។ ប្រព័ន្ធនេះពុំផ្តល់ជំនួយសេវាផ្សេងៗទេ។

**6 កម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង (National Vaccine Injury Compensation Program)**

កម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង (National Vaccine Injury Compensation Program (VICP)) គឺជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង់សងអ្នកទាំងឡាយដែលអាចរងរបួសដោយសារតែថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយចំនួន។

បុគ្គលដែលជឿជាក់ថា ខ្លួនអាចធ្លាប់រងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយអាចធ្វើការសិក្សាអំពីកម្មវិធី និងអំពីការដាក់ពាក្យទាមទារសំណង ដោយទូរស័ព្ទមក 1-800-338-2382 ឬចូលទៅវេបសាយ VICP នៅ [www.hrsa.gov/vaccinecompensation](http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation)។

**7 តើខ្ញុំអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតដោយរបៀបណា?**

- សូមសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក។ 1-888-767-4687
- សូមទូរស័ព្ទទៅក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ ឬនៅមូលដ្ឋានរបស់លោកអ្នក។
- ទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ និង បង្ការជំងឺឆ្លង (CDC):
  - ទូរស័ព្ទមកលេខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
  - ចូលទៅវេបសាយ CDC នៅ [www.cdc.gov/vaccines](http://www.cdc.gov/vaccines)

DCH-0451CA  
AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.


Translation provided by the Immunization Action Coalition

Vaccine Information Statement (Interim)  
**Varicella Vaccine**

3/13/2008 Khmer

42 U.S.C. § 300aa-26

Office Use Only



ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខភាពស្នើសុំនូវព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគពេញលក្ខណ៍ត្រឹមត្រូវ។ ការពិនិត្យមើលនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគហើយនិងការតម្រូវដាក់ពេលវេលា សំរាប់ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៅអនាគត. ព័ត៌មានអំពីការចាក់បង្ការរោគនឹងធ្វើទៅមន្ទីរ Michigan Care Improvement Registry ។ បុគ្គលទាំងឡាយមានសិទ្ធិស្នើសុំអោយអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខ ភាពមិនអោយបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះទៅឲ្យកន្លែងទុកសំណុំរឿងបាន។