

بیانیه اطلاعات واکسن

واکسن آبله مرغان

آنچه باید بدانید

بیانیه اطلاعات واکسن به زبان اسپانیایی
و زبان‌های دیگر در دسترس است. به نشانی زیر مراجعه کنید: www.immunize.org/vis

Hojas de información Sobre Vacunas están disponibles en español y en muchos otros idiomas. Visite www.immunize.org/vis

جبان کردن

هر کسی که به طور کامل واکسینه نشده باشد، و هرگز آبله مرغان نگرفته باشد، باید یک یا دو دوز واکسن آبله مرغان دریافت کند. زمان این دوزها به سن شخص بستگی دارد. این مسئله را از پژوهش خود پرسید. واکسن آبله مرغان را می‌توان همزمان با واکسن‌های دیگر به فرد داد.

توجه: یک واکسن "ترکیبی" که به آن **MMRV** گفته می‌شود و شامل واکسن آبله مرغان و واکسن **MMR** (سرخک، سرخچه و اوربون) است را می‌توان به جای دو این واکسن مجزا به افراد 12 سال یا کمتر داد.

برخی از افراد نباید واکسن آبله مرغان را دریافت کنند یا باید صبر کنند.

3

- افرادی که قبلاً واکنش آلرژیک همراه با خطر جانی نسبت به دوز قبلی واکسن آبله مرغان و یا به ژلاتین با آنتی بیوتیک نومایسین داشته‌اند. نباید واکسن آبله مرغان دریافت کنند.
 - افرادی که در زمان برنامه‌ریزی شده برای تزریق، بیماری متواتر و یا شدیدی دارند معمولاً باید صبر کنند تا بیماری آن‌ها بهبود پیدا کند. سپس واکسن آبله مرغان را دریافت نمایند.
 - زنان باردار باید دریافت واکسن آبله مرغان تا پس از تولد فرزند خود صبر کنند. زنان پس از دریافت واکسن آبله مرغان نباید تا 1 ماه باردار شوند.
 - برخی از افراد باید در مورد اینکه آبا می‌توانند واکسن آبله مرغان دریافت نمایند یا نه با پژوه خود مشورت کنند. از جمله افرادی که:
 - مبتلا به HIV / ایدز و یا بیمارهای دیگری هستند که سیستم ایمنی بدن آن‌ها را خت تأثیر قرار می‌دهد
 - کسانی که به مدت 2 هفته یا بیشتر خت درمان با داروهایی هستند که بر سیستم ایمنی بدن تأثیر می‌گذارد. مانند استروئیدها
 - مبتلا به هر نوع سرطان هستند
 - با پرتودرمانی و یا دارو خت درمان سرطان قرار دارند
 - افرادی که به تازگی تزریق خون انجام داده و یا فراورده‌های خونی دیگری را دریافت کرده‌اند باید در مورد زمان دریافت واکسن آبله مرغان با پژوه خود مشورت کنند.
- برای کسب اطلاعات بیشتر از پژوه خود سؤال کنید.

چرا باید واکسینه شد؟

1

آبله مرغان (که به آن واریسلا نیز می‌گویند) یک بیماری شایع دوران کودکی است. این بیماری معمولاً خفیف است، اما به ویژه در نوزادان و بزرگسالان ممکن است یک بیماری جدی باشد.

- این بیماری باعث قرمزی پوستی، خارش، تب، و خستگی می‌شود.
- این بیماری می‌تواند منجر به عفونت شدید پوستی، زخم، سینه پهلو، صدمه به مغز یا مرگ شود.
- ویروس آبله مرغان می‌تواند از طریق هوا، و یا تماس با مایع تاول آبله مرغان از فردی به فرد دیگر منتقل گردد.
- کسی که قبلاً آبله مرغان گرفته است ممکن است سال‌ها بعد به یک بیماری قرمزی پوستی دردناک موسوم به زونا مبتلا شود.
- قبل از تهیه واکسن آبله مرغان، سالانه در حدود 11000 نفر در ایالات متحده آمریکا به دلیل این بیماری در بیمارستان بستری می‌شوند.
- قبل از تهیه واکسن، سالانه حدود 100 نفر در نتیجه آبله مرغان در ایالات متحده آمریکا می‌مردند.

واکسن آبله مرغان می‌تواند از بروز آبله مرغان جلوگیری کند.

اکثر افرادی که واکسن آبله مرغان را دریافت می‌کنند به آبله مرغان مبتلا نخواهند شد. اما اگر کسی که واکسینه شده آبله مرغان بگیرد، معمولاً بیماری وی بسیار خفیف خواهد بود. چنین شخص تاول‌های کمتری دارد. احتمال اینکه تب داشته باشد کمتر است و سریع تر بهبود می‌یابد.

چه کسانی باید واکسن آبله مرغان را دریافت کنند و چه زمانی باید این کار انجام شود؟

2

روال معمول کودکانی که هرگز آبله مرغان نگرفته اند باید 2 دوز واکسن آبله مرغان را در سنین زیر دریافت کنند:

- اولین دوز: 12 تا 15 ماهگی
- دومین دوز: 4 تا 6 سالگی (می‌تواند زودتر هم داده شود. به شرط این که حداقل 3 ماه بعد از اولین دوز باشد)
- افراد 13 ساله به بالا (که هرگز آبله مرغان نگرفته اند و یا واکسن آبله مرغان دریافت ننموده‌اند) باید دو دوز را به فاصله حداقل 28 روز از هم دریافت کنند.



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

اگر واکنش جدی وجود داشته باشد چه کنم؟

5

- باشد به دنبال چه نشانه هایی باشیم؟

 - ۰ به دنبال هر نشانه ای باشید که موجب نگرانی شما شود نظیر نشانه های واکنش آلرژیک شدید، تب بسیار بالا و یا تغییرات رفتاری.
 - ۱ نشانه های واکنش آلرژیک شدید می توانند شامل کهیبر، تورم صورت و گلو، اشکال در تنفس، ضربان تند قلب، سرگیجه و ضعف باشند. این وضعیت از چند دقیقه تا چند ساعت پس از واکسیناسیون شروع می شود.

بادھے کا ریکارڈ

- اگر فکر می‌کنید دچار واکنش آلرژیک شدید یا وضعیت اضطراری دیگری شده‌اید که نمی‌توانید صبر کنید، با ۱-۹۰۰ تماش بگیرید و یا فرد را به نزدیکترین بیمارستان برسانید. در غیر این صورت، با پزشک خود تماس بگیرید.

۰ سپس واکنش مذکور باید به سیستم گزارش دهی عوارض جانبی واکسن (VAERS) گزارش داده شود. پزشک شما ممکن است این گزارش را ارسال نماید. یا خودتان می‌توانید از طریق وب سایت VAERS به نشانی www.vaers.hhs.gov و یا از طریق تماس با شماره ۱-۸۰۰-۸۲۲-۷۹۶۷ این کار را انجام دهید.

۰ تنها برای گزارش دادن واکنش‌ها در نظر گرفته شده است. آنها VAERS قادر به ارائه توصیه‌های پیشگیری نیستند.

برنامه ملی جیران خسارت آسیب واکسن

6

- برنامه ملی جبران خسارت آسیب واکسن (VICP) برنامه ای فدرال برای جبران خسارت افرادی است که ممکن در اثر برخی از واکسن‌های خاص آسیب دیده باشند.

افرادی که اعتقاد دارند ممکن است در اثر واکسن آسیب دیده باشند می‌توانند با تماس با شماره ۱-۳۳۸-۸۰۰-۲۳۸۲ یا با بازدید از وبسایت www.hrsa.gov/vaccinecompensation به نشانی VCIP مورود این برنامه و نحوه طرح دعوه، اطلاعات کسب کنند.

چطور می توانم اطلاعات بیشتری کسب کنم؟

7

- از پزشک خود کمک بخواهید.
 - با اداره بهداشت محلی یا ایالتی خود تماس بگیرید.
 - با مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) تماس بگیرید:
 - به شماره ۰۱-۸۰۰-۲۳۲-۸۰۰ (CDC-INFO) ۴۶۳۶-۲۳۲-۸۰۰۱) با
 - از وبسایت CDC به نشانی زیر بازدید کنید:
www.cdc.gov/vaccines

برای اینکه ازانه دهدگان مرآفت های پزشکی، اطلاعات دقیقی در مورد وضعیت و اکسیناسیون، تشخیص و اکسیناسیون و برنامه پیشنهاد شده برای Michigan Care Improvement Registry به افراد خواهد شد. افراد این حق را دارا میباشند از اکسیناسیونهای آنده دریافت کنند، اطلاعاتی به اینه دهدگان مرآفت های پزشکی، خود بخواهند که اطلاعات و اکسیناسیون را به دفتر ثبت ارسال نکنند.

Vaccine Information Statement (Interim) **Varicella Vaccine**

3/13/2008 | Farsi



42 U.S.C. § 300aa-26

خطرات ناشی از واکسن آبله مرغان چیست؟

4

- دریافت واکسن آبله مرغان بسیار کم خطر تر از ابتلا به بیماری آبله مرغ است. اکثر افرادی که واکسن آبله مرغان را دریافت می‌کنند دچار هیچ گونه مشکلی نمی‌شوند. معمولاً احتمال بروز واکنش‌ها پس از اولین دو بینشتر از دومین دوز است.

مشكلات خفيف

- درد یا تورم در محل تزریق (حدود ۱ نفر از هر ۵ کودک و ۱ نفر از هر ۳ نوجوان و بزرگسال)
 - تب (۱ نفر از هر ۱۰ نفر یا کمتر)

سرخی خفیف پوست، تا یک ماه پس از واکسیناسیون (۱ نفر از هر ۲۵ نفر). این امکان وجود دارد که این افراد سایر اعضای خانواده خود را آلوده نمایند، اما احتمال آن بسیار اندک است.

مشكلات متوسط

- ۰ تشنج (لرزیدن و یا خیره شدن به یک نقطه) ناشی از تب (بسیار نادر).

مشکلات شدید

- سینہ پھلو (بیمار نادر)

سایر مشکلات جدی، از جمله واکنش‌های شدید مغزی و کم شدن تعداد سلول‌های خون نیز بعد از واکسیناسیون آبله مرغان گزارش شده است. این اتفاقات آن قدر به ندرت رخ می‌دهند که کارشناسان نمی‌توانند بگویند آیا در اثر واکسن ایجاد شده‌اند یا خیر. اگر چنین باشد، احتمال وقوع آن‌ها بسیار نادر است.

توجه: دوز اول واکسن MMRV نسبت به واکسن‌های MMR و آپله مرغان به صورت جداگانه، با سرخی پوستی و میزان بالاتری از تب همراه بوده است. سرخ شدن پوستی در ۱ نفر از هر ۲۰ نفر و تب در ۱ نفر از هر ۵ نفر گزارش شده است.

تشنج ناشی از تب نیز بیشتر بعد از MMRV گزارش شده است. این اتفاقات معمولاً 5 تا 12 روز پس از دوز اول رخ می‌دهند.

DCH-0451FA
AUTH: P.H.S., Act 42, Sect. 2126.

Translation provided by the Immunization Action Coalition