Haemophilus Influenzae Type B (Hib) Vaccine
(ฮิบ วัคซีน)

โรคฮิบ คืออะไร ?

1.โรคฮิบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Hib โรคนี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ

บุตรของท่าน สามารถเป็น**โรคฮิบ** จากการอยู่ใกล้ชิดกับเด็กอื่น หรือผู้ใหญ่ที่มีเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่รู้ตัว เชื้อชนิดนี้ สามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้ ถ้าเชื้อค้างอยู่ในจมูก หรือคอของเด็ก เด็กอาจจะไม่ป่วย แต่ถ้าเชื้อลามไปที่ปอด หรือกระแสเลือด โรคฮิบสามารถก่อปัญหาร้ายแรงได้ ก่อนที่จะมี**ฮิบวัคซีน โรคฮิบ** เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียปรากฏตัวในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ ในสหรัฐอเมริกา โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบสามารถทำให้สมองเสื่อมแบบถาวรและหูหนวก นอกจากนี้ **โรคฮิบ** สามารถเป็นสาเหตุทำให้เกิด

- โรคปอดบวม
- คอบวมมาก ซึ่งทำให้หายใจลำบาก
- มีการติดเชื้อในกระแสเลือด ที่กระดูก ข้อกระดูก และเยื่อหุ้มหัวใจ
- ความตาย

ก่อนที่พวกเราจะมี**ฮิบวัคซีน โรคฮิบ**เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดที่เป็นเชื้อแบคทีเรียในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ในสหรัฐอเมริกาประมาณ 20,000 คนเป็น**โรคฮิบ**แบบร้ายแรง จะมีเด็กเสียชีวิตประมาณ 1,000 คนต่อปี

วัคซีนฮิบ สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคฮิบ มีเด็กอีกมาก อาจป่วยเป็นโรคฮิบได้ถ้าเราหยุดให้วัคซีน

2. ใครควรได้รับฮิบ วัคซีน และเมื่อไหร่

เด็กๆควรฉีดวัคซีนเมื่อ

√	อายุ 2 เดือน	√	อายุ 6 เดือน
√	อายุ 4 เดือน	√	อายุ 12 - 15 เดือน

แล้วแต่ว่าใช้**ฮิบวัคซีน**ของบริษัทไหนที่ผลิต ลูกของท่านอาจไม่ต้องฉีดเมื่ออายุ 6 เดือน แพทย์หรือพยาบาลของท่านจะแจ้งให้ท่านทราบว่าเมื่อไหร่ควรฉีดวัคซีน

ถ้าท่านลืมฉีดรอบหนึ่ง หรือขาดฉีดตามกำหนด ท่านควรไปฉีดรอบต่อไปให้เร็วที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่

ท่านสามารถฉีดฮิบวัคซีน พร้อมวัคซีนอื่นได้

เด็กที่มีอายุมากกว่าเด็กเล็ก และผู้ใหญ่

เด็กที่มีอายุมากกว่า 5 ขวบส่วนมากไม่ต้องการฮิบวัคซีน แต่เด็กที่อายุมากกว่าหน่อย หรือผู้ใหญ่บางคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพควรฉีดวัคซีนนี้ สภาพของปัญหาที่กล่าวถึง มีทั้งโรคซีคคัมเซล (เม็ดเลือดแดงผิดปกติ) โรคที่มีภูมิต้านทานต่ำ (HIV/AIDS) ผ่าตัด

เอาม้ามออก เปลี่ยนไขกระดูกสันหลัง หรือการรักษาโรคมะเร็งด้วยยา

ถามแพทย์ หรือพยาบาลของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

3. คนบางคนไม่ควรฉีดฮิบวัคซีน หรือควรคอย

- คนที่เคยแพ้ฮิบวัคซีน ไม่สมควรฉีดวัคซีนนี้อีก
- เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 อาทิตย์ยังไม่ควรฉีดฮิบวัคซีน
- คนที่กำลังป่วยปานกลาง หรือป่วยหนักตอนช่วงที่มีนัดฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ควรคอยให้หายก่อนแล้วจึงค่อยไปฉีดฮิบวัคซีน

ปรึกษาแพทย์ หรือพยาบาลก่อนเกี่ยวกับรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม

4. ผลร้ายอะไบ้างที่อาจเกิดจากฮิบวัคซีน

วัคซีนคล้ายยาชนิดหนึ่ง สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาร้ายแรง เป็นต้นว่าการแพ้อย่างรุนแรง ผลที่เกิดจากการฉีดฮิบวัคซีนที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาร้ายแรงหรือการเสียชีวิตจะมีน้อยมาก

บุคคลส่วนมากที่ได้รับฮิบวัคซีน จะไม่มีปัญหาอะไรมาก

ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิด

- ผิวหนังแดง อุ่น หรือบวมตรงที่ฉีดวัคซีน (เป็นกับเด็กถึง 1 ใน 4 คน)
- ไข้สูง

กว่า 101 องศาฟาเรนไฮค์ (เป็นกับเด็กถึง 1 ใน 20 คน) ถ้าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมักจะเกิดภายใน 1 วัน หลังจากฉีดวัคซีน และอาจจะใช้เวลา 2 - 3 วันกว่าจะหาย

5. ถ้าเกิดอาการแพ้ปานกลาง หรือแพ้อย่างรุนแรง ท่านควรจะสังเกตุจากอะไร

อาการที่มักไม่ค่อยเกิด เป็นต้นว่าอาการแพ้อย่างรุนแรง ไข้สูง หรือทำอะไรที่เปลี่ยนไป

อาการของการแพ้ที่รุนแรงรวมทั้งการหายใจลำบาก เสียงแห้ง หรือหายใจมีเสียงดัง ผิวหนังบวมแดง ผิวหนังซีดขาว อ่อนเพลีย หัวใจเต้นเร็ว เวียนศรีษะมักจะเกิดภายใน 2 - 3 ชั่วโมงหลังจากได้ฉีดวัคซีนแล้ว

ท่านควรทำอะไร

- โทรศัพท์หาแพทย์ หรือพาผู้ป่วยไปพบแพทย์
- บอกแพทย์ว่ามีอะไรเกิดขึ้น วันที่และเวลาที่เกิดและเมื่อไหร่ที่ได้รับวัคซีน
- ถามแพทย์และพยาบาลของท่าน หรือเจ้าหน้าที่สุขภาพ เขียนรายงานเกี่ยวกับผลไม่ดีเกิดขึ้นจากวัคซีนในแบบฟอร์ม หรือโทรศัพท์ถึงเจ้าหน้าที่ด้านนี้ด้วยตัวเองที่ 1 - 800 - 822-7967

6. โปรแกรมของรัฐที่คอยช่วยเหลือชดเชยอันตรายที่เกิดจากวัคซีน

ในเหตุการณ์(น้อยครั้ง)ที่ท่านหรือบุตรมีปฏิกิริยาเกี่ยวกับการแพ้วัคซีน รัฐบาลได้จัดให้มีโปรแกรมช่วยเหลือในการจ่ายค่ารักษาสำหรับผู้ที่ได้รับอันตราย

สำหรับรายละเอียดของ National Vaccine Injury Compensation Program กรุณาโทรไปที่ 1 - 800 - 338-2382 หรือเปิดไปที่เวบไซท์ http://www.hrsa.gov/osp/vicp

7. ท่านจะเรียนรู้มากกว่านี้ได้อย่างไร

- ถามแพทย์ และพยาบาลของท่านที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน หรือแนะนำแหล่งคววามรู้ทางด้านนี้เพิ่มเติม
- โทรศัพท์หาผู้ดูแลโปรแกรมฉีดวัคซีนของกรมสุขภาพประจำเมือง หรือรัฐ 1-888-767-4687
- สามารถติดต่อศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Center for Disease Control and prevention, CDC) ได้ที่

Call 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)

หรือไปที่เวบไซท์ของโปรแกรมฉีดวัคซีนประจชาติที่ http://www.cdc.gov/nip

DCH-0449TH
AUTH: P.H.S., Act 42, Sect. 2126.

Vaccine Information Statement	
Hib – Thai	12/16/98
Translation provide by Asian Pacific Health Care Venture,Inc. Los Angeles, CA	

เพื่อให้สถานพยาบาลได้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานะด้านภูมิคุ้มกันโรค การประเมินผลภูมิคุ้มกันโรค และการนัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันโรคในคราวต่อไป ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวนี้จะถูกจัดส่งไปยังสำนักทะเบียนข้อมูลด้านการปรับปรุงการดูแลของรัฐมิชิแกน (Michigan Care Improvement Registry) บุคคลต่าง ๆมีสิทธิ์ที่จะร้องขอไม่ให้สถานพยาบาลของตนส่งข้อมูลด้านภูมิคุ้มกันโรคไปที่สำนักทะเบียนได้