

Lo que usted debe saber

sobre sus medicamentos para la infección latente de tuberculosis (TB)

ISONIAZID y RIFAPENTINE

Le han dado un medicamento para tratar su infección latente de TB. Usted no sufre de TB ni puede transmitirla a otras personas. Dicho medicamento **PREVIENE** la tuberculosis.

Asista a todas sus visitas semanales:

Se reunirá con un trabajador sanitario semanalmente para tomar sus medicamentos. Este plan se denomina terapia de observación directa (directly observed therapy o DOT).

DOT puede ayudarle de varias maneras.

- El trabajador sanitario le ayuda a recordar tomar sus medicamentos.
- Terminará su tratamiento lo antes posible.
- El trabajador sanitario se asegurará de que usted no tenga problemas con los medicamentos.
- Durante sus reuniones semanales, esta persona responderá a sus preguntas. También puede consultarle cualquier inquietud que usted tenga.

Mientras tome el medicamento:

- ✓ Hable con el médico o la enfermera si tiene preguntas o inquietudes sobre el medicamento.
- ✓ No falte a las visitas semanales.
- ✓ Informe al médico o a la enfermera si consume bebidas alcohólicas. Es mejor no consumir bebidas alcohólicas mientras esté tomando el medicamento.
- ✓ Informe al médico o a la enfermera sobre cualquier otro medicamento que tome.
- ✓ Asegúrese de informarles a sus otros médicos que está recibiendo tratamiento para la infección latente de TB.
- ✓ Algunas personas prefieren tomar el medicamento con alimentos.

Programa del medicamento para la infección latente de TB:

(Proveedores: Indiquen el día y el número de pastillas que correspondan)

Medicamento	Frecuencia	Días	No. de pastillas	Duración
Isoniazid y Rifapentine	Una vez por semana	L M Mi J V S D		3 meses (12 semanas)

Su médico podría indicarle que tome la vitamina B6 con el medicamento.

Notas

Nombre del médico:

Nombre de la clínica:

Número de teléfono de la clínica:



Esté alerta a estos posibles problemas:

DEJE de tomar el medicamento **Y llame** a su médico o enfermera de TB de inmediato si presenta algunos de los problemas a continuación:

- Pérdida de apetito o falta de hambre
- Malestar estomacal o retortijones
- Fiebre
- Dolor de cabeza o en el cuerpo
- Náuseas o vómitos
- Orina de color de té o heces de color claro
- Se amorata o sangra con facilidad
- Salpullido o comezón
- Color amarillento en la piel o los ojos
- Debilidad o cansancio severos
- Hormigueo o adormecimiento en manos o pies
- Mareos

NOTA: Es normal que la orina, saliva o lágrimas tomen un color naranja. Los lentes de contacto blandos podrían mancharse.

Scan this QR code
for the most current
Spanish version

