

Những điều quý vị cần biết

về thuốc trị nhiễm lao tiềm ẩn (TB) của quý vị

ISONIAZID và RIFAPENTINE

Quý vị đã được cho thuốc uống để trị nhiễm lao tiềm ẩn. Quý vị không bị bệnh lao và không thể lây lan bệnh lao sang người khác. Thuốc này là để **PHÒNG NGỪA** quý vị khỏi bị nhiễm bệnh lao.

Luôn nhớ giữ các buổi hẹn khám hàng tuần của quý vị:

Quý vị sẽ gặp nhân viên y tế hàng tuần để uống thuốc. Cách thực hiện này được gọi là điều trị theo dõi trực tiếp (directly observed therapy, hoặc DOT).

DOT có thể giúp quý vị bằng nhiều cách.

- Nhân viên y tế giúp nhắc nhở quý vị dùng thuốc của mình.
- Quý vị sẽ hoàn thành quá trình điều trị trong thời gian sớm nhất có thể.
- Nhân viên y tế sẽ đảm bảo quý vị không gặp vấn đề gì khi dùng thuốc này.
- Nhân viên này có thể trả lời mọi thắc mắc của quý vị tại các buổi hẹn hàng tuần. Quý vị cũng có thể cho họ biết về bất cứ quan ngại nào của mình.

Trong lúc dùng thuốc này:

- ✓ Hãy cho bác sĩ hoặc y tá của quý vị biết nếu quý vị có thắc mắc hoặc quan ngại về thuốc.
- ✓ Đi thăm khám hàng tuần.
- ✓ Tham khảo với bác sĩ/y tá nếu quý vị có dùng bia rượu. Tốt nhất là không uống bia rượu trong khi dùng thuốc này.
- ✓ Cho bác sĩ/y tá của quý vị biết về tất cả các loại thuốc mà quý vị đang dùng.
- ✓ Đừng quên báo cho bác sĩ khác của quý vị biết rằng quý vị đang được điều trị nhiễm lao tiềm ẩn.
- ✓ Một số người cho rằng thuốc này dễ uống hơn với thức ăn.

Lịch uống thuốc nhiễm lao tiềm ẩn:

(Chuyên gia y tế: Cho biết ngày uống thuốc và số lượng viên thuốc thích hợp)

Thuốc	Lịch trình	Ngày	Số viên thuốc cần uống mỗi ngày	Trong bao lâu
Isoniazid và Rifapentine	Một tuần một lần	Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật		3 tháng (12 tuần)

Bác sĩ có thể sẽ cho quý vị uống vitamin B6 cùng với thuốc này.

Ghi chú

Tên bác sĩ của tôi:

Tên phòng khám của tôi:

Số điện thoại phòng khám của tôi:



Theo dõi những vấn đề có thể xảy ra sau đây:

NGỪNG uống thuốc **VÀ** gọi ngay cho bác sĩ/y tá phụ trách bệnh lao (TB) nếu quý vị gặp bất cứ vấn đề nào sau đây:

- Ít thèm ăn hoặc không muốn ăn
- Đau bụng hoặc bụng bị co thắt
- Nóng sốt
- Đau đầu hoặc cơ thể
- Buồn nôn hoặc nôn mửa
- Nước tiểu màu cola hoặc đi cầu ít phân
- Dễ bị bầm tím hoặc chảy máu
- Phát ban hoặc ngứa
- Vàng da hay mắt
- Quá yếu sức hay mệt mỏi
- Rắn rần/tê ở bàn tay hoặc bàn chân
- Chóng mặt

GHI CHÚ: Nếu nước tiểu, nước bọt, hoặc nước mắt của quý vị có chút màu cam, đó là bình thường. Kính áp tròng mềm có thể bị nhuộm màu.

Scan this QR code for the most current Vietnamese version

