

潛伏結核 (TB) 感染藥物的 須知事項

RIFAMPIN

您已獲得治療潛伏結核 (Tuberculosis, TB) 感染的藥物。您並未患有 TB 疾病且也不會將 TB 傳染給他人。此藥物的目的是要預防您罹患 TB 疾病。

在服用此藥物期間：

- 請將您對藥物的疑問或顧慮告知醫生或護士
- 前往診所就診。
- 與醫生或護士討論任何酒精的使用。在服用此藥物期間最好不要飲酒。
- 告知醫生或護士您正在服用的所有其他藥物。
- 請務必告知您的其他醫生您目前正在接受潛伏 TB 感染的治療。
- 按照 TB 醫生或護士的指示服用您的所有藥物。
- 有些人認為此藥物最好隨食物服用。

協助您服藥的建議：

- ✓ 每天固定時間服藥。
- ✓ 設定鬧鐘提醒您服藥的時間到了。
- ✓ 請家人或朋友提醒您。
- ✓ 使用藥盒。
- ✓ 將提醒便條紙貼在鏡子或冰箱上。
- ✓ 在服完藥之後，在日曆上做記號。

潛伏 TB 感染用藥時程：

(醫療服務提供者：請標示適當的藥錠數量)

藥物	時程	每天藥錠數量	時間長度
Rifampin	每日		4 個月

如果您忘記服用藥物：如果還在同一天，請在您記起之後盡速服藥。請勿同時服用 2 劑藥物。

註記

醫生姓名：

診所名稱：

診所電話號碼：



注意這些可能發生的問題：

如果您發生下列任何問題，請立即停止服用藥物並致電與您的 TB 醫生或護士聯絡：

- 食慾減退或沒有食慾
- 胃部不適或胃部痙攣
- 噁心或嘔吐
- 尿液呈可樂色或糞便顏色變淡
- 容易瘀青或出血
- 皮疹或搔癢
- 皮膚或眼睛顏色變黃
- 嚴重衰弱或疲勞
- 發燒
- 頭痛或身體痠痛
- 頭昏

註：如果您的尿液、唾液或淚液呈橘色，這是正常現象。軟式隱形眼鏡可能會染色。



Scan this QR code
for the most current
Cantonese version