

알아두어야 할 사항

잠복 결핵(TB) 감염에 필요한 약

리팜핀 (RIFAMPIN)

귀하는 잠복 TB 감염을 치료하는 약을 복용했습니다. 귀하는 TB에 걸리지 않았으며 타인에게 TB를 전염시키지 않습니다. 이 약은 TB 감염을 예방하기 위한 것입니다.

약 복용 기간에 해야 할 일:

- 약에 대한 질문이나 문제점이 있다면 담당 의사나 간호사에게 알려주세요.
- 병원 방문 일정을 지키주세요.
- 의사나 간호사와 음주에 대해 상담하십시오. 이 약을 복용하는 동안에는 술을 마시지 않는 것이 가장 좋습니다.
- 담당 의사나 간호사에게 현재 복용 중인 다른 모든 약에 대해 알려주세요.
- 본인이 만나는 다른 의사들에게도 잠복 TB 감염 치료를 받고 있음을 알려주세요.
- 결핵(TB) 담당 의사나 간호사의 지시에 따라 모든 약을 복용하십시오.
- 식사 중에 약을 복용하는 것이 낫다고 생각하는 사람들도 있습니다.

약 복용에 도움이 되는 팁:

- ✓ 매일 같은 시간에 약을 복용하십시오.
- ✓ 약 복용 시간에 울리도록 알람을 설정하십시오.
- ✓ 가족이나 친구에게 약복용 시간을 알려 달라고 부탁하십시오.
- ✓ 알약 상자를 사용하십시오.
- ✓ 거울이나 냉장고에 알람 메모를 붙여 놓으십시오.
- ✓ 약을 복용한 후에는 달력의 날짜를 체크하는 방법을 사용하십시오.

잠복 TB 감염 치료제 복용 일정:

(서비스 제공자: 해당 복용량을 표시하십시오)

약	일정	하루 복용 량(정제)	복용 기간
리팜핀	매일		4개월

약 복용을 잊은 경우: 아직 하루가 안 지났다면 즉시 약을 복용합니다. 2회 분량을 한꺼번에 복용하지 않도록 하십시오.

참고

담당 의사 이름:
병원 이름:
병원 전화번호:



다음의 문제점을
주의하십시오.

다음의 문제가 있다면 즉시
약 복용을 중단하고 결핵
(TB) 의사나 간호사에게
연락하십시오.

- 식욕 부진 또는 식욕을 전혀 느끼지 않음
- 위장 장애 또는 위 경련
- 메스꺼움 또는 구토
- 짙은 갈색 소변 또는 묽은 대변
- 잦은 타박상 또는 출혈
- 발진 또는 가려움증
- 피부나 안구의 황달 증상
- 심한 무기력증 또는 피로감
- 고열
- 두통 또는 몸살 기운
- 현기증

참고: 소변, 침 또는 눈물이 오렌지색을 띠는 것은 정상입니다. 소프트 콘택트 렌즈에 얼룩이 생길 수 있습니다.



Scan this QR code
for the most current
Korean version