

# 潛伏結核 (TB) 感染藥物的 須知事項

## ISONIAZID

您已獲得治療潛伏結核 (Tuberculosis, TB) 感染的藥物。您並未患有 TB 疾病且也不會將 TB 傳染給他人。此藥物的目的是要預防您罹患 TB 疾病。

### 在服用此藥物期間：

- 請將您對藥物的疑問或顧慮告知醫生或護士
- 前往診所就診。
- 與醫生或護士討論任何酒精的使用。在服用此藥物期間最好不要飲酒。
- 告知醫生或護士您正在服用的所有其他藥物。
- 請務必告知您的其他醫生您目前正在接受潛伏 TB 感染的治療。
- 按照 TB 醫生或護士的指示服用您的所有藥物。
- 有些人認為此藥物最好隨食物服用。

### 協助您服藥的建議：

- ✓ 每天固定時間服藥。
- ✓ 設定鬧鐘提醒您服藥的時間到了。
- ✓ 請家人或朋友提醒您。
- ✓ 使用藥盒。
- ✓ 將提醒便條紙貼在鏡子或冰箱上。
- ✓ 在服完藥之後，在日曆上做記號。

### 潛伏 TB 感染用藥時程：

(醫療服務提供者：請標示適當的用藥時程、天數及藥錠數量)

藥物	時程	天數	每天藥錠數量	時間長度
Isoniazid	每日	每天		9 個月

您的醫生可能會請您隨藥物服用維他命 B6。

**如果您忘記服用藥物：**如果還在同一天，請在您記起之後盡速服藥。

如果該天已經過去，請跳過漏服的該劑藥物並服用下一劑預定服用的藥物 — 請勿同時服用 2 劑藥物。

### 註記

醫生姓名：

診所名稱：

診所電話號碼：



### 注意這些可能發生的問題：

如果您發生下列任何問題，請立即停止服用藥物並致電與您的 TB 醫生或護士聯絡：

- 食慾減退或沒有食慾
- 胃部不適或胃部痙攣
- 噁心或嘔吐
- 尿液呈可樂色或糞便顏色變淡
- 皮疹或搔癢
- 皮膚或眼睛顏色變黃
- 手部或腳部刺痛或發麻



Scan this QR code for  
the most current  
Cantonese version