

알아두어야 할 사항

잠복 결핵(TB) 감염에 필요한 약

이소니아지드

귀하는 잠복 TB 감염을 치료하는 약을 복용했습니다. 귀하는 TB에 걸리지 않았으며 타인에게 TB를 전염시키지 않습니다. 이 약은 TB 감염을 예방하기 위한 것입니다.

약 복용 기간에 해야 할 일:

- 약에 대한 질문이나 문제점이 있다면 담당 의사나 간호사에게 알려주세요.
- 병원 방문 일정을 지키주세요.
- 의사나 간호사와 음주에 대해 상담하세요. 이 약을 복용하는 동안에는 술을 마시지 않는 것이 가장 좋습니다.
- 담당 의사나 간호사에게 현재 복용 중인 다른 모든 약에 대해 알려주세요.
- 본인이 만나는 다른 의사들에게도 잠복 TB 감염 치료를 받고 있음을 알려주세요.
- 결핵(TB) 담당 의사나 간호사의 지시에 따라 모든 약을 복용하세요.
- 식사 중에 약을 복용하는 것이 낫다고 생각하는 사람들도 있습니다.

약 복용에 도움이 되는 팁:

- ✓ 매일 같은 시간에 약을 복용하세요.
- ✓ 약 복용 시간에 울리도록 알람을 설정하세요.
- ✓ 가족이나 친구에게 약복용 시간을 알려 달라고 부탁하세요.
- ✓ 알약 상자를 사용하세요.
- ✓ 거울이나 냉장고에 알람 메모를 붙여 놓으세요.
- ✓ 약을 복용한 후에는 달력의 날짜를 체크하는 방법을 사용하세요.

잠복 TB 감염 치료제 복용 일정:

(서비스 제공자: 해당 일정, 요일 및 복용량을 표시하세요)

약	일정	요일	하루 복용량(정제)	복용 기간
이소니아지드	매일	매일		9개월

담당 의사가 현재 약과 비타민 B6를 함께 복용하도록 지시할 수 있습니다.

약 복용을 잊은 경우: 아직 하루가 안 지났다면 즉시 약을 복용합니다. 복용일을 지나친 경우, 미복용 분량은 건너뛰고 다음 복용 분량을 복용하세요. 2회 분량을 한꺼번에 복용하지 마세요.

참고

담당 의사 이름:
병원 이름:
병원 전화번호:



다음의 문제점을 주의하십시오.

다음의 문제가 있다면 즉시 약 복용을 중단하고 결핵(TB) 의사나 간호사에게 연락하십시오.

- 식욕 부진 또는 식욕을 전혀 느끼지 않음
- 위장 장애 또는 위 경련
- 메스꺼움 또는 구토
- 짙은 갈색 소변 또는 묽은 대변
- 발진 또는 가려움증
- 피부나 안구의 황달 증상
- 손이나 발이 얼얼하거나 무감각한 증상



Scan this QR code for the most current Korean version