

您需要了解的内容

关于治疗潜伏性结核 (TB) 感染的药物

ISONIAZID

您已经被给予治疗潜伏性结核感染的药物。您没有患结核病, 也不会将结核病传染给其他人。服药是为了**预防**您患结核病。

在服药期间:

- 如果您对该药物有任何疑问或担忧, 请告诉您的医生或护士。
- 前往诊所就诊。
- 与您的医生或护士讨论任何饮酒情况。服药期间最好不要饮酒。
- 告诉您的医生或护士您正在服用的所有其他药物。
- 请一定要告诉您的其他医生您正在接受潜伏性结核感染治疗。
- 按照您的结核医生或护士的嘱咐, 服用所有药物。
- 有人发现, 随饭服用药物效果更好。

服药小贴士:

- ✓ 每天在同一时间服用药物。
- ✓ 就您应该服药的时间设置闹钟提醒。
- ✓ 请家人或朋友提醒您。
- ✓ 使用药盒。
- ✓ 在镜子或冰箱上贴上提醒字条。
- ✓ 使用日历, 将已经服药的日子划掉。

潜伏性结核感染药物时间表:

(提供者: 指明服药的适当时间表、日期和数量)

药物	时间表	日期	每天服药数量	时间长度
Isoniazid	每天	每天		9 个月

您的医生可能会让您随药服用维生素 B6。

如果您忘了服药: 如果仍然是同一天, 请在记得时尽快服用。如果您有一天忘了服药, 跳过这一天错过服用的剂量, 按照您的下一个原定剂量服药 — 不要同时服用两剂。

备注

我的医生的姓名:

我的诊所名称:

我的诊所电话号码:



注意这些可能的问题:

如果您有以下任何问题, 立即停止服药, 并致电您的结核医生或护士:

- 食欲不振或没有食欲
- 胃部不适或胃痉挛
- 恶心或呕吐
- 可乐色尿液或轻度腹泻
- 皮疹或瘙痒
- 皮肤或眼睛发黄
- 手脚刺痛或麻木



Scan this QR code
for the most current
Mandarin version