

ماذا يجب أن تعرفوا

عن دوائك لالتهاب السل الكامن (TB)

أيزونيازيد (ISONIAZID) و ريفامبين (RIFAPENTINE)



النتبهوا لهذه المشاكل المتوقعة:

توقفوا عن أخذ هذا الدواء و اتصلوا حالاً بطبيب السل أو الممرضة الخاص بكم إذا حصلت لديكم أي من المشاكل المدرجة أدناه:

- انخفاض في الشهية، أو انعدام الشهية للطعام
- اضطراب في المعدة أو تقلصات في المعدة
- حرارة
- آلام في الرأس أو الجسم
- الغثيان أو القيء
- بول بلون شراب الكولا أو برازات فاتحة اللون
- سهولة حدوث الكدمات أو النزيف
- الطفح الجلدي أو الحكة
- الاصفرار في الجلد أو العيون
- الضعف أو التعب الشديد
- نَمَل أو تخدير في اليدين أو القدمين
- الدوخان

ملاحظة: من الطبيعي أن يصبح بولكم أو لعابكم أو دموعكم برتقالي اللون. قد تصبح العدسات اللاصقة اللينة ملطخة.

لقد أُعطيت دواء لمعالجة التهاب السل الكامن (latent TB infection). لست مصابين بمرض السل ولا يمكنكم أن تفشوا مرض السل للآخرين. إن هذا الدواء **يقيكم** من الإصابة بمرض السل.

تذكروا بالإبقاء على زيارتكم الأسبوعية:

سوف تجتمعون بعامل الرعاية الصحية لاستلام أدويةكم. تُسمى هذه الخطة العلاج المرصود مباشرة (directly observed therapy) أو ما يُسمى بـ (DOT).

تتمكن الـ DOT من مساعدتكم في العديد من الطرق.

- يساعدكم العامل في الرعاية الصحية في التذكير بأخذ أدويةكم.
- سنتهون من علاجكم في أقرب وقت ممكن.
- سيتأكد العامل الرعاية الصحية من عدم وجود أي مشاكل مع الأدوية.
- أثناء اجتماعكم الأسبوعي سيتمكن هذا الشخص من الإجابة على أسئلتكم. بإمكانكم أيضاً أن تتحدثوا عن أي مخاوف لديكم.

عندما تأخذون هذا الدواء:

- ✓ اعلمو الطبيب/ة أو الممرضة/ة إذا كانت لديكم أي أسئلة أو مخاوف عن هذا الدواء.
- ✓ إذهبوا إلى الاجتماعات الأسبوعية.
- ✓ تحدثوا عن أي استخدام للكحول مع طبيبك أو ممرضتكم. من الأفضل عدم شرب الكحول عندما تأخذون هذا الدواء.
- ✓ اخبروا الطبيب أو الممرضة الخاصة بكم عن كل الأدوية الأخرى التي تأخذونها.
- ✓ تأكدوا من إعلام أطباءكم الآخرين بأنه تتم معالجتكم لالتهاب السل الكامن.
- ✓ يعتقد بعض الناس بأنه من المستحسن أخذ الدواء مع الطعام.

جدول مواعيد دواء السل الكامن:

(مقدمين الخدمة: يحددوا اليوم المناسب وعدد الجبوب)

| الأدوية | الجدول | الأيام | عدد الجبوب في اليوم | طول الفترة الزمنية |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| أيزونيازيد (ISONIAZID) و ريفامبين (RIFAPENTINE) | مرة في الأسبوع | الإثنين (M) الثلاثاء (T) الأربعاء (W) الخميس (Th) الجمعة (F) السبت (S) الأحد (Sun) | | 3 أشهر (12 أسبوع) |

قد يجعلكم طبيبك أخذ الفيتامين B6 مع الدواء الخاص بكم.

الملاحظات

اسم طبيبي:

اسم عيادتي:

رقم الهاتف لعيادتي:



Scan this QR code for the most current Arabic version