

# 潛伏結核 (TB) 感染藥物的 須知事項

## ISONIAZID 和 RIFAPENTINE

您已獲得治療潛伏結核 (Tuberculosis, TB) 感染的藥物。您並未患有 TB 疾病且也不會將 TB 傳染給他人。此藥物的目的是要預防您罹患 TB 疾病。

### 請記得每週按時赴診：

您每週將需與醫療保健工作人員會面一次以服用您的藥物。此計劃稱為直接觀察治療 (Directly Observed Therapy, DOT)。

DOT 可能會透過幾種方式對您有幫助。

- 醫療保健工作人員可以協助您記得服用藥物。
- 您將可盡快完成治療。
- 醫療保健工作人員將會確保您沒有用藥方面的問題。
- 在每週會面期間，該醫療保健工作人員將可回答您的問題。您也可和其討論您持有的任何顧慮。

### 在服用此藥物期間：

- ✓ 請將您對藥物的疑問或顧慮告知醫生或護士
- ✓ 每週按時赴診。
- ✓ 與醫生或護士討論任何酒精的使用。在服用此藥物期間最好不要飲酒。
- ✓ 告知醫生或護士您正在服用的所有其他藥物。
- ✓ 請務必告知您的其他醫生您目前正在接受潛伏 TB 感染的治療。
- ✓ 有些人認為此藥物最好隨食物服用。

### 潛伏 TB 感染用藥時程：

(醫療服務提供者：請標示適當的天數及藥錠數量)

| 藥物                      | 時程   | 天數                       | 每天藥錠數量 | 時間長度           |
|-------------------------|------|--------------------------|--------|----------------|
| Isoniazid 和 Rifapentine | 每週一次 | 週一、週二、週三、週四、<br>週五、週六、週日 |        | 3 個月<br>(12 週) |

您的醫生可能會請您隨藥物服用維他命 B6。

### 註記

醫生姓名：

診所名稱：

診所電話號碼：



### 注意這些可能發生的問題：

如果您發生下列任何問題，請立即停止服用藥物並致電與您的 TB 醫生或護士聯絡：

- 食慾減退或沒有食慾
- 胃部不適或胃部痙攣
- 發燒
- 頭痛或身體痠痛
- 噁心或嘔吐
- 尿液呈可樂色或糞便顏色變淡
- 容易瘀青或出血
- 皮疹或搔癢
- 皮膚或眼睛顏色變黃
- 嚴重衰弱或疲勞
- 手部或腳部刺痛或發麻
- 頭昏

註：如果您的尿液、唾液或淚液呈橘色，這是正常現象。軟式隱形眼鏡可能會染色。

Scan this QR code for  
the most current  
Cantonese version

