

알아두어야 할 사항

잠복 결핵(TB) 감염에 필요한 약

이소니아지드와 리파펜틴 (ISONIAZID & RIFAPENTINE)

귀하는 잠복 TB 감염을 치료하는 약을 복용했습니다. 귀하는 TB에 걸리지 않았으며 타인에게 TB를 전염시키지 않습니다. 이 약은 TB 감염을 예방하기 위한 것입니다.

주간 방문을 시간을 지켜 주십시오.

매주 약 복용을 위해 보건 담당자를 만나게 될 것이며, 이러한 방법을 직접복약 확인 치료(DOT)라고 합니다.

DOT는 다음의 몇 가지 방법으로 도움을 줄 수 있습니다.

- 보건 담당자가 약 복용을 기억하도록 도와 드립니다.
- 최대한 빠른 시일 내에 치료를 완료할 것입니다.
- 보건 담당자가 복용하는 약과 관련된 문제가 없는지 확인할 것입니다.
- 주간 방문 시간에 보건 담당자가 질문에 답변해 드릴 수 있습니다. 우려 사항이 있다면 이때 상담할 수도 있습니다.

약 복용 기간에 해야 할 일:

- ✓ 약에 대한 질문이나 문제점이 있다면 담당 의사나 간호사에게 알려주세요.
- ✓ 주간 방문을 반드시 하십시오.
- ✓ 의사나 간호사와 음주에 대해 상담하십시오. 이 약을 복용하는 동안에는 술을 마시지 않는 것이 가장 좋습니다.
- ✓ 담당 의사나 간호사에게 현재 복용 중인 다른 모든 약에 대해 알려주세요.
- ✓ 본인이 만나는 다른 의사들에게도 잠복 TB 감염 치료를 받고 있음을 알려주세요.
- ✓ 식사 중에 약을 복용하는 것이 낫다고 생각하는 사람들도 있습니다.

잠복 TB 감염 치료제 복용 일정:

(서비스 제공자: 해당 요일 및 복용량을 표시하십시오)

약	일정	요일	하루 복용량(정제)	복용 기간
이소니아지드와 리파펜틴	주 1회	월 화 수 목 금 토 일		3개월 (12주)

담당 의사가 현재 약과 비타민 B6를 함께 복용하도록 지시할 수 있습니다.

참고

담당 의사 이름:
병원 이름:
병원 전화번호:



다음의 문제점을 주의하십시오.

다음 증상이 있다면 즉시 약 복용을 중단하고 담당 의사나 간호사에게 전화하십시오.

- 식욕 부진 또는 식욕을 전혀 느끼지 않음
- 위장 장애 또는 위 경련
- 고열
- 두통 또는 몸살 기운
- 메스꺼움 또는 구토
- 짙은 갈색 소변 또는 묽은 대변
- 잦은 타박상 또는 출혈
- 발진 또는 가려움증
- 피부나 안구의 황달 증상
- 심한 무기력증 또는 피로감
- 손이나 발이 얼얼하거나 무감각한 증상
- 현기증

참고: 소변, 침 또는 눈물이 오렌지색을 띠는 것은 정상입니다. 소프트 콘택트 렌즈에 얼룩이 생길 수 있습니다.

Scan this QR code for the most current Korean version

