

# 您需要了解的内容

## 关于治疗潜伏性结核 (TB) 感染的药物

### ISONIAZID 和 RIFAPENTINE

您已经被给予治疗潜伏性结核感染的药物。您没有患结核病, 也不会将结核病传染给其他人。服药是为了**预防**您患结核病。

#### 记住每周按时就诊:

您将每周与健康护理人员会面, 以拿取您的药。该计划被称为直接观察疗法 (DOT)。

DOT 可以多种方式帮助您。

- 健康护理人员会提醒您服用药物。
- 您将尽快完成治疗。
- 健康护理人员将确保您在服用药物期间不会出现任何不适。
- 在您每周会面中, 健康护理人员可以回答您的问题。您也可以谈论您有的任何担忧。

#### 在服药期间:

- ✓ 如果您对该药物有任何疑问或担忧, 请告诉您的医生或护士。
- ✓ 每周去就诊。
- ✓ 与您的医生或护士讨论任何饮酒情况。服药期间最好不要饮酒。
- ✓ 告诉您的医生或护士您正在服用的所有其他药物。
- ✓ 请一定要告诉您的其他医生您正在接受潜伏性结核感染治疗。
- ✓ 有人发现, 随饭服用药物效果更好。

#### 潜伏性结核感染药物时间表:

(提供者: 指明服药的适当日期和数量)

药物	时间表	日期	每天服药数量	时间长度
Isoniazid 和 Rifapentine	一周一次	周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日		3 个月 (12 周)

您的医生可能会让您随药服用维生素 B6。

#### 备注

我的医生的姓名:

我的诊所名称:

我的诊所电话号码:



#### 注意这些可能的问题:

**如果您有以下任何问题, 停止服药, 并立即致电您的结核医生或护士:**

- 食欲不振或没有食欲
- 胃部不适或胃痉挛
- 发烧
- 头痛或身体疼痛
- 恶心或呕吐
- 可乐色尿液或轻度腹泻
- 容易瘀伤或出血
- 皮疹或瘙痒
- 皮肤或眼睛发黄
- 严重虚弱或疲倦
- 手脚刺痛或麻木
- 头晕

**注意:** 如果您的尿液、唾液或眼泪变成橙色, 这是正常现象。软式隐形眼镜可能会变脏。

Scan this QR code  
for the most current  
Mandarin version

