

Meningococcal ACWY ክትባት: ማወቅ የሚገባዎት

Many Vaccine Information Statements are available in Spanish and other languages. See www.immunize.org/vis
Hojas de información sobre vacunas están disponibles en español y en muchos otros idiomas. Visite www.immunize.org/vis

1 መከተብ ለምን አስፈለገ?

Meningococcal (ሜኒንጅኮካል) በሽታ ከባድ የሆነ በሽታ ሲሆን *Neisseria meningitidis* (ኒዬሮሴሪያ ሜኒንጅይተስ) በሚባል ባክቴሪያ አማካይነት የሚፈጠር ነው። ለሜኒንጅይተስ (የአእምሮ እና የህብሉ ሰረሰር መስመር ኢንፌክሽን) እና ለደም ኢንፌክሽን ሊዳርግ ይችላል። Meningococcal (ሜኒንጅኮካል) በሽታ አብዛኛውን ጊዜ ያለምንም ማስጠንቀቂያ የሚፈጠር ሲሆን ጤናማ በሆኑ ሰዎች ላይ ይከሰታል።

Meningococcal በሽታ ከሰው ወደ ሰው ቅርብ በሆነ ንክኪ (በማሳል ወይም በመሳሰሉ) ወይም በረጅም ንክኪ፣ በተለይ አንድ ቤት ውስጥ በሚኖሩ ሰዎች መካከል ሊስፋፋ ይችላል።

ቢያንስ 12 አይነት *N. meningitidis* ያሉ ሲሆን “serogroups” በሚባል ይጠራሉ። Serogroups A፣ B፣ C፣ W፣ እና Y አብዛኛውን የ meningococcal ህመም የሚፈጥሩ ናቸው።

ሁሉም ሰው የ meningococcal በሽታ ሊያዝ ይችላል ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ከሌላ በተለየ የበለጠ ስጋት:

- ከአንድ ዓመት በላይ የሆኑ ህጻናትን
- ከ 16 እስከ 23 ዓመት ውስጥ ያሉ ጎረምቶችና ወጣቶችን
- የሰውነት የመከላከል አቅምን የሚጎዳ በሽታ ታማሚዎችን
- ከ *N. meningitidis* ጋር ተለይተው የሚሰሩ ማይክሮን ባዮሎጂስቶችን
- በወረርሽኝ ጊዜ ስጋት ውስጥ ያሉ ሰዎች

በሚታከምበት ጊዜ፣ በሽታ ከ 100 ሰዎች ውስጥ ከ 10 እስከ 15 የሚሆኑትን ይገድላል። ከተረፉት 100 ውስጥ ሰዎች ከ 10 እስከ 20 ሰዎች እንደ የመስማት ችግር፣ የአእምሮ ጉዳት፣ የኩላሊት ጉዳት፣ እግር መቆረጥ፣ የነርቭስ ሲስተም ችግሮች ወይም ከቆዳ ችግር የተነሳ ጠባሳ ችግሮች ያጋጥማቸዋል።

Meningococcal ACWY ክትባት meningococcal በሽታ ፈጣሪ የሆኑትን serogroups A, C, W, እና Y ን ይከላከላል። የተለየ የ meningococcal ክትባት ከ serogroup B የሚከላከል ክትባት ነው።

2 Meningococcal ACWY ክትባት

Meningococcal conjugate ክትባት (MenACWY) ምግብ እና መድሀኒት አስተዳደር (FDA) ፈቃድ ያለው ሲሆን ከ serogroups A, C, W, እና Y ይከላከላል።

ከ 11 እስከ 18 ዓመት ዕድሜ ላይ ለሚገኙ ታዳጊዎች ሁለት የ MenACWY ዶስቶች በተደጋጋሚ ይመከራሉ። የመጀመሪያው ዶስ ለ 11 ወይም ለ 12 ዓመት፣ ለ 16 ዓመት ደግሞ የጨመረ ዶስ። አንዳንድ ታዳጊዎች፣ HIV ያለባቸውንም ጨምሮ፣ ተጨማሪ ዶስ ማግኘት አለባቸው። ለበለጠ መረጃ የህክምና እንክብካቤ ሰጪዎን ያማክሩ።

ለታዳጊዎች ተደጋጋሚ ክትባት ከመስጠት በተጨማሪ፣ MenACWY ክትባት ለአንዳንድ ሰዎች መስጠት ይመከራል።

- በ serogroup A፣ C፣ W፣ ወይም Y meningococcal በሽታ ወረርሽኝ ጊዜ ለአደጋ የሚጋለጡ ሰዎች
- በ HIV (ኤችአይቪ) የተያዙ ሰዎች
- ማንኛውም ቆሽቱ የተጎዳ ወይም የወጣ እንዲሁም የ sickle ሴል በሽታ ያለበት ሰው።
- “Persistent complement component deficiency” በሚባል በጣም አልፎ አልፎ በሚከሰት የበሽታ መከላከል አቅም መዳከም ያለበት ሰውን
- ማንኛውም eculizumab (ወይም Soliris®) የሚባል መድሀኒትን የሚወስድ ሰውን
- ከ *N. meningitidis* ጋር ተለይተው የሚሰሩ ማይክሮን ባዮሎጂስቶችን
- ለምሳሌ እንደ አፍሪካ ውስጥ ያሉ meningococcal በሽታዎች በብዛት ወደሚገኙባቸው ቦታዎች መጓዝ፣ መኖርን
- በዶርም ውስጥ የሚኖሩ አዲስ የኮሌጅ ተማሪዎች
- የአሜሪካ ውትድርና ተቀጣሪዎችን

አንዳንድ ሰዎች ከፍተኛ የላ መከላከያ ዶስ ያስፈልጋቸዋል። ምን ያህል እና በየሰንት ጊዜ እንደሚወሰድ እንዲሁም ቡስተር ዶስቶችን በተመለከተ የጤና እንብካቤ ሰጪዎን ይጠይቁ።

የእኩልነት እንክብካቤ አገልግሎት ሰጪ (ዎች) ትክክለኛ የክትባት ሁኔታ መረጃ እንዲኖራቸው፣ የክትባት ግምገማ፣ እና ለወደፊት ክትባቶች የቀረበ መርጋ ጉብር ለመፍተጅ መረጃ ለምትጋን እንክብካቤ ማሻሻያ መዝገብ ቤት (Michigan Care Improvement Registry) ይላካል። የእኩልነት እንክብካቤ አገልግሎት ሰጪ አካላት የክትባት መረጃ ለመዝገብ ቤቱ እንዳያታብሉ ለመጠየቅ ግለሰቦች መብት አላቸው።



3 አንዳንድ ሰዎች ይህንን ክትባት መውሰድ የለባቸውም

ክትባቱን ለሚሰጥ ሰዎች ምንም እድገት ህይወትን አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል አለርጂክ ያለብዎ ከሆነ ያሳውቁ። ከዚህ በፊት ከወሰዱት ከ meningococcal ACWY ክትባት ዶስ የተነሳ ህይወትን አደጋ ላይ የሚጥል አለርጂ ከተነሳብዎ ወይም ከዚህ ክትባት ጋር በተያያዘ ከባድ አለርጂ አጋጥመዎ የሚያውቅ ከሆነ፣ ይህንን ክትባት አይውሰዱ። ስለ ክትባቱ ይዘቶች ክትባት ሰጪዎ ሊነግሩዎት ይችላሉ።

እርጉዝ ለሆነች ወይም ለምታጠባ ሴት ስለዚህ ክትባት ብዙ የሚታወቅ ስጋት የለም። ነገር ግን እርግዝና እና ማጥባት የ MenACWY ክትባትን ላለመውሰድ ምክንያት አይደለም። እርጉዝ ወይም የምታጠባ ሴት ከፍ ያለ በ meningococcal የመያዝ እድል ያላት እንደሆነ ክትባቱን መውሰድ አለባት።

ከባድ ያልሆነ ህመም ማለትም እንደ ጉንፋን ያለ ህመም ካለብዎ ዛሬውኑ ክትባቱን ሊያገኙ ይችላሉ። ከባድ ያለ ወይም በጣም ህመም ላይ ከሆኑ፣ እስኪሻገሩ ድረስ ይጠብቁ። ሀኪምዎ ሊያማክርዎ ይችላል።

4 የክትባት ምላሽ ስጋት

ክትባትን ጨምሮ በሁሉም መድሀኒቶች የጎንዮሽ ጉዳት የመፈጠር እድል አለ። እነዚህ መለስተኛ ሲሆኑ በትንሽ ቀናት ውስጥ በራሳቸው የሚጠፉ ናቸው፤ ነገር ግን ከባድ ህመም ሊፈጠር ይችላሉ።

Meningococcal ACWY ክትባትን ከሚወስዱ ግማሽ ሰዎች ከክትባት በኋላ መለስተኛ ህመም የተወጋበት ቦታ ላይ መቅለት መይም መቁሰል ያጋጥማቸዋል። እነዚህ ችግሮች የሚጠሩ ከሆነ፣ ከ 1 እስከ 2 ቀናት ድረስ ይቆያሉ።

ክትባቱን ከሚወስዱ ሰዎች ውስጥ ዝቅተኛ ፕሮሰንት ያላቸው ሰዎች የጡንቻ እና መገጣጠሚያ ህመም ይሰማቸዋል።

የትኛውንም ክትባት ከወሰዱ በኋላ የሚያጋጥሙ ችግሮች:

- ከህክምና በኋላ፣ ክትባትን ጨምሮ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ራሳቸውን ይስታሉ። ለ15 ደቂቃ መቀመጥ ወይም መተኛት ራስን መሳት እንዲሁም በመውደቅ የሚመጣውን ጉዳት ይከለክላሉ። የሚያዘርዎ ከሆነ ወይም የእይታ ችግር ካለ ለሀኪምዎ ያሳውቁ።
- ንዳንድ ሰዎች ትኩረት ላይ ከባድ ያለ ህመም ሲሰማቸው የተወጋበት አጃቸውን ማንቀሳቀስ ያስችግራቸዋል። ይህ አልፎ አልፎ የሚከሰት ነው።
- የትኛውም መድኃኒት ከባድ ያለ የአለርጂክ ሊያስነሳ ይችላል። ከክትባት የሚመጡ አለርጂክ በጣም አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ሲሆኑ 1 ከ 1 ሚሊዮን ይገመታል እናም ከክትባት ጊዜ በትንሽ ሰዓት ውስጥ ይጀምራሉ።

ልክ እንደ ሌላው መድኃኒት፣ ክትባት በጣም ከባድ ጉዳት ወይም ሞት የሚያስከስትልበት በጣም ጠባብ እድል አለ።

የክትባቶች ደህንነት ሁልጊዜ በቅርብ ክትትል ውሰጥ ነው። ለበለጠ መረጃ ይህን ይጎብኙ፡ www.cdc.gov/vaccinesafety/

5 አደገኛ የሆነ የአለርጂ ምልክት ቢኖርስ?

ማየት ያለብኝ ምንድነው?

• ስጋት የሆነብዎትን ነገር እንደ ከባድ የአለርጂ ምልክት፣ ከፍተኛ ትኩረት ወይም ያልተለመዱ ባህሪያትን ይመልከቱ።

ከፍተኛ የሆነ አለርጂክ አንድ ሀይብ፣ የፊት እና ጉሮሮ ማበጥ፣ የመተንፈስ ችግር፣ ከፍተኛ የልብ ምት፣ ማዘር እና ድካም የሚያካትት ሲሆን — ክትባቱን በወሰዱ በጥቂት ደቂቃዎች ወይም ሰአቶች ውስጥ ነው።

ምን ማድረግ አለብኝ?

• ከባድ የሆነ የአለርጂ ምልክት ወይም ሊቆይ የማይችል አስቸኳይ ከመሰለዎት 9-1-1 በመደወል አቅራቢያ ወዳለው ሆስፒታል ይሂዱ። ካለበለዚያ ሀኪምዎ ጋር ይደውሉ።

ከዚያ በኋላ የአለርጂው ምልክት ለ “Vaccine Adverse Event Reporting System” (VAERS) ሪፖርት መደረግ አለባት። ሀኪምዎ ይህንን ፋይል ሪፖርት ማድረግ አለባት ወይም እርስዎ ራስዎ የ VAERS ድረ ገጽን በ www.vaers.hhs.gov፣ በመጠቀም ወይም በ 1-800-822-7967 መደወል

ይችላሉ። VAERS የሀኪምና ምክር አይሰጥም።

6 ብሄራዊ የክትባት ጉዳት ካሳ ፕሮግራም

ብሄራዊ የክትባት ጉዳት ካሳ ፕሮግራም (VICP) የፌደራል ፕሮግራም ሲሆን በአንዳንድ ክትባቶች ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች የሚክስ ድርጅት ነው።


በአንድ ክትባት ምክንያት ጉዳት ደርሶብዎት ብለው የሚያስቡ ሰዎች ስለ ፕሮግራሙ መማር እና እንዴት የይገባኛል ፎርም መሙላት አንዳለባቸው መማር ይችላሉ። 1-800-338-2382 ላይ በመደወል ወይም VICP ድረገጽን በመጎብኘት www.hrsa.gov/vaccinecompensation. የካሳ ይግባኝ ጥያቄ የማቅረቢያ የጊዜ ገደብ አለ።

7 እንዴት የበለጠ ማወቅ እችላለሁ?

- የጤና እንክብካቤ ሰጪዎን ይጠይቁ። እርሱ ወይም እርሷ የክትባቱን ማብራሪያ ወረቀት ወይም ሌላ የመረጃ ምንጭን መጠቀም ይችላል/ትችላላች።
- የአካባቢያዎ ወይም የከተማው የጤና ክፍል ጋር ይደውሉ።
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ን ያግኙ፡
 - ለ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ይደውሉ - ወይም
 - www.cdc.gov/vaccines ድረገጽን ይጎብኙ።

DCH-0930AM AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.

Vaccine Information Statement (Interim)
Meningococcal ACWY Vaccines
 Amharic



Office use only