

ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ (ਫਲੂ) ਵੈਕਸੀਨ (ਜ਼ਿੰਦਾ, ਨਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ): ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

Many Vaccine Information Statements are available in Spanish and other languages. See www.immunize.org/vis

ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਦੇਖੋ www.immunize.org/vis

1 ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਈਏ?

ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ (ਫਲੂ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਲੂ ਇੱਕ ਛੂਤਕਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਫਲੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਬਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਮੂਨੀਆ, ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼, ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਫਲੂ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਫਲੂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਲੂ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਬਾ ਲੱਗਣ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਖੰਘ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਗਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਫਲੂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਾਈਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2 ਜ਼ਿੰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ

CDC ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ (Live, attenuated influenza vaccine) (ਜਿਸਨੂੰ LAIV ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਲੈਕੇ ਤੋਂ 49 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਗੈਰ-ਗਰਭਵਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਫਲੂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਮੇਲ ਨਾ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਫਲੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3 ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ:

- ਉਸਦੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ 49 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ।
- ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਬਰ, ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਐਲਰਜੀਆਂ ਹਨ।
- ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਔਲੂੜ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਲਗ ਹੈ ਜੋ ਐਸਪੀਰੀਨ ਜਾਂ ਐਸਪੀਰੀਨ-ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
- ਉਹ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ (wheezing) ਆਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
- ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ।
- ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਉਹ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਮਾਂ ਹੈ।
- ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁੰਝੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਤੰਤੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਤੰਤੂ-ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਢਾਹ-ਉਸਾਰੂ ਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ)।
- ਉਸਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਲੇਨ-ਬਰੇ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫੇਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ (ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰੀਕੌਂਬੀਨੈਂਟ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ) ਜ਼ਿੰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਕਾਮ, ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4 ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਖਮ

- LAIV ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਹਨ।

ਜੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਚਿਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਸੇ ਤੀਬਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ-ਫੇਟ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ।

5 ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ?

ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਬਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ (ਛਪਾਕੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜਸ਼, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਦਿਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ), ਤਾਂ **9-1-1** ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈਕੇ ਜਾਓ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਵੈਕਸੀਨ ਅਡਵਰਸ ਈਵੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' (Vaccine Adverse Event Reporting System) (VAERS) ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। VAERS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.vaers.hhs.gov ਦੇਖੋ ਜਾਂ **1-800-822-7967** 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। VAERS ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ VAERS ਦਾ ਅਮਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

6

ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਸੱਟ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (The National Vaccine Injury Compensation Program)

ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਸੱਟ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (National Vaccine Injury Compensation Program) (VICP) ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ VICP ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.hrsa.gov/vaccinecompensation ਦੇਖੋ ਜਾਂ **1-800-338-2382** 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਹੈ।

7

ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

- ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।
- ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
- ਸੈਂਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ (CDC) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
 - ਕਾਲ ਕਰੋ **1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)** ਜਾਂ
 - CDC ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇਖੋ: www.cdc.gov/flu

DCH-1237PU

AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.

Translation provided by the California Department of Public Health, Immunization Branch

Vaccine Information Statement (Interim)
Live Attenuated
Influenza Vaccine



Office use only

8/15/2019 | Punjabi | 42 U.S.C. § 300aa-26

Punjabi

ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੇ ਲੋਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੇ, ਲੋਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Michigan Care Improvement Registry (ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਕੇਅਰ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰੀ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਲੋਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੇ।