

វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ (អសកម្ម ឬការកើតឡើងវិញ)៖ អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង

Many Vaccine Information Statements are available in Spanish and other languages. See www.immunize.org/vis
ព័ត៌មានថ្លែងការណ៍អំពីវ៉ាក់សាំងជាច្រើន អាចរកបានជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាដទៃទៀត។ ចូលមើល www.immunize.org/vis

1 ហេតុអ្វីបានជាត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ?

វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនផ្តាសាយអាចបង្ការជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ (ផ្តាសាយធំ)។

ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយជាជំងឺឆ្លងដែលរីកសាយភាយពេញសហរដ្ឋអាមេរិកជា រៀងរាល់ឆ្នាំ ជាពិសេសចន្លោះខែតុលា និងឧសភា។ នរណាក៏អាចកើតជំងឺ គ្រុនផ្តាសាយបានដែរ ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួន ជំងឺនេះអាចបង្ក គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង។ កូនដំបូងក្មេង មនុស្សអាយុ 65 ឆ្នាំនិងចាស់ជាងនេះ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាព ឬអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធសាំ ខ្សោយអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ។

ជំងឺរលាកសួត រលាកចង្កា ជំងឺចាញ់ក្នុងរន្ធន្លើង និង ជំងឺចាញ់ក្រចកគឺជាឧទាហរណ៍នៃជំងឺគ្រុនផ្តាសាយធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពដូចជា ជំងឺបេះដូង មហារីក ឬទឹកនោមផ្អែម ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយដែលកើតឡើងអាចមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។

ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយអាចបង្កជំងឺគ្រុន គ្រុនរងា ឈឺក ឈឺសាច់ដុំ អស់កម្លាំង ក្អក ឈឺក្បាល និងហៀរសំបោរ/តឹងច្រមុះ។ អ្នកខ្លះអាចក្អកនិងភាព ភាគច្រើន វាកើតឡើងក្រោយច្រើនជាងមនុស្សធំ។

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ មនុស្សរាប់លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្លាប់ដោយសារជំងឺ គ្រុនផ្តាសាយ ហើយមនុស្សជាច្រើនចូលមន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺនេះ។ វ៉ាក់ សាំងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបង្ការជំងឺរាប់លាន និងបង្ការការទៅជួបគ្រូពេទ្យដោយ ជំងឺផ្តាសាយ។

2 វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ

CDC បានណែនាំថាមនុស្សដែលមានអាយុពី 6 ខែ និងចាស់ជាងត្រូវ ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ រាល់រដូវគ្រុនផ្តាសាយ។ ក្មេងអាយុ 6 ខែដល់ 8 ឆ្នាំត្រូវចាក់ថ្នាំ 2 ម្តងក្នុងមួយរដូវគ្រុនផ្តាសាយម្តងៗ។ អ្នកផ្សេងត្រូវការចាក់ ថ្នាំមួយម្តងក្នុងរដូវគ្រុនផ្តាសាយម្តងៗ។

បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងរួច វាត្រូវការរយៈពេល 2 សប្តាហ៍ដើម្បីបង្កើតការការពារ។

វាមានវិស័យគ្រុនផ្តាសាយជាច្រើន ហើយវិស័យទាំងនោះតែងតែផ្លាស់ប្តូរ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ការ ទប់ទល់នឹងវិស័យផ្តាសាយបីទៅបួនដែលនឹងបង្កើតជាជំងឺនៅក្នុងរដូវគ្រុនផ្តា សាយខាងមុខ។ ទោះបីជាវ៉ាក់សាំងមិនត្រូវគ្នាជាមួយវិស័យទាំងស្រុងក៏ដោយ វានៅតែអាចការពារបានខ្លះៗ។

វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនផ្តាសាយមិនអាចបង្កឲ្យកើតជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបាន ទេ។

វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនផ្តាសាយនឹងត្រូវបានចាក់ក្នុងកំឡុងពេលតែមួយជា មួយវ៉ាក់សាំងដទៃទៀត។

3 ជំងឺជាក់ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព របស់អ្នក

ប្រាប់អ្នកផ្តល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង៖

- ធ្លាប់មានប្រតិកម្មអាល្លែហ្ស៊ីប្រឆាំងប្រព័ន្ធជាមួយជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ ឬមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ អាឡែហ្ស៊ីស៊ីប៊ីចៈពាល់ដល់ជីវិត។
- ធ្លាប់មានជំងឺទាក់ទងនឹងការខូចខាតប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទខួរក្បាលយូរៗ មានឈ្មោះថា Guillain-Barré Syndrome (GBS)

ក្នុងករណីមួយចំនួន អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអាចសម្រេចក្នុង ការពន្យារគារចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយទៅការណាត់ជួបលើកក្រោយ។

អ្នកដែលមានជំងឺបន្តិចបន្តួចដូចជា ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយប្រហែលជាអាចទទួលបាន ការចាក់វ៉ាក់សាំងបាន។ អ្នកដែលមានជំងឺស្រាលឬធ្ងន់គួរតែរង់ចាំ រហូតដល់ជាសះស្បើយសិន មុនពេលទទួលបានការចាក់ថ្នាំបង្ការ។

អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអាចផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់អ្នក។



4 ហានិភ័យនៃប្រតិកម្មថ្នាំវ៉ាក់សាំង

បណ្តើក ក្រហមនិងហើមនៅក្នុងកន្លែងចាក់ថ្នាំ គ្រុនក្តៅ ឈឺសាច់ដុំ និងឈឺប ក្បាលអាចកើតឡើងក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំង។

- វាអាចមានហានិភ័យតិចតួចក្នុងការកើតជំងឺទាក់ទងនឹងការខូចខាត ប្រព័ន្ធស្រទៅខួរក្បាលមានឈ្មោះថា Guillain-Barré Syndrome (GBS)។

ក្មេងតូចដែលទទួលបានការចាក់ថ្នាំគ្រុនផ្តាសាយ រួមជាមួយវ៉ាក់សាំង pneumococcal (PCV13) និងស្រូវវ៉ាក់សាំង DTaP នៅក្នុងពេលតែមួយអាចនឹងមានការប្រកាច់ដោយសារគ្រុនក្តៅ។ ប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ប្រសិនបើវាក្មេងដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងមានជំងឺប្រកាច់។

ពេលខ្លះមនុស្សខ្សោយចង់សន្លប់ក្រោយដំណើរការវេជ្ជសាស្ត្រ រួមទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរ។ ត្រូវប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកវិលមុខឬ ព្រិលភ្នែក ឬហឹងក្រចៀក។

ដូចនៅនឹងថ្នាំដទៃទៀតដែរ វាអាចមានឱកាសតិចតួចបំផុតដែលវ៉ាក់សាំងបង្កទៅជាប្រតិកម្មអាក្រក់ប្រើឆ្លងឆ្លូវ ឬរូសឆ្លងឆ្លូវដទៃទៀត ឬស្លាប់។

5 ចុះបើសិនមានប្រតិកម្មឆ្លងឆ្លូវ ?

ប្រតិកម្មអាក្រក់ប្រើឆ្លងឆ្លូវអាចកើតមានឡើង បន្ទាប់ពីអ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងចាក់ចេញពីគ្លីនិក។ ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសញ្ញានៃប្រតិកម្មអាក្រក់ប្រើឆ្លងឆ្លូវ (កន្ទាល់ក្រអាក ហើមមុខនិងបំពង់ក ពិបាកដកដង្ហើម បេះដូងលោតញាប់ វិលមុខឬខ្សោយ) ទូរស័ព្ទទៅ 9-1-1 និងនាំជននោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុត។

សម្រាប់ធានាសញ្ញាផ្សេងទៀតដែលអ្នកមានការបារម្ភ សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព។

ប្រតិកម្មត្រូវគ្រប់គ្រងត្រូវបានរាយការណ៍ទៅកាន់ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ថ្នាំបង្ការរោគមិនល្អ (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS)។ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពនឹងធ្វើការរាយការណ៍ឬអ្នកធ្វើវាខ្លួនឯង។ ចូលមើល VAERS ទៅកាន់គេហទំព័រ www.vaers.hhs.gov ឬទូរស័ព្ទទៅកាន់ 1-800-822-7967។ VAERS គឺជាការរាយការណ៍ប្រតិកម្មតែមួយគត់ ហើយបុគ្គលិក VAERS ក៏មិនផ្តល់ដំបូន្មានវេជ្ជសាស្ត្រដែរ។

ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខភាពស្នើសុំនូវព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគពេញលេញប្រក្រតីមត្រូវ ការពិនិត្យមើលនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ហើយនិងការតម្រូវដាក់ពេលវេលា សំរាប់ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៅអនាគត. ព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនឹងធ្វើទៅមន្ទីរ Michigan Care Improvement Registry ។ បុគ្គលទាំងឡាយមានសិទ្ធិស្នើសុំអោយអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខ ភាពមិនអោយបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះទៅឱ្យកន្លែងទុកសំណុំរឿងបាន។

6 កម្មវិធីជាតិសងសំណងរបួសថ្នាំបង្ការរោគ

កម្មវិធីជាតិសងសំណងរបួសថ្នាំបង្ការរោគ (National Vaccine Injury Compensation Program, VICP) គឺជាកម្មវិធីសហព័ន្ធ ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីសងសំណងឱ្យមនុស្សដែលបានទទួលរង របួសដោយថ្នាំបង្ការរោគខ្លះៗ។ ចូលគេហទំព័រ VICP

តាមរយៈ: www.hrsa.gov/vaccinecompensation ឬទូរស័ព្ទទៅកាន់ 1-800-338-2382 ដើម្បីស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីនិងបំពេញការទាមទារ។ វាមានការកម្រិតពេល ដើម្បីប្តឹងបណ្តឹងសំណង សម្រាប់ប្រាក់សំណង។

7 តើខ្ញុំអាចស្វែងយល់ថែមទៀតយ៉ាងដូចម្តេច ?

- បស្ចឹមអ្នកផ្តល់ការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។
- បទូរស័ព្ទទៅក្រសួងសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន ឬរដ្ឋ។
- ទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់ទប់ទល់ និងការពារជំងឺ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC):-
 - ទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
 - មើលគេហទំព័ររបស់ CDC នៅ www.cdc.gov/fslu

DCH-0457CA
AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.

Translation provided by the California Department of Public Health, Immunization Branch

Vaccine Information Statement (Interim)
Inactivated Influenza Vaccine



Office use only

8/15/2019 | Khmer | 42 U.S.C. § 300aa-26