

疫苗信息声明

RSV (呼吸道合胞病毒) 疫苗： 须知事宜

Many Vaccine Information Statements are available in Simplified Chinese and other languages. See www.immunize.org/vis

许多疫苗信息声明均提供简体中文和其他语言的版本。请参阅 www.immunize.org/vis

1. 为何接种疫苗？

RSV (呼吸道合胞病毒) 可以预防由呼吸道合胞病毒 (Respiratory Syncytial Virus, RSV) 引起的下呼吸道疾病。RSV 是一种常见的呼吸道病毒，通常会引起轻度感冒样症状。

RSV 通常通过直接接触病毒传播，例如其他人咳嗽或打喷嚏时产生的飞沫接触到您的眼睛、鼻子或嘴巴。触摸带有病毒的表面 (如门把手)，然后在洗手前触摸脸部，也可能传播病毒。

RSV 可导致所有年龄段的人患病，但对婴儿和老年人来说可能尤其严重。患有诸如心脏病或肺病等慢性疾病、免疫系统较弱或住在疗养院或长期护理机构的婴儿和老年人是 RSV 引起严重疾病和并发症的高危人群。

RSV 感染的症状可能包括流鼻涕、食欲下降、咳嗽、打喷嚏、发热或喘鸣。大多数人在一两周内就会康复，但 RSV 可能很严重，会导致呼吸急促和低氧水平。RSV 有时还会导致其他疾病恶化，如哮喘、慢性阻塞性肺病 (一种使人呼吸困难的慢性肺部疾病) 或充血性心力衰竭 (心脏无法泵出足够的血液和氧气通过身体)。

因 RSV 而病重的老年人和婴儿可能需要住院治疗。有些人甚至可能会死亡。

2. RSV 疫苗

CDC 建议 60 岁及以上的成人可根据患者和医疗服务人员之间的讨论接种单剂 RSV 疫苗。

RSV 疫苗可与其他疫苗同时接种。

3. 请咨询您的医疗保健专业人士

如果接种疫苗者有以下情况，请告诉您的疫苗接种服务提供者：

- 之前注射过 RSV 疫苗后出现过过敏反应，
或有任何严重的、危及生命的过敏反应

在某些情况下，医务人员可能会决定将 RSV 疫苗接种推迟至下次就诊。

患有诸如感冒等轻微疾病者可以接种疫苗。但对于患有中度或重度疾病的人，应当等康复后再接种 RSV 疫苗。

您的医务人员可向您提供更多信息。



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

4. 疫苗反应的风险

- 接种 RSV 疫苗后可能会出现注射部位疼痛、红肿、疲劳(感觉疲倦)、发烧、头痛、恶心、腹泻、肌肉或关节疼痛等症状。

在临床试验中,接种 RSV 疫苗后极少出现严重的神经系统疾病,包括吉兰-巴雷综合征(Guillain-Barré Syndrome, GBS)。目前尚不清楚疫苗是否导致了这些事件。

人们有时会在接受医疗程序(包括疫苗接种)后昏厥。如果您感到头晕或视力有变或产生耳鸣,请告知您的疫苗接种服务提供者。

与使用任何药物一样,接种疫苗有可能引发严重的过敏反应、其他严重损伤或死亡,但可能性极小。

5. 如果出现严重问题怎么办?

过敏反应可能会在接种疫苗者离开诊所后发生。如果您注意到严重过敏反应的体征(荨麻疹、面部和喉咙肿胀、呼吸困难、心跳加快、头晕或无力),请致电 9-1-1,并将该人士送到最近的医院。

如出现其他让您担心的体征,请致电您的医务人员。

应将不良反应报告给 Vaccine Adverse Event Reporting System (疫苗不良事件报告系统, VAERS)。您的医务人员通常会提交这份报告,不过您也可以自己提交。请访问 VAERS 网站 www.vaers.hhs.gov, 或致电 1-800-822-7967。VAERS 仅用于报告反应,VAERS 工作人员不会给予医疗建议。

為了使醫療護理服務提供者獲得準確的免疫接種狀況資訊,進行免疫接種評估,並對今後的免疫接種安排提出建議,須向Michigan Care Improvement Registry (密西根州護理改善註冊局)提供資訊。個人有權要求其醫療護理服務提供者不要將免疫接種資訊送交給註冊局。

MDHHS-Pub-1397C

AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.

Simplified Chinese translation provided by Immunize.org

Vaccine Information Statement
RSV Vaccine

7/24/2023

OFFICE
USE
ONLY

