

بیانیه اطلاعات واکسن

Many Vaccine Information Statements are available in Farsi and other languages. See www.immunize.org/vis

بسیاری از بیانیه های اطلاعات واکسن به زبان فارسی و زبان های دیگر در دسترس است. به www.immunize.org/vis نشانی زیر مراجعه کنید.

3. با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود گفتگو کنید

در صورت وجود موارد ذیل در فرد دریافتکننده واکسن، این موضوع را به ارائه دهنده واکسن اطلاع دهید:

- پس از دوز قبلی هر واکسنی که از شخص در برابر کزان یا دیفتری محافظت می کند، واکنش آرژیک داشته با هرگونه آرژی شدید و مرگبار داشته است
- تا به حال به سندرم گیلن باره مبتلا بوده است (که با نام Guillain-Barré Syndrome, GBS“ نیز شناخته می شود)
- پس از دوز قبلی هر واکسنی که از شخص در برابر کزان یا دیفتری محافظت می کند، درد یا تورم شدید داشته است

در برخی موارد، ممکن است ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی تصمیم بگیرد واکسیناسیون Td را تا ملاقات بعدی به تعویق بیندازد.

افراد مبتلا به بیماری های جزئی، مانند سرماخوردگی می توانند واکسینه شوند. اشخاصی که بیماری متوسط یا شدید دارند، معمولاً باید تا بهبود کامل صبر کنند سپس واکسن Td را دریافت نمایند.

ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی شما می تواند اطلاعات بیشتری در اختیارتان قرار دهد.

واکسن Td (کزان، دیفتری): آنچه باید بدانید

1. چرا باید واکسن زد؟

واکسن Td می تواند از بروز کزان و دیفتری پیشگیری کند.

کزان از طریق بریدگی یا زخم وارد بدن می شود. دیفتری از یک شخص به شخص دیگر منتقل می شود.

▪ **کزان (TETANUS, T)** باعث سفت شدن دردناک عضلات می شود. کزان می تواند منجر به مشکلات جدی برای سلامت شود، از جمله ناتوانی در باز کردن دهان، مشکل در بلع و تنفس یا مرگ.

▪ **دیفتری (DIPHTHERIA, D)** می تواند منجر به بروز مشکلات تنفسی، نارسایی قلبی، فلنج یا مرگ شود.

2. واکسن Td

واکسن Td فقط مخصوص کودکان 7 ساله یا بزرگتر، نوجوانان و بزرگسالان است.

واکسن Td معمولاً به عنوان دوز تقویت کننده هر 10 سال یا بعد از 5 سال در صورت بروز زخم یا سوختگی شدید یا آلوده تجویز می شود.

می توان از واکسن دیگری به نام ”Tdap“ بجای Td استفاده کرد. واکسن Tdap علاوه بر کزان و دیفتری، از فرد در برابر سیاه سرفه که با نام ”سرفه سیاه“ نیز شناخته می شود، محافظت می کند.

واکسن Td می تواند همزمان با واکسن های دیگر تجویز شود.



**U.S. Department of
Health and Human Services**
Centers for Disease
Control and Prevention

6. برنامه ملی جبران خسارت آسیب واکسن

National Vaccine Injury Compensation Program (برنامه ملی جبران خسارت آسیب واکسن) (VICP) یک برنامه فدرال است که برای جبران خسارت افرادی که ممکن است در اثر واکسن آسیب دیده باشند، ایجاد شده است. تشکیل پرونده جهت ادعاهای مربوط به جراحت یا مرگ ناشی از واکسیناسیون دارای محدودیت زمانی است که این دوره ممکن است دو سال باشد. به وبسایت VICP www.hrsa.gov/vaccinecompensation شماره ۱-۸۰۰-۳۳۸-۲۳۸۲ تماس بگیرید تا در مورد این برنامه و نحوه طرح ادعا اطلاعات کسب نمایید.

7. چطور می‌توانم اطلاعات بیشتری گسب کنم؟

- در این زمینه از ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی خود سؤال کنید.
- با اداره بهداشت محلی یا ایالتی خود تماس بگیرید.
- برای مشاهده بروشور بسته واکسن و اطلاعات بیشتر به وبسایت Food and Drug Administration (FDA) (سازمان غذا و دارو) به این آدرس مراجعه کنید: www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
- با Centers for Disease Control and Prevention (مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها) (CDC) تماس بگیرید: با شماره ۱-۸۰۰-۴۶۳۶-۲۳۲ تماس بگیرید یا به وبسایت CDC به این آدرس مراجعه کنید: www.cdc.gov/vaccines

برای اینکه ارائه دهنده مراقبت‌های پزشکی، اطلاعات دقیقی در مورد وضعیت واکسیناسیون، تشخیص واکسیناسیون و برنامه پیشنهاد شده واکسیناسیونهای آینده دریافت آنند، Michigan Care Improvement Registry برای فرستاده خواهد شد. افراد این حق را دارا می‌باشند از اطلاعاتی به ارائه دهنده مراقبت‌های پزشکی خود بخواهند آه اطلاعات واکسیناسیون را به دفتر ثبت ارسال نکنند.

4. خطرات واکنش به واکسن

▪ گاهی اوقات پس از واکسیناسیون Td درد، قرمزی یا تورم در محل تزریق واکسن، تب خفیف، سردرد، احساس خستگی و تهوع، استفراغ، اسهال یا دل درد رخ می‌دهد.

گاهی اوقات افراد پس از یک رویه پژوهشی از جمله واکسیناسیون غش می‌کنند. اگر احساس سرگیجه، یا تغییر در بینایی یا زنگ زدن گوش دارید، به ارائه‌دهنده خود اطلاع دهید.

در مورد واکسن نیز مانند هر داروی دیگری، احتمال بسیار اندکی وجود دارد که شخص دچار واکنش شدید آرژیک، آسیب جدی دیگر یا مرگ شود.

5. اگر واکنش جدی وجود داشته باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

ممکن است واکنش آرژیک پس از خروج فرد واکسینه شده از کلینیک رخ دهد. در صورت مشاهده علائم واکنش آرژیک شدید (کهیر، تورم صورت و گلو، مشکل در تنفس، ضربان قلب بالا، سرگیجه یا ضعف)، با شماره ۱-۸۰۰-۷۹۶۷-۸۲۲-۴۶۳۶ تماس بگیرید و فرد را به نزدیکترین بیمارستان ببرید.

درخصوص سایر علائمی که شمارا نگران می‌کند، با ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی خود تماس بگیرید.

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) (سیستم گزارش دهی عوارض جانبی واکسن) گزارش داده شود. معمولاً ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی تا ان گزارش را ارسال می‌کند، یا می‌توانید خودتان این کار را انجام دهید. به وبسایت VAERS به آدرس www.vaers.hhs.gov مراجعه کرده یا با شماره ۱-۸۰۰-۷۹۶۷-۸۲۲-۴۶۳۶ تماس بگیرید. VAERS فقط مخصوص گزارش دادن واکنش‌ها است و کارکنان VAERS توصیه‌های پزشکی ارائه نمی‌دهند.

