

សន្លឹក ័ត៍ មាន ស្តីពីថ្នាំវ៉ាក់សាំង

# វ៉ាក់សាំងរលាកថ្លើម B៖ តើលោកអ្នក គួរ ដឹងអ្វីខ្លះ

Many Vaccine Information Statements are available in Khmer and other languages. See [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃព័ត៌មានអំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាច្រើនគឺអាចរកបានជាភាសាខ្មែរ និងភាសាផ្សេងទៀត។  
ចូលមើល [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)

## 1. ហេតុអ្វីត្រូវ ចាំ ថ្នាំវ៉ាក់សាំង?

វ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចបង្ការ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាជំងឺថ្លើមដែលអាចបង្កឱ្យមានជំងឺស្រាលក្នុងរយៈពេលពីរបីសប្តាហ៍ ឬអាចបណ្តាលឱ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពេញមួយជីវិត។

- ការឆ្លងមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ស្រួចស្រាវ គឺជាជំងឺរយៈពេលខ្លីដែលអាចនាំឱ្យក្តៅខ្លួន អស់កម្លាំង បាត់បង់ចំណង់អាហារ ចង្កោរ ក្អក ជម្ងឺខាន់លឿង (ស្បែកលឿង ឬភ្នែកទឹកនោមល្អក លឿងស្លេក) និងឈឺសាច់ដុំ សន្លាក់ និងក្រពះ។
- ការឆ្លងមេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B វ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ពេលយូរ ដែលកើតឡើង នៅពេលមេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B បន្តស្ទុកនៅក្នុងរាងកាយមនុស្ស។ មនុស្សភាគច្រើន ដែលបន្តទៅកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B វ៉ាក់សាំង មិនមានរោគសញ្ញាទេ ប៉ុន្តែវាបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាត ហើយអាចបណ្តាលឱ្យខូចថ្លើម (cirrhosis) មហារីកថ្លើម និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិត។ មនុស្សដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B វ៉ាក់សាំង អាចចម្លងមេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទៅអ្នកដទៃទៀត បើទោះបីជាពួកគេហាក់បីដូចជាមិនឈឺ ឬគ្មានអារម្មណ៍ឈឺក៏ដោយ។

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឆ្លង នៅពេលឈាម ទឹកកាម ឬ ត្បូង រ ទំនាក់ទំនងរាងកាយដទៃទៀត ដែលមានមេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សណាម្នាក់ ដែលមិនកើតជំងឺនេះ។ មនុស្សអាចឆ្លងតាមរយៈ៖

- ការបង្កកំណើត (ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទារករបស់ពួកគេអាចឆ្លង)
- ការប្រើឆ្នុត ដូច ជាកាំបិតកោរ ឬ ច្រាស់ដុសធ្មេញ រួម គ្នាជាមួយនិងអ្នកកើតជំងឺនេះ
- ប៉ះពាល់ឈាម ឬដំបៅរបស់អ្នកកើតជំងឺនេះ
- រួមភេទជាមួយអ្នកកើតជំងឺនេះ
- ប្រើ ឬ ស៊ី វ៉ាក់សាំង ឬគ្រឿងបរិក្ខារចាក់ថ្នាំដទៃទៀតរួមគ្នា
- ប៉ះពាល់ ឈាម ក្បាល មាត់ ឬឧបករណ៍មុតស្រូចដទៃទៀត

មនុស្សភាគច្រើនដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B មានភាពសុវត្ថិភាពមួយជីវិត។

## 2. វ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

វ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជាធម្មតាត្រូវបានចាក់ជា 2, 3, ឬ 4 ដង។

ទារក គួរទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដូសទីមួយនៅពេលកើត ហើយជាធម្មតា នឹងទទួល ដូស ថ្នាំគ្រប់ ច្បាប់ នៅ

អាយុ 6 ខែ ដល់ 18 ខែ។ កម្រិតថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ពីកំណើត គឺជា ផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុង ការការពារជំងឺរយៈពេលវែងចំពោះទារក និងការរីករាលដាលនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។

ការ និងក្មេងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលមានអាយុតិចជាង 19 ឆ្នាំដែលមិនទាន់ទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំង ក៏គួរទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះផងដែរ។

មនុស្សពេញវ័យ ដែល បាន ចាក់ ថ្នាំវ៉ាក់ សាំង ពីមុន ហើយចង់បង្ការជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ក៏អាចទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះបានផងដែរ។

វ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ក៏ត្រូវបានណែនាំសម្រាប់មនុស្ស ដូចខាងក្រោម៖

- មនុស្សដែលដៃគូរួមភេទកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B
- មនុស្សដែលរួមភេទ ដែលមិនស្ថិតក្នុងទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងមួយទល់មួយ
- មនុស្សដែលស្នើសុំការវាយតម្លៃ ឬការព្យាបាលចំពោះជំងឺឆ្លងតាមការរួមភេទ
- ជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារ ឬបំពានផ្លូវភេទ
- បុរសដែលរួមភេទជាមួយបុរសដទៃទៀត
- មនុស្សដែលប្រើមូល ស៊ីវ៉ាង ឬគ្រឿងបរិក្ខារចាក់ថ្នាំដទៃទៀតរួមគ្នា
- មនុស្សដែលរស់នៅជាមួយសមាជិកគ្រួសារ ដែលឆ្លងមេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B
- គ្រូបង្រៀន មន្ត្រី សុខភាព និងសុវត្ថិភាពសាធារណៈ ដែលមានហានិភ័យប៉ះពាល់ឈាម ឬត្បូងរ រ ទំនាក់ទំនងរាងកាយ
- អ្នក ស្នាក់ នៅ និងបុគ្គលិកនៃអគារសម្រាប់អ្នកមានពិការភ្នែកលូតលាស់
- អ្នកនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង ឬពន្ធនាគារ
- អ្នក ធ្វើ ដំណើរទៅតំបន់ ដែលមានអត្រាកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ខ្ពស់
- មនុស្សកើតជំងឺថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃ ជំងឺត្រូវដកថ្លើម ផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ឬជំងឺទឹកនោមផ្អែម

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរលាកថ្លើម B អាចផ្តល់ជូនជាចំណង ឬជាផ្នែកមួយជាមួយវ៉ាក់សាំងផ្សេង (ប្រភេទវ៉ាក់សាំង ដែលអាចផ្សំគ្នាជាមួយវ៉ាក់សាំងលើសពី មួយមុខសម្រាប់ចាក់ម្តង)។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចចាក់នៅពេលដំណាលគ្នានឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងដទៃទៀត។



U.S. Department of Health and Human Services  
Centers for Disease Control and Prevention

### 3. និយាយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀត។

ប្រាប់អ្នកផ្តល់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក ប្រសិនបើបុគ្គលនោះទទួលបានវ៉ាក់សាំង៖

- មាន ប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីបន្ទាប់ពីការទទួលវ៉ាក់សាំងមុនដែលប្រឆាំងជំងឺរលាកថ្លើម B ឬ អាឡែហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ តំរូវការការពិនិត្យដល់ជំងឺរលាកថ្លើម B

ក្នុងករណីខ្លះ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំ សុខភាពរបស់អ្នកអាចសម្រេចចិត្តពិនិត្យពេល ការចាក់វ៉ាក់សាំងរលាកថ្លើម B រហូតដល់ការទៅជួបនាពេលខាងមុខ។

ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ឬបំបៅដោះកូនគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រសិនបើពួកគេមានហានិភ័យក្នុងការ កើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B។ ការមានផ្ទៃពោះ ឬការបំបៅដោះកូនមិនមែនជា ហេតុផល ដើម្បីចៀសវាងការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នោះទេ។

អ្នកដែលមានជំងឺស្រាល ដូចជាជំងឺផ្តាសាយ អាចទទួលថ្នាំបង្ការនេះបាន។ អ្នក ដែល មាន ជំងឺធ្ងន់ ឈឺ ឬ ជំងឺ រាង កាយ ដ៏ធ្ងន់ ដូចជា ជំងឺពាក់កណ្តាលស្បែកស្លេយ្យសិន មុនពេលទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B។

អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នកអាចផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់លោកអ្នកបាន។

### 4. ហានិភ័យ ពីតួ ប្រតិកម្មថ្នាំ វ៉ាក់ សាំង

- ការឈឺចាប់នៅកន្លែងចាក់ថ្នាំ ឬគ្រុនក្តៅអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីចាក់ វ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើម B។

ពេលខ្លះ មនុស្សស្លាប់ បន្ទាប់ពីដំណើរការវេជ្ជសាស្ត្ររួមទាំងការចាក់ ថ្នាំវ៉ាក់ សាំង។ សូមប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នក ប្រសិនបើលោកអ្នករលមុខ ឬ ក្អក ក្អាយ ឆ្អឹង ឬ ពូស ឡើងហឹងក្នុងត្រចៀក។

ដូចថ្នាំផ្សេងទៀតដែរ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងក៏ប្រសិនបង្កប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីបធ្ងន់ធ្ងរ រហូតដល់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេង ឬធ្វើឲ្យស្លាប់បានផងដែរ។

### 5. ចុះបើមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ?

ប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីបអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកទទួលថ្នាំបង្ការចាក់ចេញពីគ្លីនិក។ ប្រសិនបើអ្នកឃើញសញ្ញានៃប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីបធ្ងន់ធ្ងរ (កន្ទួលកហម ហើមមុខ និងបំពង់ក ពិបាកដកដង្ហើម បេះដូង លោតញាប់ រលមុខ ឬខ្សោយ) សូមទូរស័ព្ទទៅ 9-1-1 ហើយនាំអ្នកជំងឺ ទៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុត។

សម្រាប់សញ្ញាផ្សេងទៀតដែលធ្វើឱ្យអ្នកបារម្ភ សូមទូរស័ព្ទទៅអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។

Khmer translation provided by Immunize.org

ប្រតិកម្មទៅប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងត្រូវបានរាយការណ៍ទៅ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)។ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកជាធម្មតានឹងដាក់របាយការណ៍នេះ ឬអ្នកអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបាន។ សូមចូលទៅគេហទំព័រប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំវ៉ាក់សាំង [www.vaers.hhs.gov](http://www.vaers.hhs.gov) ឬទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ 1-800-822-7967។ ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំ (VAERS) សម្រាប់តែការរាយការណ៍ប៉ុណ្ណោះ។ បុគ្គលិករបស់ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំ (VAERS) មិន ផ្តល់ជំនួយនានាអំពីវេជ្ជសាស្ត្រទេ។

### 6. កម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង

National Vaccine Injury Compensation Program (កម្មវិធីជាតិ បង់ សំណងរបួស ដោយ សារ ថ្នាំវ៉ាក់សាំង (VICP)) គឺជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធ ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង់សំណងអ្នកទាំងឡាយដែលអាចរងរបួសដោយសារតែថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយចំនួន។ ការទាមទារទាក់ទងនឹងរបួស ឬការស្លាប់ដោយសារការទទួលថ្នាំបង្ការ មានពេលវេលាកំណត់សម្រាប់ការដាក់ឯកសារ ដែលអាចមានរយៈពេលខ្លីត្រឹមពីរឆ្នាំ។ សូមចូលទៅគេហទំព័រកម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង [www.hrsa.gov/vaccinecompensation](http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation) ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-338-2382 ដើម្បីសិក្សាអំពីកម្មវិធី និងការដាក់ពាក្យទាមទារ។

### 7. តើខ្ញុំអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតដោយរបៀបណា?

- សូមសួរអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នក។
- សូមទូរស័ព្ទទៅក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ ឬនៅមូលដ្ឋានរបស់លោកអ្នក។
- សូមចូលទៅ Food and Drug Administration (គេហទំព័ររដ្ឋបាលអាហារនិងឱសថ (FDA)) ដើម្បីទទួលបានកញ្ចប់សេវាកម្មថ្នាំបង្ការ និងព័ត៌មានបន្ថែម [www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines](http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines) ។
- Centers for Disease Control and Prevention (សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ និងបង្ការជំងឺ (CDC))៖
  - សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
  - ចូលមើលគេហទំព័ររបស់ CDC នៅ [www.cdc.gov/vaccines](http://www.cdc.gov/vaccines) ។

ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខភាពស្នើសុំនូវព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគពេញលក្ខណ៍ត្រឹមត្រូវ, ការពិនិត្យមើលនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ហើយនិងការតម្រូវដាក់ពេលវេលា សំរាប់ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៅអនាគត, ព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនឹងធ្វើទៅមន្ទីរ Michigan Care Improvement Registry ។ បុគ្គលទាំងឡាយមានសិទ្ធិស្នើសុំអោយអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខ ភាពមិនអោយបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំ បង្ការរោគនេះទៅឱ្យកន្លែងទុកសំណុំរឿងបាន។

DCH-0450CA

AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.