

ថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុន អ្វីដែលអ្នកត្រូវការដឹង


របាយការណ៍ព័ត៌មានស្តីអំពីថ្នាំបង្ការជាច្រើនមានជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរ។ សូមមើលនៅក្នុងគេហទំព័រ www.immunize.org/vis

1 ហេតុអ្វីបានត្រូវទទួលថ្នាំបង្ការ

ជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុន (អក្សរកាត់ជាភាសាអង់គ្លេស JE) គឺជាការបង្កោតដោយវីរុសជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុន។

- វាកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅផ្នែកជាចម្រើនស្រយាលនៃទ្វីបអាស៊ី។
- វាត្រូវចំលងតាមរយៈការខាំនៃមូសដែលមានជួរមេរោគ។ វាមិនចំលងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ឡើយ។
- គ្រោះថ្នាក់គឺមានកំរិតទាបខ្លាំងសំរាប់អ្នកធ្វើដំណើរស្ទើរគ្រប់រូប។ វាមានកំរិតខ្ពស់ជាងសំរាប់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលជំងឺឃើញមានច្រើនជាញឹកញាប់ ឬសំរាប់អ្នកដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរ។
- មនុស្សសឹងគ្រប់រូបដែលមានការបង្កោតដោយវីរុសជំងឺ JE មិនមានរោគសញ្ញាអ្វីមួយឡើយ។ អ្នកដទៃទៀតអាចនឹងមានរោគសញ្ញាស្រាលត្រឹមតែគ្រុនក្តៅនិងឈឺក្បាលប៉ុណ្ណោះឬក៏ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការរលាកខួរក្បាល (ការបង្កោតនៅខួរក្បាល)។
- អ្នកដែលមានជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុនអាចរស់រានរយៈពេលបានពីបី រយៈពេល 1 ខែ រហូតដល់ 4 ខែ រហូតដល់ពាក់កណ្តាលនៃអ្នកទាំងឡាយដែលមិនស្លាប់មានពិការភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍។
- គេជឿថាការបង្កោតចំពោះស្ត្រីមានគិតអាចបង្កទុកទោសដល់ទារកមិនទាន់កើតរបស់គេបាន។

ថ្នាំបង្ការជំងឺ JE អាចជួយការពារអ្នកដំណើរពីជំងឺ JE បាន។



ថ្នាំបង្ការនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនបន្តបន្ទាប់គ្នាចំនួនពីរដងដោយកំរិតប្រើប្រាស់នីមួយៗឃ្លាតពីគ្នាចំនួន 28 ថ្ងៃ។ កំរិតថ្នាំបង្ការទីពីរត្រូវតែផ្តល់ជូនយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍មុនពេលធ្វើដំណើរ។ កុមារអាយុ ក្មេងជាង 3 ឆ្នាំទទួលកំរិតថ្នាំបង្ការតូចជាងអ្នកជំងឺដែលមានអាយុ 3 ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះ។ កំរិតថ្នាំបង្ការសំរាប់រំលឹកអាចនឹងត្រូវបានគេណែនាំឲ្យជាអនុសាសន៍សំរាប់គ្រប់គ្នាអាយុ 17 ឆ្នាំឬលើសពីនេះដែលត្រូវបានផ្តល់ថ្នាំបង្ការលើសពីមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយនៅតែស្ថិតនៅប្រឈមនឹងហានិភ័យទទួលរងប៉ះពាល់ត្រូវនឹងវីរុស។ នៅមិនទាន់មានព័ត៌មាននៅឡើយអំពីភាពចាំបាច់នៃកំរិតថ្នាំបង្ការសំរាប់រំលឹកសំរាប់កុមារ។

កំណត់សំគាល់៖ វិធីប្រសើរបំផុតក្នុងការបង្ការជំងឺ JE គឺជៀសវាងសត្វមូសខាំ។ វេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកអាចជូនព័ត៌មានដល់អ្នកបាន។

3 មនុស្សខ្លះមិនគួរទទួលថ្នាំបង្ការនេះទេ

- គ្រប់គ្នាដែលមានប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ (គំរាមកំហែងជីវិត) ទៅនឹងកំរិតជាតិថ្នាំបង្ការ JE ចំនួនមួយកំរិតមិនគួរទទួលកំរិតថ្នាំបង្ការមួយលើកទៀតឡើយ។
- គ្រប់គ្នាដែលមានប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ (គំរាមកំហែងជីវិត) ទៅនឹងសមាសធាតុផ្សំណាមួយ នៃថ្នាំបង្ការ JE មិនគួរទទួលថ្នាំបង្ការឡើយ។

សូមប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកប្រសិនបើអ្នកមានប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរដែលអ្នកបានដឹង។

- ស្ត្រីមានគិតតាមធម្មតាមិនគួរទទួលថ្នាំបង្ការ JE ឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកមានគិត, សូមបញ្ជាក់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកនឹងធ្វើដំណើររយៈពេលតិចជាង 30 ថ្ងៃ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកនឹងស្នាក់នៅតំបន់ក្នុងទីប្រជុំជន សូមប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតអ្នក។ អ្នកអាចនឹងមិនត្រូវការថ្នាំបង្ការឡើយ។

2 ថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុន

ថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុនត្រូវបានអនុម័តិយល់ព្រមឲ្យប្រើប្រាស់សំរាប់មនុស្សអាយុ 2 ខែនិងច្រើនជាងនេះ។ វាត្រូវបានគេណែនាំជាអនុសាសន៍សំរាប់អ្នកដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីដែល៖

- មានគំរោងចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយខែនៅក្នុងតំបន់ដែលមានជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុន
 - មានគំរោងធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេលតិចជាងមួយខែប៉ុន្តែនឹងទៅទស្សនកិច្ចតំបន់ដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងចំណាយពេលច្រើននៅខាងក្រៅផ្ទះ
 - ធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ JE ឬ
 - មានភាពមិនច្បាស់លាស់ពីគំរោងការធ្វើដំណើរបស់ខ្លួនពួកគេ។
- បុគ្គលិកបំរើការនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដែលស្ថិតនៅប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការរងប៉ះពាល់នឹងវីរុស JE គួរតែត្រូវបានចាក់ថ្នាំបង្ការផងដែរ។



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

4 ហានិភ័យនៃប្រតិកម្មនឹងថ្នាំបង្ការ

ជាមួយនឹងថ្នាំបង្ការ ដូចទៅនឹងឱសថគ្រប់មុខទូទៅដែរ មានឱកាសដែលមានឥទ្ធិពលមិនល្អបន្ទាប់បន្សំ។ នៅពេលឥទ្ធិពលមិនល្អបន្ទាប់បន្សំលេចឡើង ពួកវាតាមធម្មតាមានកំរិតស្រាលហើយបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនវា។ បញ្ហាកំរិតស្រាល

- ការឈឺចាប់, ការឈឺចាប់, ឡើងក្រហម ឬ ហើមនៅត្រង់ចំណុចដែលថ្នាំបង្ការត្រូវបានចាក់ (ប្រហែលមនុស្ស 1 នាក់ក្នុងចំណោម 4 នាក់)
- គ្រុនក្តៅ (ជួបប្រទះខ្លាំងលើកុមារ) ឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំ (ជួបប្រទះខ្លាំងនៅលើមនុស្សពេញវ័យ)

បញ្ហាកំរិតមធ្យមឬកំរិតធ្ងន់ធ្ងរ

- ការសិក្សាបានបង្ហាញថាប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងថ្នាំបង្ការ JE គឺកំរិតមានណាស់។

បញ្ហាដែលអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីទទួលថ្នាំបង្ការគ្រប់មុខ

- ការងងឹតមុខមួយភ្លែតអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីទំរង់ការវេជ្ជសាស្ត្រគ្រប់មុខ រួមមានការផ្តល់ថ្នាំ បង្ការ។ ការអង្គុយឬដេកទំរង់រយៈពេលប្រហែល 15 នាទីអាចជួយបង្ការការងងឹតមុខនិងរមួស បណ្តាលមកពីការដូល។ ប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍រមួស, ឬមានការផ្លាស់ប្តូរចិត្តហើយឬមានលីសូរសំលេងនៅក្នុងត្រចៀក។
- ការឈឺចាប់នៅស្មាដែលនៅជាប់មិនបាត់និងរយៈពេលវែងនៃលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើចលនាមានការថយចុះនៅលើដៃដែលថ្នាំបង្ការត្រូវបានចាក់អាចនឹងលេចឡើងបាន ដោយកំរិតបំផុតបន្ទាប់ពីការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ។
- ប្រតិកម្មអាស្រ័យកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរពីថ្នាំបង្ការគឺកំរិតមានណាស់ ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានមកជាតិចជាង 1 ក្នុងចំណោមថ្នាំបង្ការចំនួន 1 លាន។ ប្រសិនបើប្រតិកម្មមួយនឹងកើតមានឡើង, តាមធម្មតាវានឹងកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលតែប៉ុន្មាននាទីរហូតដល់ប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ។

សុវត្ថិភាពរបស់ថ្នាំបង្ការគឺកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យតាមដានជាប់ជានិច្ច។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូម ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ

www.cdc.gov/vaccinesafety/

5 ចុះបើមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរវិញ?

តើខ្ញុំគួរស្វែងរកអ្វី?

- ស្វែងរកនូវអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានការបារម្ភ ដូចជាសញ្ញានៃប្រតិកម្មអាស្រ័យកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ គ្រុនក្តៅ ខ្ពស់យ៉ាងខ្លាំង ឬបំលាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយា។ សញ្ញានៃប្រតិកម្មអាស្រ័យកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរអាចរួមមានការឡើងហើមកន្ទួលស្បែក ហើមមុខនិងបំពង់ក ពិបាកដកដង្ហើម ចង្វាក់បេះដូងញាប់ វិលមុខ និងខ្សោយកំលាំង។ ចំនុចទាំងអស់នេះគួរតែចាប់ផ្តើមមានឡើងតែប៉ុន្មាននាទីរហូតដល់ប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការ ផ្តល់ថ្នាំបង្ការរួច។

តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីខ្លះ?

- ប្រសិនបើអ្នកគិតថាជាប្រតិកម្មអាស្រ័យកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរបណ្តាញបន្ទាន់ ដទៃទៀតដែលអ្នកមិន អាចពន្យារពេលរង់ចាំបាន, សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ 9-1-1 ឬយកមនុស្សនោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅជិតបំផុត។ មិនដូច្នោះទេ សូមទូរស័ព្ទរកវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។
- បន្ទាប់មក ប្រតិកម្មនោះគួរតែរាយការណ៍ជូនទៅ "ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ពីហេតុគេទមិនល្អរបស់ ថ្នាំបង្ការ" (VAERS)។ វេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកអាចនឹងរក្សាទុកជាងកសាងនូវរបាយការណ៍នេះ ឬអ្នកអាច ធ្វើវាដោយខ្លួនឯងតាមរយៈគេហទំព័រ VAERS: www.vaers.hhs.gov ឬដោយទូរស័ព្ទទៅកាន់ លេខ 1-800-822-7967។

VAERS គឺសំរាប់តែរាយការណ៍ពីប្រតិកម្មប៉ុណ្ណោះ។

គេមិនផ្តល់នូវដំបូន្មានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រឡើយ។

6 តើខ្ញុំស្វែងយល់បន្ថែមយ៉ាងដូចម្តេច?

- សាកសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។
- ទូរស័ព្ទទៅកាន់នាយកដ្ឋានសុខាភិបាលក្នុងតំបន់ឬប្រចាំរដ្ឋរបស់អ្នក។ 1-888-767-4687
- ទាក់ទងទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ (CDC):
 - ទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)
 - ចូលទៅកាន់គេហទំព័រសុខភាពអ្នកធ្វើដំណើររបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ នៅគេហទំព័រ www.cdc.gov/travel
 - ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ CDC នៅ www.cdc.gov/japaneseencephalitis/

Vaccine Information Statement
Japanese Encephalitis Vaccine
Cambodian

01/24/2014



Translation provided by the California Department of
Public Health

DCH-1262CA

AUTH: P.H.S., Act 42, Sect. 2126.

ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខភាពស្នើសុំនូវព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគពេលកូណាត្រឹមត្រូវ, ការពិនិត្យមើលនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ហើយនិងការតម្រូវដាក់ពេលវេលា សំរាប់ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៅអនាគត, ព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនឹងធ្វើទៅមន្ទីរ Michigan Care Improvement Registry ។ ចក្ខុលទាំងឡាយមានសិទ្ធិស្នើសុំអោយអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខ ភាពមិនអោយបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំ បង្ការរោគនេះទៅឲ្យកន្លែងទុកសំណុំរឿងបាន។