

សន្យាព័ត៌មានសម្រាប់វ៉ាក់សាំង

# ថ្នាំវ៉ាក់សាំង MMRV (កញ្ចៀល ក្រឡុំទ្រូន ស្លឹក និងវ៉ារីសេឡា)៖ តើលោកអ្នកត្រូវដឹងអ្វីខ្លះ

Many Vaccine Information Statements are available in Khmer and other languages. See [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃព័ត៌មានអំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាច្រើនគឺអាចរកបានជាភាសាខ្មែរ និងភាសាផ្សេងទៀត។ ចូលមើល [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)

## 1. ហេតុអ្វីត្រូវចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង?

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង MMRV អាចបង្ការ កញ្ចៀល ក្រឡុំទ្រូន ស្លឹក និងវ៉ារីសេឡា។

- **វីរុសកញ្ចៀល (MEASLES (M))** បង្ករោគសញ្ញាដែលអាចមានដូចជាគ្រុនក្តៅ ក្អក ហៀរសំបោរ និងឡើងក្រហម ហូរទឹកភ្នែក ជាទូទៅមានអាការៈកន្ទួលដែលគ្របដណ្តប់ពេញរាងកាយទាំងមូល។ ជំងឺនេះអាចនាំឱ្យប្រកាច់ (ជារឿយៗទាក់ទងនឹងគ្រុនក្តៅ) ការឆ្លងមេរោគត្រចៀក រាគរូស និងរលាកសួត។ កញ្ចៀលកម្រប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាល ឬស្លាប់ណាស់។
- **វីរុសក្រឡុំទ្រូន (MUMPS (M))** បណ្តាលឱ្យគ្រុនក្តៅ ឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំ អស់កំលាំង បាត់បង់ចំណង់អាហារ ហើម និងចេញក្រពេញទឹកមាត់នៅក្រោមត្រចៀកម្ខាង ឬទាំងពីរ។ វាអាចបណ្តាលឱ្យផ្ទៃ ហើមខួរក្បាល និង/ឬគ្របដណ្តប់ខួរឆ្អឹងខ្នង ការហើមឈឺចាប់ពងស្នាស់ ឬអ្វីហើយកម្រដល់ថ្នាក់ស្លាប់ណាស់។
- **វីរុសស្លឹក (RUBELLA (R))** បណ្តាលឱ្យគ្រុនក្តៅ ឈឺបំពង់ក កន្ទួល ឈឺក្បាល និងរលាកភ្នែក។ វាអាចបណ្តាលឱ្យរលាកស្បែកបានរហូតដល់ពាក់កណ្តាលនៃយុវវ័យ និងស្រ្តីពេញវ័យ។ ប្រសិនបើអ្នកណាដែលកើតស្លឹកនៅពេលមានផ្ទៃពោះនោះអាចរលាកកូន ឬទារកកើតមកមានការភាពពិការភ្នែកឆ្លងជំងឺ។
- **វ៉ារីសេឡា (VARICELLA (V))** ត្រូវបានគេហៅថា “អុតស្វាយ” បណ្តាលឱ្យមានអាការៈរមាស់រោលក្រហម គ្រុនក្តៅ បាត់បង់ចំណង់អាហារ អស់កម្លាំង និងឈឺក្បាល។ វាអាចនាំឱ្យមានការឆ្លងមេរោគលើស្បែក ឆ្លងមេរោគសួត រលាកសរសៃឈាម ហើមខួរក្បាល និង/ឬខួរឆ្អឹងខ្នង នឹងការឆ្លងមេរោគចូលឈាម ឆ្លង ឬស្លាប់។ អ្នកខ្លះមានជំងឺអុតស្វាយមានកើតកន្ទួល ឈឺចាប់ដែលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកគេហៅថា “ជំងឺវើម” (ឬវីរុសវើម)។

មនុស្សភាគច្រើនដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំង MMRV នឹងត្រូវបាន ការពារអស់មួយជីវិត។ ថ្នាំវ៉ាក់សាំង និងអត្រាខ្ពស់នៃការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបានធ្វើឱ្យជំងឺទាំងនេះមិនសូវកើតមានច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេ។

## 2. វ៉ាក់សាំង MMRV

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង MMRV អាចផ្តល់ជូនដល់កុមារចាប់ពីអាយុ 12 ខែ រហូតដល់ 12 ឆ្នាំ ជាធម្មតា៖

- ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសដំបូង នៅអាយុ 12 ទៅ 15 ខែ
- ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទីពីរ នៅអាយុ 4 ឆ្នាំ ទៅ 6 ឆ្នាំ

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង MMRV អាចចាក់ឱ្យក្មេងពេលដំណាលគ្នានឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងដទៃទៀត។ ជំនួសឱ្យវ៉ាក់សាំង MMRV កុមារខ្លះអាចចាក់វ៉ាក់សាំងដាច់ដោយឡែក សម្រាប់ជំងឺ MMR (កញ្ចៀល ស្រឡុំទ្រូន និង ស្លឹក) និង ជំងឺអុតស្វាយ។ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នកអាចផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់លោកអ្នកបាន។

## 3. និយាយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក

ប្រាប់អ្នកផ្តល់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក ប្រសិនបើបុគ្គលនោះទទួលវ៉ាក់សាំង៖

- មាន ប្រតិកម្មអាល្លែហ្ស៊ីបន្ទាប់ពីការទទួលវ៉ាក់សាំង MMRV, MMR ឬវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតស្វាយ, ដូសមុន ឬ ឬអាល្លែហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ គឺរាមកំហែងដល់ជីវិត
- ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ឬ គិតថាពួកគេអាចនឹងមានផ្ទៃពោះ—ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះមិនគួរទទួលវ៉ាក់សាំង MMRV នោះទេ
- មាន ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយ ឬ ឪពុកម្តាយ បងប្អូនប្រុស ឬស្រី ដែលមានប្រវត្តិទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយពិការភ្នែក ឬតំណាង
- ធ្លាប់ជួបស្ថានភាពដែលធ្វើឱ្យងាយមានស្នាមជាំ ឬងាយហូរឈាម
- ធ្លាប់មានប្រវត្តិនៃការប្រកាច់ ឬមានឪពុកម្តាយ បង/ប្អូនប្រុស ឬបង/ប្អូនស្រីដែលមានប្រវត្តិប្រកាច់
- កំពុងតែប្រើ Salicylates (ដូចជាថ្នាំអាស៊ីរីន)។
- ថ្មីៗនេះមានការបញ្ចូលឈាម ឬទទួលបានផលិតផលឈាមដទៃទៀត
- មានជំងឺរបេង
- ទទួលវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល 4 សប្តាហ៍

ក្នុងករណីខ្លះ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអាចសម្រេចចិត្តពិនិត្យរំពេល ការចាក់វ៉ាក់សាំង MMRV រហូតដល់ការណាត់ជួបនាពេលខាងមុខ ឬអាចណែនាំឱ្យកុមារទទួលវ៉ាក់សាំង MMR និងអុតស្វាយ ដាច់ដោយឡែកជំនួសឱ្យវ៉ាក់សាំង MMRV។

អ្នកដែលមានជំងឺស្រាល ដូចជាជំងឺផ្លាស្វាយ អាចទទួលថ្នាំបង្ការនេះបាន។ អ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬធ្ងន់ធ្ងរ គួររង់ចាំ រហូតដល់ពួកគេជាសះស្បើយសិន មុនពេលទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំង MMRV។

អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នកអាចផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់លោកអ្នកបាន។

## 4. ហានិភ័យកើតប្រតិកម្មថ្នាំវ៉ាក់សាំង

- ឈឺដៃដោយសារការចាក់ថ្នាំ បញ្ហាក្រហមនៅកន្លែងចាក់ថ្នាំ គ្រុនក្តៅ និងកន្ទួលស្រាលអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង MMRV។



U.S. Department of Health and Human Services  
Centers for Disease Control and Prevention

- ការហើមក្រពេញនៅថ្ពាល់ ឬ ក ឬការឈឺចាប់បណ្តោះអាសន្ន និងរងសន្លាក់ ជួនកាលកើតឡើងបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង MMRV ។
- អាការៈប្រកាច់ដែលជារឿយៗដោយសារតែត្រូវការកាត់ កើតឡើងបន្ទាប់ពីវ៉ាក់សាំង MMRV ។ ហានិភ័យនៃការប្រកាច់ ខ្ពស់បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង MMRV ជាងបន្ទាប់ពីការចាក់ វ៉ាក់សាំង MMR និង អុតស្វាយ ដាច់ដោយឡែកចំពោះកុមារតូច ដែលទទួលបានដំបូងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងជាសេរីពីរដូស។ អ្នក ផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអាចណែនាំអ្នកអំពីវ៉ាក់សាំង ដែលសមរម្យសម្រាប់កូនរបស់អ្នក។
- ប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះកម្រកើតឡើង រួមទាំងចំនួនប្រាំបីកើតទាប បណ្តោះអាសន្ន ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការហូរឈាម ឬ ស្លាប់ជាខុសពីធម្មតា។
- ចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយធ្ងន់ធ្ងរ វ៉ាក់សាំងនេះអាចបណ្តាល ឱ្យឆ្លងមេរោគ ដែលអាច គំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត។ អ្នកដែលមានបញ្ហាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ធ្ងន់ធ្ងរ មិនគួរចាក់វ៉ាក់សាំង MMRV ទេ។

ប្រសិនបើមនុស្សណាម្នាក់កើតឡើងនូវបញ្ហាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយធ្ងន់ធ្ងរ ឬ វ៉ាក់សាំង MMRV វាអាចទាក់ទងនឹងជំងឺក្រព្រិល ឬ សមាសធាតុរ៉ាំរ៉ៃសេឡា នៃវ៉ាក់សាំង។ មេរោគវ៉ាក់សាំងរ៉ាំរ៉ៃសេឡាអាចឆ្លងទៅមនុស្សដែល គ្មានការការពារ។ អ្នកដែលកើតកូនលក្ខណៈនៅឆ្ងាយពីអ្នកដែលមាន ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយ និងទារកដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំង រហូតទាល់តែបាត់កូន។ និយាយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំ សុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀត។

មនុស្សមួយចំនួនដែលទទួលបានថ្នាំបង្ការជំងឺអុតស្វាយ អាចកើតជំងឺ មេរីម (herpes zoster) ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមក។ នេះគឺជាបញ្ហា កម្រកើតមានក្រោយពេលចាក់ថ្នាំបង្ការជាងក្រោយកើតជំងឺ អុតស្វាយ។

ពេលខ្លះ មនុស្សស្លាប់ បន្ទាប់ពីដំណើរការវេជ្ជសាស្ត្ររួមទាំងការ ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង។ សូមប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ លោកអ្នក ប្រសិនបើលោកអ្នករងមុខ ឬចក្ខុញ្ញាណផ្លាស់ប្តូរ ឬពូ សំឡេងហឹងក្នុងត្រចៀក។

ដូចថ្នាំផ្សេងទៀតដែរ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងក្រុមនឹងបង្កប្រតិកម្មអាលែហ្ស៊ី ធ្ងន់ធ្ងរ ឬស្លាប់ផ្សេង ឬធ្វើឱ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតណាស់។

## 5. ចុះបើមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ?

ប្រតិកម្មអាលែហ្ស៊ីអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកទទួលបានថ្នាំបង្ការ ចាក់ចេញពី គ្លីនិក។ ប្រសិនបើអ្នកឃើញសញ្ញាប្រតិកម្មអាលែហ្ស៊ី ឬធ្ងន់ធ្ងរ (កូនលក់ហាម ហើមមុខ និងបំពង់ក ពិបាកដកដង្ហើម បេះដូងលោតញាប់ រលួយ ឬខ្សោយ) សូមទូរស័ព្ទទៅ 9-1-1 ហើយនាំអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុត។

សម្រាប់សញ្ញាផ្សេងទៀតដែលធ្វើឱ្យអ្នកបារម្ភ សូមទូរស័ព្ទទៅអ្នក ផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។

ដើម្បីអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរសុខភាពស្តីពីការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ហើយនិងការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពសុខភាពបន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៅក្នុងគោលការណ៍ ព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនឹងធ្វើទៅមន្ទីរ Michigan Care Improvement Registry ។ បុគ្គលទាំងឡាយមានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខ ភាពមិនរាយបញ្ជីព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំ បង្ការរោគនៅក្នុងឯកសាររៀងរាល់ឆ្នាំ។

ប្រតិកម្មទៅប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងត្រូវតែ ត្រូវបានរាយការណ៍ទៅ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)។ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកជា ធម្មតានឹងដាក់របាយការណ៍នេះ ឬអ្នកអាចធ្វើវាដោយខ្លួនឯង បាន។ សូមចូលទៅគេហទំព័រប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃ ថ្នាំវ៉ាក់សាំង (VAERS) [www.vaers.hhs.gov](http://www.vaers.hhs.gov) ឬទូរស័ព្ទទៅកាន់ លេខ 1-800-822-7967។ ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំ (VAERS) សម្រាប់តែការ រាយការណ៍ ប៉ុណ្ណោះ។ បុគ្គលិករបស់ ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំ (VAERS) មិនផ្តល់ជំនួយ នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវទេ។

## 6. កម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំ វ៉ាក់សាំង

National Vaccine Injury Compensation Program (កម្មវិធី ជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង (VICP)) គឺជា កម្មវិធីរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធ ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង់សង អ្នកទាំងឡាយដែលអាចរងរបួសដោយសារតែថ្នាំវ៉ាក់សាំង មួយចំនួន។ ការទាមទារទាក់ទងនឹងរបួស ឬការស្លាប់ដោយសារ ការទទួលបានថ្នាំបង្ការ មានពេល វេលាណាតិសម្រាប់ការដាក់ ឯកសារ ដែលអាចមានរយៈពេលខ្លីត្រឹមពីរឆ្នាំ។ សូមចូលទៅ គេហទំព័រកម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង (VICP) [www.hrsa.gov/vaccinecompensation](http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation) ឬទូរស័ព្ទទៅ លេខ 1-800-338-2382 ដើម្បីសិក្សាអំពីកម្មវិធី និងការដាក់ពាក្យ ទាមទារ។

## 7. តើខ្ញុំអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតដោយរបៀបណា?

- សូមសួរអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នក។
- សូមទូរស័ព្ទទៅក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ ឬនៅមូលដ្ឋានរបស់ លោកអ្នក។
- សូមចូលទៅ Food and Drug Administration (គេហទំព័ររដ្ឋបាលអាហារនិងឱសថ (FDA)) ដើម្បី ទទួលបានកញ្ចប់សេវាកម្មថ្នាំបង្ការ និងព័ត៌មាន បន្ថែម [www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines](http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines)។
- Centers for Disease Control and Prevention (សូមទាក់ទង មជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ និងបង្ការជំងឺ (CDC))៖
  - សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
  - ចូលមើលគេហទំព័ររបស់ CDC នៅ [www.cdc.gov/vaccines](http://www.cdc.gov/vaccines)។