

សន្យាព័ត៌មានសម្រាប់វ៉ាក់សាំង

វ៉ាក់សាំងវ៉ារីសេឡា (ជំងឺអុតស្វាយ)៖
តើលោកអ្នកត្រូវដឹងអ្វីខ្លះ

Many Vaccine Information Statements are available in Khmer and other languages. See www.immunize.org/vis

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃព័ត៌មានអំពីវ៉ាក់សាំងជាច្រើនគឺអាចរកបានជាភាសាខ្មែរ និងភាសាផ្សេងទៀត។
ចូលមើល www.immunize.org/vis

1. ហេតុអ្វីត្រូវចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង?

វ៉ាក់សាំងវ៉ារីសេឡា (Varicella) អាចបង្ការ ជំងឺអុតស្វាយ។

ជំងឺ អុតស្វាយ បណ្តាលឱ្យមានកន្ទួលរមាស់រយៈពេលប្រហែលមួយសប្តាហ៍។ ជំងឺនេះអាចបណ្តាលឱ្យក្មេងខ្លួនអស់កម្លាំង បាត់បង់ចំណង់ អាហារ និងឈឺក្បាល។ ជំងឺអុតស្វាយអាចនាំឱ្យមានការឆ្លងមេរោគលើស្បែក ឆ្លងមេរោគសួត រលាកសរសៃឈាម ហើមខួរក្បាល និង/ឬខួរក្បាល និងការឆ្លងមេរោគចូលឈាម ឆ្លង ឬសន្លាក់។ អ្នកខ្លះមានជំងឺ អុតស្វាយមានកើតកន្ទួល ឈឺចាប់ដែលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកគេហៅថា “ជំងឺ វ៉ែម” (ស្គាល់ថាជា វីរុសប៉េស)។

ជំងឺ អុតស្វាយជាទូទៅមានកម្រិតស្រាលប៉ុន្តែវាអាចធ្ងន់ធ្ងរចំពោះទារកដែលមានអាយុក្រោម 12 ខែ ក្មេងជំងឺ មនុស្សពេញវ័យ អ្នកមានផ្ទៃពោះ និងអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពសុទ្ធចុះខ្សោយ។ មនុស្សមួយចំនួនឈឺដែលត្រូវសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។ វាមិនកើតឡើងញឹកញាប់ទេ ប៉ុន្តែមនុស្សអាចស្លាប់ដោយសារជំងឺអុតស្វាយបាន។

មនុស្សភាគច្រើនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងវ៉ារីសេឡា 2 ដូស នឹងត្រូវបានការពារអស់មួយជីវិត។

2. វ៉ាក់សាំងវ៉ារីសេឡា

- កុមារ ត្រូវការវ៉ាក់សាំងវ៉ារីសេឡា 2 ដូស ជាធម្មតា៖
- ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសដំបូង នៅអាយុ 12 ទៅ 15 ខែ
- ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី ២ នៅអាយុ 4 ឆ្នាំ ទៅ 6 ឆ្នាំ

កុមារដែលមានអាយុច្រើនជាងនេះ ក្មេងជំងឺ និង មនុស្សពេញវ័យ ក៏ត្រូវការវ៉ាក់សាំងវ៉ារីសេឡាចំនួន 2 ដងផងដែរ ប្រសិនបើ ពួកគេ មិនទាន់មានភាពស្មាននឹង ជំងឺ អុតស្វាយ។

វ៉ាក់សាំងវ៉ារីសេឡាអាចចាក់ឱ្យក្មេងពេលដំណាលគ្នា នឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងដទៃទៀត។ ដូចគ្នានេះផងដែរ ក្មេងអាយុចន្លោះពី 12 ខែដល់ 12 ឆ្នាំអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងវ៉ារីសេឡា រួមជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំង MMR (កញ្ចប់ ១ ស្រឡៅទៀត និងស្លូត) ក្នុងការចាក់តែម្តង ឬហៅថា

MMRV។ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នកអាចផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់លោកអ្នកបាន។

3. និយាយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព របស់អ្នកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀត។

ប្រាប់អ្នកផ្តល់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក ប្រសិនបើ បុគ្គលនោះ ទទួលវ៉ាក់សាំង៖

- មាន ប្រតិកម្មអាល្លែហ្ស៊ី បន្ទាប់ពី ការ ទទួល វ៉ាក់សាំងវ៉ារីសេឡាមុនៗ ឬមាន អាល្លែហ្ស៊ី ធ្ងន់ធ្ងរ គំរាមកំហែងដល់ជីវិត
- ស្ត្រី មានផ្ទៃពោះ ឬ គិតថាពួកគេអាចនឹងមាន ផ្ទៃពោះ —ស្ត្រី មានផ្ទៃពោះមិនគួរទទួលវ៉ាក់សាំងវ៉ារីសេឡានោះទេ
- មាន ប្រព័ន្ធភាពសុទ្ធចុះខ្សោយ ឬមាន ឪពុកម្តាយ បងប្អូនប្រុស ឬស្រី ដែលមានប្រវត្តិ ទាក់ទងនឹង បញ្ហាប្រព័ន្ធភាពសុទ្ធចុះខ្សោយ កំណើត ឬ តំណពូជ
- កំពុងតែប្រើ Salicylates (ដូចជាថ្នាំអាស៊ីរីន)
- ថ្មីៗនេះមានការបញ្ចូលឈាម ឬទទួលបាន ផលិតផលឈាមដទៃទៀត
- មានជំងឺ របេង
- ទទួលវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល 4 សប្តាហ៍

ក្នុងករណី ខ្លះ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអាចសម្រេច ចិត្តពន្យារពេលការចាក់វ៉ាក់សាំងវ៉ារីសេឡា រហូតដល់ការណាត់ ជួបបន្តពេលខាងមុខ។

អ្នកដែលមានជំងឺស្រាល ដូចជាជំងឺផ្តាសាយ អាចទទួលថ្នាំបង្ការនេះបាន។ អ្នកដែលមានជំងឺ ធ្ងន់ធ្ងរ ឬធ្ងន់ធ្ងរ គួររង់ចាំ រហូតដល់ពួកគេជាសះស្បើយស្បែក មុនពេលទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងវ៉ារីសេឡា។

អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នកអាចផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់លោកអ្នកបាន។



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

4. ហានិភ័យកើតប្រតិកម្មថ្នាំវ៉ាក់សាំង

- អាការៈឈឺដៃដោយសារការចាក់ ឡើងក្រហម ឬកន្ទួលនៅកន្លែង ចាក់ថ្នាំ ឬគ្រុនក្តៅអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង រ៉ាវីសេឡា។
- ប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះកើតឡើង ឯកម្រណាស់។ ទាំងនេះអាចរួមមានជំងឺ រលាកសួត ការឆ្លងមេរោគនៃខួរក្បាល និង/ឬការគ្របខ្លួនឆ្អឹង ឬការប្រកាច់ដែលច្រើនតែបណ្តាល មកពី គ្រុនក្តៅ។
- ចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ វ៉ាក់សាំងនេះអាចបណ្តាល ឱ្យឆ្លងដែលអាចគំរាមកំហែងដល់ អាយុជីវិត។ អ្នកដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ មិនគួរទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺ រ៉ាវីសេឡាទេ។

អ្នកដែលទទួលថ្នាំបង្ការអាចកើតកន្ទួលរមាស់។ ប្រសិនបើ ករណី នេះកើតឡើង មេរោគវ៉ាក់សាំងរ៉ាវីសេឡា អាចឆ្លងទៅមនុស្សដែលគ្មានការការពារ។ អ្នកដែលកើតកន្ទួលគួរតែឆ្ងាយពី អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពសុខភាពខ្សោយ និងទារកដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងរហូតទាល់តែបាត់កន្ទួល។ និយាយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀត។

មនុស្សមួយចំនួនដែលទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺ អុតស្វាយ អាចកើតជំងឺ វេរីម (herpes zoster) ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមក។ នេះគឺជាបញ្ហាម្រុកកើតមានក្រោយពេលចាក់ថ្នាំបង្ការជាងក្រោយកើតជំងឺ អុតស្វាយ។

ពេលខ្លះ មនុស្សស្លាប់ បន្ទាប់ពី ដំណើរការវេជ្ជសាស្ត្ររួមទាំងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង។ សូមប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នក ប្រសិនបើលោកអ្នករំលឹក ឬចក្ខុញ្ញាណផ្លាស់ប្តូរ ឬឮសំឡេងហឹង ឯក្នុងត្រចៀក។

ដូចថ្នាំផ្សេងទៀតដែរ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកម្រនឹងបង្កប្រតិកម្មអាលែហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ ឬសធ្ងន់ធ្ងរផ្សេង ឬធ្វើឱ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតណាស់។

5. ចុះបើមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ?

ប្រតិកម្មអាលែហ្ស៊ី អាចកើតឡើងបន្ទាប់ពី អ្នកទទួលថ្នាំបង្ការចាក់ចេញពី គ្នី និង ក។ ប្រសិនបើ អ្នកឃើញសញ្ញានៃប្រតិកម្មអាលែហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ (កន្ទួលក្រហម ហើមមុខ និងបំពង់ក ពិបាកដកដង្ហើម បេះដូងលោតញាប់ វិលមុខ ឬខ្សោយ) សូមទូរស័ព្ទទៅ 9-1-1 ហើយនាំអ្នក ជំងឺ ទៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុត។

សម្រាប់សញ្ញាផ្សេងទៀតដែលធ្វើឱ្យអ្នកបារម្ភ សូមទូរស័ព្ទទៅ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។

Khmer translation provided by Immunize.org

ប្រតិកម្មទៅប្រព័ន្ធភាពសុខភាពផលអាក្រក់នៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងគួរតែត្រូវបានរាយការណ៍ទៅ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)។ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកជាធម្មតា នឹងដាក់របាយការណ៍នេះ ឬអ្នកអាចធ្វើវាដោយខ្លួនឯងបាន។ សូមចូលទៅគេហទំព័រ ប្រព័ន្ធភាពសុខភាពផលអាក្រក់នៃថ្នាំវ៉ាក់សាំង (VAERS) www.vaers.hhs.gov ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-822-7967។ ប្រព័ន្ធភាពសុខភាពផលអាក្រក់នៃថ្នាំ (VAERS) សម្រាប់តែការរាយការណ៍ប៉ុណ្ណោះ។ បុគ្គលិករបស់ប្រព័ន្ធភាពសុខភាពផលអាក្រក់នៃថ្នាំ (VAERS) មិនផ្តល់ជំនួយនាំអំពី វេជ្ជសាស្ត្រទេ។

6. កម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង

National Vaccine Injury Compensation Program (កម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង (VICP)) គឺជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធ ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង់សងអ្នកទាំងឡាយដែលអាចរងរបួសដោយសារតែថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយចំនួន។ ការទាមទារទាក់ទងនឹងរបួស ឬការស្លាប់ដោយសារការ ទទួលថ្នាំ បង្ការ មានពេលវេលាកំណត់សម្រាប់ការដាក់ឯកសារ ដែលអាចមានរយៈពេលខ្លី ត្រឹមពីរ ឆ្នាំ។ សូមចូលទៅគេហទំព័រកម្មវិធីជាតិ បង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង (VICP) www.hrsa.gov/vaccinecompensation ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-338-2382 ដើម្បីសិក្សាអំពី កម្មវិធី នេះ ឯការដាក់ពាក្យទាមទារ។

7. តើខ្ញុំអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតដោយរបៀបណា?

- សូមសួរអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នក។
- សូមទូរស័ព្ទទៅក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ ឬនៅមូលដ្ឋានរបស់លោកអ្នក។
- សូមចូលទៅ Food and Drug Administration (គេហទំព័រ រដ្ឋបាលអាហារនិង ឱសថ (FDA)) ដើម្បីទទួលបានកញ្ចប់សេវាកម្មថ្នាំបង្ការ និងព័ត៌មាន បន្ថែម www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines។
- Centers for Disease Control and Prevention (សមាគមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ និង បង្ការជំងឺ (CDC))៖
 - សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
 - ចូលមើលគេហទំព័រ របស់ CDC នៅ www.cdc.gov/vaccines។



KHMER

ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខភាពស្នើសុំនូវព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគពេញលក្ខណ៍ត្រឹមត្រូវ, ការពិនិត្យមើលនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ហើយនិងការតម្រូវដាក់ពេលវេលា សំរាប់ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៅអនាគត, ព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនឹងផ្ញើទៅមន្ទីរ Michigan Care Improvement Registry ។ បុគ្គលទាំងឡាយមានសិទ្ធិស្នើសុំអោយអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលសុខ ភាពមិនអោយបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីការចាក់ថ្នាំ បង្ការរោគនេះទៅឱ្យកន្លែងទុកសំណុំរឿងបាន។

DCH-0451CA

AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.