

# Прививка против гепатита А

## Что Вам необходимо знать

Many Vaccine Information Statements are available in Russian and other languages. See [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)  
 Многие информационные бюллетени о вакцинах доступны на русском и других языках. Посетите веб-сайт [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)

### 1 Зачем нужна прививка?

Гепатит А — это серьезное заболевание печени. Причиной заболевания является вирус гепатита А (ВГА). ВГА распространяется от человека к человеку при контакте со стулом инфицированного человека, что может легко произойти, если он плохо помоеет руки. Вы также можете заразиться гепатитом А через пищу, воду или предметы, на которых может находиться вирус.

К симптомам гепатита А могут относиться:

- повышение температуры, утомляемость, потеря аппетита, тошнота, рвота и/или боль в суставах
- сильная боль в животе и диарея (главным образом у детей)
- желтуха (пожелтение глаз или кожи, темная моча, беловато-глинистый кал).

Эти симптомы обычно появляются через 2-6 недель после заражения и продолжаются до 2 месяцев, хотя у некоторых людей они могут наблюдаться до 6 месяцев. Если у человека гепатит А, он может слишком плохо чувствовать себя, чтобы работать.

У детей симптомы часто отсутствуют, но они возникают у большинства взрослых больных. Даже если у Вас нет симптомов, Вы можете распространять ВГА.

Гепатит А может вызвать печеночную недостаточность и смерть, хотя такое бывает редко, чаще у людей в возрасте 50 лет и старше, а также при наличии других заболеваний печени, например, гепатита В или С.

**Прививка против гепатита А может предотвратить его возникновение.** Введение вакцины против гепатита А в Соединенных Штатах рекомендуется, начиная с 1996 г. С тех пор количество случаев заболевания, которые ежегодно регистрируются в США, снизилось с около 31,000 до менее 1,500 случаев.

### 2 Прививка против гепатита А

Прививка против гепатита А проводится с помощью инактивированной (убитой) вакцины. Для долгосрочной защиты необходимо ввести **2 дозы**. Эти дозы нужно вводить с интервалом не менее 6 месяцев.

Детей обычно прививают в период от одного до двух лет (12–23 месяца). Детям старшего возраста и подросткам можно вводить вакцину после 23 месяцев. Взрослые, которые не были вакцинированы ранее и желают защитить себя от гепатита А, также могут получить эту прививку.

Вам следует ввести вакцину против гепатита А в таких случаях:

- Вы собираетесь поехать в страны, где распространен гепатит А;
- Вы – мужчина, у которого есть сексуальные связи с другими мужчинами;
- Вы употребляете наркотики;
- у Вас диагностировано хроническое заболевание печени, например, гепатит В или гепатит С;
- Вы получаете лечение концентратом факторов свертывания крови;
- Вы работаете с животными, инфицированными гепатитом А, или в лаборатории которая исследует гепатит А;
- Вы собираетесь усыновить ребенка/или близко контактировать с ребенком из страны, в которой распространен гепатит А.

Если Вы желаете получить дополнительную информацию о какой-либо из этих групп, обратитесь к своему врачу.

При введении вакцины против гепатита А одновременно с другими вакцинами известных рисков не существует.

### 3 Некоторым людям эта прививка противопоказана

Сообщите лицу, которое вводит Вам вакцину, следующие сведения:

- **Если у Вас имеется какая-либо серьезная, представляющая угрозу для жизни аллергия.** Если у Вас наблюдалась представляющая угрозу для жизни аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины против гепатита А, или у Вас серьезная аллергическая реакция на какой-либо компонент этой вакцины, Вам могут посоветовать не получать эту вакцину. Информацию о компонентах вакцины Вы можете получить у своего врача.
- **Если Вы плохо себя чувствуете.** Если Вы заболели не очень тяжело, например у Вас обычная простуда, вероятно, Вам можно сделать прививку сегодня. Если у Вас есть заболевание средней или тяжелой степени, скорее всего, следует подождать до выздоровления. Ваш доктор даст Вам совет по этому поводу.

## 4 Риски реакций на прививку

При применении любого лекарственного препарата, включая введение вакцин, существует риск развития побочных эффектов. Обычно они слабые и проходят самостоятельно, но возможно и развитие тяжелых реакций.

У большинства людей вакцина против гепатита А не вызывает никаких осложнений.

**Легкие реакции** после введения вакцины против гепатита А включают:

- раздражение или покраснение в месте введения вакцины
- незначительное повышение температуры
- головная боль
- утомляемость

Если эти реакции возникают, они, как правило, начинаются после введения вакцины и сохраняются в течение 1 или 2 дней.

Ваш врач может больше рассказать Вам об этих реакциях.

**Другие реакции, которые могут возникнуть после введения этой вакцины:**

- После любой медицинской процедуры, включая прививку, может произойти непродолжительный обморок. Для предотвращения обморока или травм, связанных с падением, рекомендуется посидеть или полежать в течение 15 минут. Сообщите врачу, если Вы ощущаете головокружение, изменение зрения или звон в ушах.
- У некоторых людей возникает боль в плечах, которая может быть более сильной и длительной, чем обычная болезненность после инфекции. Это происходит очень редко.
- Любое лекарственное средство может вызвать тяжелые аллергические реакции. Такие реакции на вакцину наблюдаются крайне редко: по имеющимся оценкам, приблизительно в 1 случае на миллион доз вакцины; они случаются через несколько минут или через несколько часов после прививки.

Как и с любым другим лекарством, существует небольшой риск значительной травмы или смерти.

Безопасность вакцин всегда контролируется. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: [www.cdc.gov/vaccinesafety/](http://www.cdc.gov/vaccinesafety/).

## 5 Что делать при возникновении серьезной проблемы?

**На что следует обращать внимание?**

- Следует обратить внимание на любое состояние, которое Вас беспокоит, например, на признаки тяжелой аллергической реакции, очень высокую температуру или изменение поведения.

Проявления **тяжелой аллергической реакции** могут включать в себя сыпь, отек лица и гортани, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, головокружение и слабость. Эти явления могут

начаться через несколько минут или часов после введения вакцины.

**Что необходимо предпринять?**

- Если Вы подозреваете, что у Вас развилась **тяжелая аллергическая реакция** или иное тяжелое состояние, требующее неотложной помощи, позвоните по телефону 911 или обратитесь в ближайшую больницу. Вы также можете позвонить в свою клинику.

Впоследствии необходимо отправить отчет о реакции в Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) (Систему регистрации нежелательных явлений вакцин). Врач обязан составить и отправить отчет. Вы также можете подать отчет самостоятельно через веб-сайт VAERS [www.vaers.hhs.gov](http://www.vaers.hhs.gov) или по телефону 1-800-822-7967.

*Система VAERS не предоставляет медицинских консультаций.*

## 6

### Национальная программа компенсаций за ущерб здоровью, нанесенный в результате прививки

Национальная программа компенсаций за ущерб здоровью, National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) (нанесенный в результате вакцинации) — это федеральная программа, созданная для выплаты компенсаций лицам, здоровью которых был нанесен ущерб в результате прививки.

Лица, считающие, что вакцина, возможно, нанесла ущерб их здоровью, могут ознакомиться с программой и с порядком предъявления претензии, позвонив по телефону 1-800-338-2382 или посетив веб-сайт VICP [www.hrsa.gov/vaccinecompensation](http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation). Время подачи заявления на компенсацию ограничено.

## 7

### Как получить дополнительную информацию о прививках?

- Обратитесь к своему врачу. Он может дать Вам вкладыш из упаковки вакцины или предложить другие источники информации.
- Позвоните в местный отдел здравоохранения или в отдел здравоохранения штата.
- Обратитесь в Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Центры по контролю и профилактике заболеваний):
  - по телефону 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) или
  - через веб-сайт [www.cdc.gov/vaccines](http://www.cdc.gov/vaccines).

DCH-0452P AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.

## Vaccine Information Statement Hepatitis A Vaccine

7/20/2016

Russian

Office Use  
Only



42 U.S.C. § 300aa-26

Russian

Для того чтобы поставщики медицинских услуг могли получить точную информацию об уже сделанных прививках, оценку необходимости в прививках и рекомендуемый календарь будущих прививок, информация будет передана в реестр Michigan Care Improvement Registry. Любой человек имеет право потребовать, чтобы его поставщик медицинских услуг не передавал данные об иммунизации в реестр.