

וואקסין אינפארמאציע סטייטמענט

Many Vaccine Information Statements are available in Yiddish and other languages. See www.immunize.org/vis

פיל וואקסין אינפארמאציע סטייטמענט זענען אוועלעבל אין אידיש און אנדערע שפראכן. www.immunize.org/vis UOT

מענינדזשאָקאָקעל B וואקסין: וואס איר דארפט וויסן

1. פארוואס צו וואקסינירט ווערן?

דער מענינדזשאָקאָקעל B וואקסין קען העלפן באשיצן פון די מענינדזשאָקאָקעל קראנקייט וואס ווערט פאראורזאכט דורך די סעראלאגישע גרופע B. אן אנדערער מענינדזשאָקאָקעל וואקסין איז דא צו באקומען וואס קען העלפן באשיצן קעגן די סעראלאגישע גרופעס A, C, W און Y.

די מענינדזשאָקאָקעל קראנקייט קען פאראורזאכן מענינדזשייטיס (אן אינפעקציע פון די הייטל ארום די מוח און חוט השדרה) און אינפעקציעס אין די בלוט. אפילו ווען עס ווערט באהאנדלט הרג'ט די מענינדזשאָקאָקעל קראנקייט 10 ביז 15 אנגעשטעקטע מענטשן פון יעדע 100. און פון די וועלכע לעבן יא איבער לייזן בערך 10 ביז 20 פון יעדע 100 פון דיסאביליטיס ווי שוועריקייטן צו הערן, שאדן צו די מוח אדער צו די נירן, פארלירן הענט אדער פיס, פראבלעמען מיט די נערוון סיסטעם אדער גרויסע אויסשלאגן (סקאָרס) צוליב הויט פלאנצונגען (סקין גרעפטס).

די מענינדזשאָקאָקעל קראנקייט איז זעלטן און פעלער זענען געפאלן אין די פאראייניקטע שטאטן זינט די 1990'ער. עס איז אבער נאכאלץ אן ערנסטע קראנקייט מיט גרויסע אויסזיכטן פון טויט רח"ל אדער פון בלייבנדע דיסאביליטיס ביי מענטשן וואס באקומען עס.

אלע קענען באקומען די מענינדזשאָקאָקעל קראנקייט. געוויסעס מענטשן האבן גרעסערע אויסזיכטן דערפון, אריינרעכענענדיג:

- בייביס אונטער איין יאר אלט
- עלטערע קינדער און יונגע דערוואקסענע פון 16 ביז 23 יאר אלט
- מענטשן מיט געוויסע מעדיצינישע פראבלעמען וועלכע שוואכן אפ די אימיון סיסטעם
- וויסנשאפטלער וועלכע ארבעטן אין די לאבארעטאריע מיט *N. meningitidis*, די באקטעריע וואס פאראורזאכט מענינדזשאָקאָקעל קראנקייט
- מענטשן וואס זענען אויסגעשטעלט צוליב אן אויסברוך אין זייער קאמיניטי

2. מענינדזשאָקאָקעל B וואקסין

צו באקומען די בעסטע שוץ פעהלט אויס מער פון 1 דאזע פון א מענינדזשאָקאָקעל B וואקסין. עס זענען דא צו באקומען צוויי מענינדזשאָקאָקעל B וואקסינען. דער זעלבער וואקסין מוז גענוצט ווערן פאר אלע דאזעס.

מענינדזשאָקאָקעל B וואקסינען זענען רעקאמענדירט פאר מענטשן פון 10 יאר אדער עלטער וועלכע זענען אין א העכערע סכנה פון א סעראלאגישע גרופע B מענינדזשאָקאָקעל קראנקייט, אריינרעכענענדיג:

- מענטשן וואס זענען אין א גרעסערע סכנה צוליב אן אויסברוך פון א מענינדזשאָקאָקעל קראנקייט פון די סעראלאגישע גרופע B
- מענטשן וועמען'ס ספלין (מילץ) איז געשעדיגט אדער ארויסגעשניטן, אריינרעכענענדיג מענטשן מיט סיקל סעל דיזיז
- מענטשן מיט א זעלטענע אימיון סיסטעם קראנקייט וואס רופט זיך "קאמפלעמענט קאמפאָונענט דיפישענסי" (complement component deficiency)
- מענטשן וואס נעמען א סארט דראג וואס הייסט א "קאמפלעמענט אינהיביטער" (complement inhibitor) ווי *eculizumab* (אויך גערופן *Soliris*) אדער *ravulizumab* (אויך גערופן *Ultomiris*)
- וויסנשאפטלער וועלכע ארבעטן אויף א רוטינעם פארנעם אין די לאבארעטאריע מיט *N. meningitidis*

די וואקסינען קענען אויך געגעבן ווערן פאר סיי וועם פון 16 ביז 23 יאר צו גיבן קורץ-טערמיניגע שוץ פון רוב סארטן פון די סעראלאגישע גרופע B מענינדזשאָקאָקעל קראנקייט, לויט די באשלוס וואס ווערט געמאכט צווישן דעם פאציענט און דאקטאר. די בעסטע צייט צו באקומען דעם וואקסין איז צווישן 16 און 18 יאר אלט.

3. רעדט מיט אייער דאקטאר

זאגט דעם צושטעלער פון וואקסין אויב דער מענטש וואס באקומט דעם וואקסין:

- האט געהאט אן אלערגישע רעאקציע נאך א פריערדיגע דאזע פונעם מענינדזשאָקאָקעל B וואקסין, אדער אויב זיי האבן סיי וועלכע ערנסטע, לעבנס-סכנות'דיגע אלערגיעס
- איז טראגעדיג אדער נויסט א בייבי



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

אין געוויסע פעלער, וועט אייער דאקטאר מעגליך באשלוסן צו אפשטופן מענינדזשאָוקאַקעל B וואַקסינאַציע ביז אַ צוקונפֿטדיגע באַזוך.

מענינדזשאָוקאַקעל B וואַקסינאַציע זאל אַפּגעשטופֿט ווערן פֿאַר טראַגעדיגע מענטשן חוץ אויב דער מענטש איז אין אַ העכערע סכּנה און אויב נאכּן זיך דורכרעדן מיט זייער דאקטאר, זעהען די בענעפיטן פון וואַקסינאַציע אויס צו איבערוועגן די מעגליכע סכּנות.

מענטשן וואס פילן זיך מילד נישט גוט, ווי צום ביישפיל א פארקילעכץ, קענען וואקסינירט ווערן. מענטשן וואס זענען מיטלמעסיג אדער ערנסט קראנק זאלן געווענטליך ווארטן ביז זיי דערהוילן זיך איידער באקומען דעם מענינדזשאָוקאַקעל B וואקסין.

אייער דאקטאר קען אייך גיבן מער אינפארמאציע.

4. סכנות פון א רעאקציע צום וואקסין

• ווייטאג, רויטליכקייט אדער א געשווילעכץ אויף דעם פלאץ וואו מען האט געגעבן די איינשפריץ, פילן אויסגעמוטשעט, א קאפוויי, ווייטאג אין די מוסקל אדער אין די דזשוונטס (געלענקן), א פיבער אדער איבל קענען געשען נאכן באקומען דעם מענינדזשאָוקאַקעל B וואקסין. טייל פון די רעאקציעס געשעען ביי מער פון האלב פון די מענטשן וואס באקומען דעם וואקסין.

מענטשן חלש'ן צומאל נאך מעדיצינישע פראצעדורן, אריינרעכענענדיג וואקסינאַציע. זאגט אייער דאקטאר אויב איר באקומט א שווינדל אדער אויב אייער זעענונג טוישט זיך אדער אויב איר הערט קלינגען אין די אויערן.

פונקט ווי מיט סיי וועלכע מעדיצין, עס זענען דא גאר קליינע אויסזיכטן אז א וואקסין זאל פאראורזאכן א שווערע אלערגישע רעאקציע, אן אנדערע ערנסטע שעדיגונג, אדער טויט.

5. וואס אויב עס איז דא אן ערנסטן פראבלעם?

אן אלערגישע רעאקציע קען פארקומען נאכדעם וואס דער מענטש וואס האט באקומט דעם וואקסין פארלאזט די קליניק. אויב איר זעט סימנים פון אן ערנסטע אלערגישע רעאקציע (אויסשלאגן, אן אויפגעשוואלענע פנים און האלז, שוועריקייטן צו אטעמען, א שנעלע הארץ קלאפ, א שווינדל אדער שוואכקייט), רופט 1-1-9 און נעמט דעם מענטש צו דעם נאענסטן שפיטאל.

פאר אנדערע סימנים וואס באזארגן אייך רופט אייער דאקטאר.

אומגעוואונטשענע רעאקציעס זאלן באריכטעט ווערן צו דעם (VAERS) Vaccine Adverse Event Reporting System (וואקסין אומגעוואונטשענע אינצידענטן באריכטונג סיסטעם). אייער דאקטאר וועט געווענטליך זיין דער וואס וועט אריינגעבן דעם באריכט, אדער איר קענט דאס אליין טאן. באזוכט די VAERS וועבזייטל אויף www.vaers.hhs.gov אדער רופט 1-800-822-7967. VAERS איז געווידמעט נאר צו באריכטן רעאקציעס, און VAERS שטאב מיטגלידער גיבן נישט קיינע מעדיצינישע עצות.

6. דער נאציאנאלע וואקסין שאדן פארגוטיגונג פראגראם

דער National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) (נאציאנאלע וואקסין שאדן פארגוטיגונג פראגראם) איז א פעדעראלער פראגראם וואס איז אוועקגעשטעלט געווארן צו פארגוטיגן מענטשן וואס זענען מעגליך געשעדיגט געווארן דורך געוויסע וואקסינען. קליימס אין פארבינדונג מיט אנגעבליכע שאדן אדער טויט צוליב א וואקסינאַציע האבן א באגרעניצטע צייט צו אריינגעגעבן ווערן - קענענדיג זיין אזוי קורץ ווי צוויי יאר. באזוכט די VICP וועבזייטל אויף www.hrsa.gov/vaccinecompensation אדער רופט 1-800-338-2382 צו לערנען מער איבער דעם פראגראם און איבער ווי אזוי אריינצוגעבן א קליימס.

7. ווי אזוי קען איך לערנען מער?

- פרעגט אייער דאקטאר.
- רופט אייער לאקאלע אדער סטייט העלט דעפארטמענט.
- באזוכט די וועבזייטל פון די Food and Drug Administration (FDA) (עסן און דראג אדמיניסטראציע) פאר די אינפארמאציע צעטלעך וואס קומען מיט די וואקסין פעקלעך און פאר נאך אינפארמאציע אויף www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines.
- פארבינדט זיך מיט די Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (צענטערס פאר קראנקייט קאנטראל און פארמיידונג): רופט 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) אדער באזוכט די CDC וועבזייטל אויף www.cdc.gov/vaccines.

Yiddish translation provided by Immunize.org

Vaccine Information Statement
Meningococcal B Vaccine

42 U.S.C. § 300aa-26
8/6/2021

OFFICE
USE
ONLY



כדי צו ערלויבן מעדיקאל קעיר פארזארגער צו האָבן גענויע אימוניזאציע סטאטוס אינפארמאציע, וויאויך צו מאכן אן אימוניזאציע אפשאצונג און א רעקאמענדירטע שעדיול פאר צוקונפטיגע אימוניזאציעס, וועט אינפארמאציע געשיקט ווערן צו משיגאן סטעיט קעיר אימפרואוועמענט רעדזשיסטרי. יחידים האבן די רעכט צו פארלאנגען אז זייערע מעדיקאל קעיר פארזארגער זאל נישט שיקן אימוניזאציע אינפארמאציע צו די רעדזשיסטרי.

MDHHS-Pub-3932Y

AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.