

รายงานข้อมูลวัคซีน

THAI

วัคซีนชูสเตอร์ (โรคกุหลาบ) ชนิดเชื้อตาย, RZV: สิ่งที่คุณต้องทราบ

Many Vaccine Information Statements are available in Thai and other languages.
See www.immunize.org/vis


มีรายงานวัคซีนจำนวนมากที่มีให้ในภาษา
ไทย และภาษาอื่น ๆ
www.immunize.org/vis

1 เหตุใดจึงต้องรับวัคซีน

โรคกุหลาบ (หรือที่เรียกว่าเยอรมันชูสเตอร์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่าชูสเตอร์) เป็นเม่น
ผู้หนึ่งเจ็บแบบ มักมากพร้อมกับแพลทุพอง โรคกุหลาบมีสาเหตุมาจากการไวรัสไวรัสชา
ชูสเตอร์ ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดเชื้อไวรัสอีสุกอีสิ หลังจากที่คุณเป็นโรค
อีสุกอีสิ ไวรัสจะอยู่ในร่างกายของคุณและสามารถทำให้เป็นโรคกุหลาบได้ในวัยเด็ก
จากนั้น

คุณไม่สามารถติดโรคกุหลาบได้จากผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีสิ (หรือ
ไม่เคยได้รับวัคซีนอีสุกอีสิ) อาจได้รับเชื้อไวรัสอีสุกอีสิจากผู้ที่เป็นโรคกุหลาบ

ผู้ป่วยกุหลาบโดยทั่วไปจะป่วยที่ขาหนีบหรือร่างกาย และภายนอกทั้งหมดใน
2 ถึง 4 สัปดาห์ อาการลักษณะของโรคคือเจ็บปวด ร้าวขาเข้าร้าวขา อาการอ่อนแรง อาจรวม
ถึงอาการไข้ ปวดหัว หนาวเย็น และท้องบื้นปานกลาง ในการนี้อย่างมาก การติดเชื้อโรคกุหลาบ¹
อาจทำให้ปอดบวม มีปัญหาในการได้อิน ตาบอด สมองติดเชื้อ (สมองอักเสบ) หรือ²
เสียชีวิต



สำหรับผู้ป่วยประมาณ 1 ใน 5 อาการเจ็บรุนแรงอาจยังคงอยู่นานกว่า 1 ปี หลังจากที่
ผ่านหายไปแล้ว อาการเจ็บที่ยังคงมีอยู่นี้เรียกว่าอาการปวดเส้นประสาทหลังจากเป็นโรค
กุหลาบ (post-herpetic neuralgia หรือ PHN)

โรคกุหลาบจะพบในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปอย่างกว้าง泛ี แต่เด็ก และจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตาม
อายุ นอกจากนี้ ยังพบบ่อยในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเนื่องจากโรค เช่น มะเร็ง
หรือในองค์กร เช่น ลิฟเวอร์ไซร์ด หรือเคมีบำบัด

ประมาณในสหราชอาณาจักรเป็นโรคกุหลาบอย่างน้อย 1 ล้านคนต่อปี

2 วัคซีนโรคกุหลาบ (ชนิดเชื้อตาย)

วัคซีนโรคกุหลาบชนิดเชื้อตายได้รับอนุมัติจาก FDA ในปี 2017 สำหรับการป้องกัน
โรคกุหลาบ ในการทดลองทางคลินิก พบร่วมประสิทธิภาพในการป้องกันโรคกุหลาบ
มากกว่า 90% และยังมีแนวโน้มของ PHN ลดลง
แนวโน้มที่รับวัคซีนสองครั้ง ห่างกัน 2 ถึง 6 เดือน สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
วัคซีนนี้ยังแนะนำสำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโรคกุหลาบชนิดเชื้อเป็น (Zostavax) แล้ว
ด้วย ไม่มีรายละเอียดเป็นในวัคซีนนี้

3 บุคคลที่ไม่ควรรับวัคซีน

แจ้งผู้ให้บริการว่าคุณ หากคุณ:

- มีอาการแพ้ร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต บุคคลที่มีอาการแพ้ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนั้นๆ ได้รับวัคซีนโรคกุหลาบชนิดเชื้อตายหนึ่งครั้ง หรือมีอาการแพ้ร้ายแรงต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของวัคซีนนี้ อาจได้รับคำแนะนำให้มีรับวัคซีน สอบถามผู้ให้บริการ ดูผลลัพธ์ของคุณ หากคุณต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของวัคซีน
- ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับการให้รับวัคซีนโรคกุหลาบชนิดเชื้อตายในสตรีมีครรภ์ หรือสตรีที่ให้นมบุตร ผู้ให้บริการดูผลลัพธ์ของคุณอาจแนะนำให้เลื่อนการรับวัคซีนออกไปก่อน
- รู้สึกไม่สบาย หากคุณมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น หวัด คุณอาจสามารถรับวัคซีนได้ในวันนั้น หากคุณมีอาการเจ็บป่วยปานกลางหรือรุนแรง คุณควรรอจนกว่าคุณจะหายดี แพทย์ของคุณสามารถแนะนำคุณได้

4 ความเสี่ยงของการแพ้วัคซีน

ได้รับยาใด ๆ รวมถึงวัคซีน จะมีโอกาสเกิดอาการแพ้

หลังจากฉีดวัคซีนไปครึ่งสัปดาห์นิดเดียว บุคคลอาจมีอาการดังนี้

- ปวด แดง เจ็บ หรือบวมบริเวณที่ฉีดวัคซีน
- ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ไข้ หนาวสั่น อ่อนล้า

ในการทดลองทางคลินิก คนส่วนใหญ่จะเจ็บแย่เล็กน้อยถึงปานกลางหลังจากได้รับวัคซีน และยังมีอาการแดงและบวมบริเวณที่ฉีดวัคซีน บางคนรู้สึกเหนื่อย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัว หนาวสั่น ไข้ ปวดท้อง หรือคลื่นไส้ ประมาณ 1 ใน 6 คนที่ได้รับวัคซีน ชาสเตอร์ชนิดเข็อด้วยมีผลข้างเคียงที่ทำให้พอกษาไม่สามารถทำกิจกรรมประจำวันได้ อาการจะหายไปเองในประมาณ 2 ถึง 3 วัน ผลข้างเคียงพบมากในผู้ที่มีอายุน้อย คุณยังควรได้รับวัคซีนชาสเตอร์ชนิดเข็อด้วยครั้งที่สอง แม้ว่าคุณจะมีอาการแพ้หนึ่งในอาการเหล่านี้ลงจากได้รับวัคซีนครั้งแรก

อาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากได้รับวัคซีนนี้ได้แก่

- บางคนอาจเป็นลมหลังจากได้การรักษา รวมถึงการฉีดวัคซีน การนั่งหรือนอนหลัง เป็นเวลาประมาณ 15 นาที อาจช่วยบ้องก้นการเป็นลมและการบาดเจ็บที่เกิดจาก การหลอกล้ม แจ้งผู้ให้บริการของคุณทราบ หากคุณรู้สึกวืดหัว หรือกรามของเห็น เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเสียงในหู
- บางคนอาจเจ็บเหลืองจากอาการร้าวและบวมตามน้ำหนักจากการเจ็บที่ไม่ใช่อาการแพ้ หลังจากการฉีดยา อาการแพ้เหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเลย
- การรักษาด้วยยาใด ๆ สามารถก่อให้เกิดอาการแพ้รุนแรงได้ มีการประมาณการว่า อาการแพ้วัคซีนตั้งแต่ก้อนดีน้ำ 1 ในล้านครั้ง และอาจเกิดขึ้นไม่กี่นาที หรือไม่ กี่ชั่วโมงหลังจากฉีดวัคซีน
- เมื่อได้รับยาใด ๆ มีโอกาสเกิดขึ้นมาก ที่วัคซีนจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง หรือ เสียชีวิต
- จะมีการติดตามความปลอดภัยของวัคซีนเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.cdc.gov/vaccinesafety

5 ควรทำอย่างไร หากเกิดปัญหาร้ายแรง

ฉันควรจะพิจารณาอะไร

- พิจารณาทุกเรื่องที่ทำให้คุณกังวล เช่น สัญญาณของการแพ้รุนแรง มีไข้สูงมาก หรือพัฒนาระบบที่ผิดปกติ

สัญญาณของการแพ้รุนแรงอาจได้แก่ ลมพิษ หน้าแดงคอบวม หายใจลำบาก หัวใจเต้นเร็ว เดินหัว และอ่อนเพลีย อาการเหล่านี้มักเริ่มมีตั้งแต่ได้รับวัคซีนไม่กี่นาทีจนถึงไม่กี่ชั่วโมง

ฉันควรทำอย่างไร

- หากคุณคิดว่าเป็นอาการแพ้ร้ายแรงหรืออาการฉุกเฉิน โทร. 9-1-1 และไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโทรศัตต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ

หลังจากนั้น ควรรายงานอาการแพ้ไปยัง Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) (ระบบการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากวัคซีน) แพทย์ของคุณควรรายงานนี้ หรือคุณอาจ ส่งด้วยตนเองผ่าน เว็บไซต์ VAERS ที่ www.vaers.hhs.gov หรือโทร 1-800-822-7967

VAERS ไม่ได้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์

6 ฉันจะเรียนรู้เพิ่มเติม ได้อย่างไร

- สอบถามผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ บุคคลนั้นสามารถให้เอกสารประกอบ แพคเกจวัคซีน หรือแนะนำแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ได้
- โทรศัตต่อกรมสุขภาพของรัฐหรือห้องดื่นของคุณ
- ติดต่อ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (ศูนย์ควบคุมและบังคับใช้): 1-888-767-4687
 - โทร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) หรือ
 - ไปที่เว็บไซต์ของ CDC ที่ www.cdc.gov/vaccines

เพื่อให้สถานพยาบาลได้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานะด้านภูมิคุ้มกันโรค การประเมินผลกระทบ ภูมิคุ้มกันโรคในคราวต่อไป ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดส่งไปยังสำนักทะเบียนข้อมูลด้านการป้องกันโรค ของรัฐวิธี Michigan Care Improvement Registry (Michigan Care Improvement Registry) บุคคลต่างๆ มีลักษณะที่จะร้องขอไม่ให้สถานพยาบาลของตนลงทะเบียนข้อมูลด้านภูมิคุ้มกันโรคไปที่สำนักทะเบียนได้

Vaccine Information Statement Recombinant Zoster Vaccine

2/12/2018

Thai



DCH-1189TH

AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.

Translation provided by the Immunization Action Coalition