للمزيد من المعلومات حول بريب ، قومي بزيارة بريب على: Michigan.gov/MIPrEPأو قومى بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا.



/ الأمراض المنقولة جنسيا في ميشيغان 2437-872-800 أو misexualhealthinfo.com للدردشة :عبر الانترنت

سى دي سى بريب للنساء:CDC.gov/ShelsWell

برنامج جيلياد للحصول على المساعده السريعة:

الاتصال بجهة أبريتيود: support

:للحصول على موارد إضافية ، اتصلى بالرقم 211 أو قومى بزيارة.





ضد أي فرد أو (MDHHS) لن تميز إدارة الخدمات الصحية والإنسانية لولاية ميشيغان مجموعة على أساس العرق أو الأصل القومي أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الدين أو العمر أو الطول أو الوزن أو الحالة العائلية أَو الاعتبارات الحزبية أو المعلومات الوراثية.

الصور المستخدمة في هذا الكتيب هي لأغراض توضيحية فقط.

مصادر معلومات بریب:

علاج بريب لوقاية النساء قبل





للأسئلة، اتصلى بالخط الساخن لفيروس نقص المناعة البشرية

موارد بريب للمساعدة في الدفع لغير ذوى القدرة:

Gileadadvancingaccess.com

ViiVConnect.com/for-providers/financial-

mi211.org/HIV-STI-Services.



، يشمّل التمييّز القائم على اساس الجنس ، على سبيل المثال لا الحصر ، التوجه الجنسي . والهوية الجنسية ، والتعبير الجنسي ، والخصائص الجنسية ، والحمل

MDHHS-Pub-1805-AR (5/25)

الأشخاص الذين تم تصويرهم في هذه الصور هم نماذج.



ما هو برىب؟

العلاج الوقائي قبل التعرض أو بريب هو دواء يمكن أن يساعد في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية. تناول بريب على النحو الموصوف يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة تصل إلى 99 بالمئة للقاءات الجنسية و 74بالمئة للأشخاص الذين يتشاركون الإبر أو معدات الحقن الأخرى.

من يجب أن يفكر في تناول دواء بريب؟

قد يكون بريب مناسبا لك إذا كنت تتعلقين بأي مما يلى:

عدم الانتظام في استخدام الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس.







ممارسة الجنس دون استخدام الواقي الذكري مع شخص لا تعرف إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية.



مشاركة الإبر أو معدات الحقن الأخرى.



تبادل الجنس مقابل المال أو المخدرات أو السكن أو أشياء أخرى.



ممارسة الجنس مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية ولم يكن من الممكن اكتشافه لمدة ستة أشهر.



يمكنك أيضا التواصل مع إدارة الصحة المحلية أو المنظمة المجتمعية لفيروس نقص المناعة البشرية للتواصل مع بريب.

إذا كنت تعتقدين أن علاج بريب هو الخطوة

الصحيحة

تحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك!

أود أن أتحدث عن الحصول "

على علاج بريب للوقاية من

"فيروس نقص المناعة البشرية

أشياء يجب مراعاتها عند التحدث إلى مقدم الرعاية

■ قومى بإعداد الأسئلة التي قد تكون لديك حول بريب

إذا كان مقدم الرعاية الصحية الخاص بك غير مرتاح

■ اطلبي من مقدم الرعاية استشارة خط وزارة الصحة

■ أطلبي المراجعة مع مقدم رعاية صحية آخر لديه

بميتشيجان للخدمات الانسانيه - هنرى فورد -أتش آ

لوصف علاج بريب، فلديك خيارات أخرى:

في على الرقم: 0332-575-313

■ Michigan.gov/MIPrEPحددی موقع مقدم رعاية صحية آخر عن

طريق زيارة: أو مسح الرمز.

معرفة أكبر عن بريب.

الصحية الخاص بك حول علاج بريب:

کونی منفتحة وصادقة

اعرفي لماذا يعتبر بريب خيارا جيدا لك



:برنامج بريب للنساء

أدوية بريب المعتمدة للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يمارسون الجنس المهبلي الاستقبالي:

- تروفادا (أو ما يعادلها بشكل عام) ، وهي حبة تؤخذ كل يوم.
 - 🔳 أبريتيود و هي حقنة كل شهرين.

أشياء يجب ملاحظتها:

- لا تبدئ أو توقفى أو تعيدى تناول دواء بريب الا بتوجيهات من مقدم الرعاية الصحية.
- لا تشاركي علاج بريب مع شخص لم يوصف له بريب.
- تحدثى مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك اذا كنت تشعرين أن دواء بريب لم يعد الخيار المناسب لك.

ما مدى سرعة فاعلية علاج بريب؟

من فضلك إسألى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن المدة التى يستغرقها علاج بريب للوصول إلى أقصى قدر من الفاعلية للإستقبال الجنسى المهبلى و الشرجى. ويختلف هذا قليلا إعتمادا على الدواء الموصوف لك.

هل يؤثر بريب على العلاج بالهرمونات البديلة (إتش آر ت) ؟

لا يوجد دليل على أن بريب سوف يتداخل مع العلاج الهرموني البديل. ناقشي مخاوفك الخاصة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

ماذا عن طرق تحديد النسل؟

لا توجد تفاعلات معروفة بين دواء بريب و وسائل تحديد النسل القائمة على الهرمونات (على سبيل المثال ، حبوب منع الحمل ، اللصقة ، الحلقة ، الحقنة ، الغرسة ، أو اللولب). إنها آمنة للاستخدام مع دواء بريب في نفس الوقت.



هل هناك أعراض جانبية لدواء بريب؟

معظم الناس الذين يتناولون بريب لا يبلغون عن أي آثار جانبية. يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية ، لكنها خفيفة بشكل عام وعادة ما تختفي بمرور الوقت. كما هو الحال مع أي دواء، ناقشى أي آثار جانبية محتملة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

ماذا لو كنت حاملا أو أرضع من الثدى أثناء تناول بريب؟

قد يكون استخدام علاج بريب خيارًا جيدً لك ولطفلك للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة أثناء محاولة الحمل، أو أثناء الرضاعة الطبيعية من الثدى. تحدثى مع مقدم الرعاية الصحية حول الخيارات المتاحة للوقاية من فيروس نقص المناعة إتش آ في.



هل يمنع دواء بريب الأمراض المنقولة جنسيا أو يمنع الحمل؟

بينما يحمي دواء بريب من فيروس نقص المناعة البشرية ، فإنه لا يحمي من الأمراض الأخرى المنقولة جنسيا و لا يمنع الحمل. الواقي الذكري هو الخيار الأفضل للحماية من الأمراض المنقولة جنسيا و تناول بريب يوفر حماية إضافية ضد فيروس نقص المناعة

الدم السائل سوائل الجسم التي السوائل تنقل فيروس نقص المستقيم المهبلية المناعة البشرية:

حول فيروس نقص المناعة البشرية:

فيروس نقص المناعة البشرية يدمر جهاز المناعة في الجسم. إذا ترك دون علاج ، فإن فيروس نقص المناعة البشرية (إتش آ في)

يقلل من قدرة الجسم على محاربة الأمراض.

CDC.gov :الصورة

كيف ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية؟

حليب الثدي

عن طريق ممارسة الجنس المهبلي أو الشرجي دون استخدام الحماية مثل الواقي الذكري أو الأدوية لعلاج أو الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.

السائل قبل

المنوي

- 🔳 عن طريق مشاركة الإبر أو معدات الحقن الأخرى .
- من المرأة الحامل إلى الطفل عن طريق الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية من الثدى.

لا يمكنك الحصول على فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق التبرع بالدم أو من خلال الاتصال العرضي مثل المعانقة أو المصافحة بالأيدى.