

آنچه باید در مورد دواى خود برای عفونت سل نهفته (TB) بدانید

ایزونیازید و ریفامپتین

ایست

مراقب این مشکلات احتمالی باشید:

اگر با هر یک از عوارض زیر مواجه شده اید، دست نگه دارید و با داکتر یا نرس متخصص سل تماس بگیرید:

- کاهش اشتها یا بی‌اشتهایی نسبت به غذا
- احساس ناراحتی در معده یا شکم دردی
- تب
- سردردی یا بدن دردی
- حالت تهوع یا استفراغ
- ادرار تیره یا مدفوع کم رنگ
- کبودی یا خونریزی آسان
- اندفاع جلدی و خارش
- زردی جلد یا چشم
- ضعف یا خستگی شدید
- سوزش یا بی‌حسی در دست و پا
- سرگیجه

به منظور تداوی عفونت سل نهفته برای شما دوا تجویز می‌شود. شما به مرض سل مصاب نیستید و نمی‌توانید آن را به دیگران سرایت دهید. این دوا به شما کمک می‌کند تا از مصاب به مرض سل پیشگیری کنید.

انجام معاینات هفته وار خود را به خاطر داشته باشید:

شما هر هفته برای مصرف دواهای خود مسئول ارائه دهنده خدمات صحتی را ملاقات خواهید کرد. این طرح تداوی با نظارت مستقیم نام دارد (DOT).

DOT به چندین طریق می‌تواند به شما کمک کند.

- مسئول ارائه دهنده خدمات صحتی به شما در یادآوری مصرف دواهای خود کمک می‌کند.
- شما تداوی را در اسرع وقت تکمیل خواهید کرد.
- مسئول ارایه دهنده خدمات صحتی اطمینان حاصل می‌کند که شما با مصرف دواها مشکلی نخواهید داشت.
- طی معاینات هفته وار، این شخص می‌تواند به سوالات شما جواب دهد. همچنین، می‌توانید در مورد نگرانی‌های خود با او صحبت کنید.

هنگام مصرف این دوا:

- ✓ اگر سوال یا نگرانی در مورد دوا دارید، آن را با داکتر یا نرس خود در جریان بگذارید.
- ✓ برای معاینات هفته وار مراجعه نمایید.
- ✓ در مورد مصرف مشروبات الکلی با داکتر خود صحبت کنید. مصرف الکل می‌تواند منجر به عوارض جانبی شود.
- ✓ در مورد تمام دواهایی که مصرف می‌کنید به داکتر خود اطلاع دهید.
- ✓ حتماً به سایر داکترهای خود اطلاع دهید که تحت تداوی عفونت سل نهفته هستید.
- ✓ برخی افراد متوجه شده اند که این دواها هنگام مصرف به همراه غذا تأثیر کمتری روی آنها می‌گذارد.

برنامه دوايي عفونت سل نهفته:

(ارایه دهنده خدمات صحتی: روز و تعداد مناسب برای تابلیت‌ها را مشخص می‌کند)

دوا	برنامه زمانی	روز	تعداد تابلیت در روز	طول دوره
ایزونیازید و ریفامپتین	یک بار در هفته	شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه		3 ماه (12 هفته)

داکتر می‌تواند در کنار دوا برای شما ویتامین B6 تجویز کند.

یادداشت

نام داکتر من:

نام کلینیک من:

شماره تلفون کلینیک من:

تذکر: تغییر رنگ ادرار، بزاق یا اشک به رنگ نارنجی عادی محسوب می‌شود. لنزهای تماسی نرم ممکن است لکه دار شوند.



مرکز ملی پیشگیری از HIV/AIDS، هپاتیت و ویروسی، STD و سل

بخش حذف سل